

Созылмалы гастрит

Дайындаған: Рахымбердиев Д

АНЫҚТАМАСЫ

- **Созылмалы гастрит – асқазан кілегей қабығының жасушалық инфильтрациясымен, регенерациясының бұзылысымен үнемі мендеуінен бездік эпителийдің атрофиясына, кілегей қабықтың ішектік метаплазиясына алып келетін асқазанның секрециялық моторикалық инкрециялық функцияларының жетіспеушілігінен туғызатын, асқазан кілегей қабығының созылмалы қабыну ауруы.**

Анамнездік мәліметі

- 1. *Helicobakter pylori*(95%).
- 2. Аутоиммундық фактор (15-18%).
- 3. Дуоденогастральдік рефлекс.
- 4. Зиянды әдеттер.
- 5. Алиментарлық фактор.
- 6. Ұзақ қолданған дәрі-дәрмектердің әсері (стероидтық емес қабынуға қарсы, туберкулезға қарсы дәрмектерді т.б.)
- 7. Өзге ағзалардың аурулары (анемия, өкпенің, жүректің, бүйректің жетіспеушілігі).
- 8. Ішкі факторлардың әсері (созылмалы инфекциялар, эндокринды жүйенің аурулары, семіздік, подагра)

Зақымдалған орны.

- Асқазанның жиі антральды бөлігі.

Клиникасы

- Ауырсынудың диспепсиялық шағымдар.
- 1. Қыжылдау
- 2. Қышқылмен кекіру
- 3. Тәбеттің нашарлауы, жүрек айну.
- 4. Құсу, ауыздың темір татуы, құрғауы,
- 5. Ауамен, ащы сұйықтықпен жиі кекіру
- 6. Ішектің қорылдауы, метеаризм, іштің өтуі.
- 7. Тамаққа тез тою, эпигастрийде салмақ сезіну сезімдерінің байқалуы.

Объективті пальпацияда ауырсыну

- Ауырсыну эпигастрия аймағының оң жартысында орналасады, тамақтанған соң 1,5-2 сағаттан кейін және таң ертең ашқарында басталады.

Диагностика

- ФГДС..
- В типті гастритте антропиролобульбиттің көрінісі байқалады. Аталған аймақтардың алақұла қызаруы, ісінуі атрафиялануы; кілегей қабатының жарықтанғыштығы, қанағыштығы, төмпек эрозиялары
- А типті гастритте асқазан түбінің денесінің диффузды атрафиясы анықталады (қыртыстардың аласаруы, жойылуы кілагай қабықтың ақшылданып, жұқаруы, тамырлардың көрінуі).

- Биопсияда ереже бойынша биоптаттың саны бестен кем болмауы тиіс. Антральді бөліктен, қалытқыдан екі см жоғары, асқазан денесінен артқы және алдыңғы қабырғаларынан биоптаттың таңбалық жағындысын кептіріп Папенгеим әдісімен бойап микробтың саны анықталады. *H. pylori* S тәрізді немесе ұшқан құс қанатына ұқсайтын құрылымдар түрінде көрінеді.

Асқынулары

- 1. Асқазан жарасы
- 2. Асқазанның перфарациясы
- 3. Асқазанның рагы