

- *Гестозы*

Лекция: Гестозы



Гестоз – это заболевание беременности, которое возникает во время беременности, прогрессирует с ростом беременности и исчезает тогда когда нет беременности

Гестоз

– это синдром дезадаптации

Лекция: Гестозы

Классификация:

Ранние (до 20 недель срока беременности):

Рвота беременных: *по степени тяжести*

Легкой

Средней

Тяжелой

Птиализм (слюнотечение)

Поздние (после 20 недель срока беременности)

Чистые

Сочетанные

Редкие гестозы возникают в любом сроке беременности

Дерматозы

Остеомаляция

Бронхиальная астма

Тетания

Желтуха

Острая желтая дистрофия печени

Ранние гестозы

Этиологический фактор:

- ❖ плодное яйцо
- ❖ плацента

Патогенез:

- ❖ **Дезадаптация** – отсутствие физиологического ответа со стороны нейро-рефлекторных реакций на раздражение нервных окончаний матки импульсами идущими от плодного яйца.

Ранние гестозы

Группа риска по гестозу:

- ✓ Заболевания ЖКТ
- ✓ Патология позвоночника
- ✓ Нервной системы
- ✓ Эндокринные заболевания и др.

Рвота беременных

Классификация по степени тяжести

- Легкая до 5 раз в сутки
- Средней до 10 раз в сутки
- Тяжелая более 10 раз в сутки

Рвота беременных

Клиника

```
graph TD; A[Клиника] --> B[ГОЛОДАНИЕ]; A --> C[ОБЕЗВОЖИВАНИЕ:]; B --> D[ ]; C --> D;
```

ГОЛОДАНИЕ

- снижение веса,
- отсутствие аппетита,
- отвращение к пище,
- слабость, вялость,
- апатия или раздражение

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ:

- Сухость кожи и слизистых,
- обложенный язык
- запах ацетона изо рта
- олигурия, вплоть до анурии
- снижение АД, тахикардия

Рвота беременных



Развитие полиорганной и полисистемной недостаточности (сердечно-сосудистой, почечной, печеночной)

- Повышение температуры до субфебрильных цифр*
- Присоединение пневмонии*

Рвота беременных

Лабораторные изменения

Общий анализ крови: Гиповолемия

- Повышение гемоглобина
- Повышение гематокрита

Общий анализ мочи:

- олигоурия
- цвет: темно-коричневый, концентрированная
- удельный вес высокий (1020-1025),
- белок, цилиндры ацетон +++

Биохимический анализ крови: признаки ацидоза

- Повышение уровня остаточного азота, мочевины, креатинина, билирубина
- Снижение уровня хлоридов – признаки ацидоза



Рвота беременных

При прогрессировании до тяжелой степени тяжести (неукротимая рвота) наблюдаются неблагоприятные признаки

- Стойкая тахикардия
- Гипертермия
- Иктеричность
- Протеинурия
- Бредовое или коматозное состояния
- Недержание мочи

Рвота беременных

Лечение:

- Лечение экстрагенитальных заболеваний
- Освобождение от работы
- Перемена обстановки будет являться лечебным фактором в Казани – санаторий для беременных
- Режим питания, утром не вставая с постели, лежа сухарик
- Создание физического и психического покоя (все прихоти беременной женщины)

Рвота беременных

Лечение:

- Госпитализация в ОПБ или гинекология в отдельную палату
- Физиолечение электросон, электроанальгезия
- Психотерапия, гипноз, иглоукалывание
- Седативные (пустырник, валериана) антигистаминные средства, обладающие седативным действием пипольфен, седуксен, димедрол
- Иммуномодуляторы спленин (из селезенки крупного рогатого скота) 1% - 1,0 внутримышечно

Рвота беременных

Лечение

- Витаминотерапия: группа В, аскорбиновая кислота, антиоксиданты Е, А.

В тяжелых случаях основой лечения является
инфузионная терапия

объем до 3 литров: раствор глюкозы + витамин С

Помним, что на 4 гр глюкозы – 1 ЕД инсулина

- Кокарбоксилаза, эссенциале,
- гемодез, реополиглюкин,
- солевые растворы: диссоль, ацесоль, квинтосоль
- белковые препараты: альбумин, плазма, гидролизат казеина, аминокептид помнить об аллергенности препаратов

Рвота беременных

Лечение:

- ГКС в тяжелых случаях
преднизолон, гидрокортизон
- Сода – ацидоз
- Противорвотное: церукал, реглан,

Противопоказано в I триместре
беременности.

Проходит через плацентарный барьер,
также противопоказано при
лактации и детям до 2 лет

- Медикаментозный сон:
оксибутират натрия на 3-4 часа,
несколько раз
- Барокамера, кислород, ИВЛ

Рвота беременных

Неэффективность лечения
тяжелой рвоты
в течение 1-2 суток
является показанием
к прерыванию беременности
путем *abrasio cavi uteri*

Птиализм

Действует угнетающе на психику беременной, вызывает мацерацию кожи и слизистых вокруг рта, трещины

Может предшествовать рвоте

Лечение:

- Парентерально атропин 0,1% - 0,5 п/к
- Полоскание рта: шалфей, кора дуба
- Смазывание кремом вокруг рта
- ГЛОТАТЬ СЛЮНУ не допуская признаков обезвоживания

Редкие формы гестозов

Дерматоз

- В виде эритемы, крапивницы, различных кожных заболеваний, герпетические высыпания, опоясывающий лишай, чаще всего зуд вульвы и влагалища
- Необходимо исключить: сахарный диабет, глистная инвазия
- Лечение то же

Редкие формы гестозов

Желтуха беременных

- Грозный симптом появившийся во время беременности. Немедленно госпитализация в инфекционное отделение, чаще всего желтуха является признаком инфекционного заболевания (вир. гепатит)
- Механическая желтуха
- Отравление ядом (метатрексат)
- Опухоль
- Тактика: консультация всех специалистов

Редкие формы гестозов

Острая желтая атрофия печени

- Характерно только для беременных
- Смертельный гестоз – беременность необходимо немедленно прервать
- В течение 2-3 нед белковое и жировое перерождение печени с уменьшением размеров, интоксикация, диспротеинемия

Редкие формы гестозов

Остеомаляция

- В норме при беременности происходит размягчение хрящей (лонное, крестцово-подвздошное сочленение), суставы более подвижные, что приводит к увеличению плоскости входа в малый таз
- В данном случае наблюдается размягчение костей таза, позвоночника, конечностей. Изменяется походка, деформация костей. Возникают боли. Необходимо сделать снимок *Беременность немедленно прерывается* Лечение у травматолога.