

Гепатит А

ДҮНИЕ ЖҮЗІНДЕ КЕҢ ТАРАҒАНА ИНФЕКЦИЯЛАРДЫҢ БІРІ. БІРАҚ ТА ТАРАУЫ ДА ӘР ЖЕРДЕ БІРКЕЛКІ ЕМЕС. СЫРҚАТ КӨБІНЕСЕ БАЛАЛАР АРАСЫНДА ТАРАЙДЫ. ЕРЕСЕКТЕР АРАСЫНДА КӨБІНЕСЕ 15-29 ЖАСТАҒЫЛАР АУЫРАДЫ. ВГА-ҒА МАУСЫМДЫҚ ТӘН. КӨБІНЕСЕ АУРУ – СЫРҚАТТЫҢ ДЕҢГЕЙІ КҮЗ – ҚЫС КЕЗІНДЕ ЖОҒАРЫЛАЙДЫ. МЕКТЕПТЕГІ БАЛАЛАР АРАСЫНДА КӨБІНЕСЕ ҚЫРҚҮЙЕК – ҚАЗАН, 3-6 ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДА ҚАРАША – ЖЕЛТОҚСАН АЙЛАРЫНДА, АЛ 3 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАР АРАСЫНДА ЖЫЛ БАСЫ БІРЕН – САРАН ОҚИҒАЛАР ТҮРІНДЕ КЕЗДЕСЕДІ. ВГА ЖЕДЕЛ ЦИКЛДЫҚ ТҮРДЕ ӨТЕТІН ҚЫСҚА УАҚЫТТА ИНТОКСИКАЦИЯМЕН БАУЫР ӘРКЕТТЕРІНІҢ БҰЗЫЛУ ӘРКЕТІМЕН БАЙҚАЛАТЫН ФЕКАЛЬДІ – ОРАЛЬДІ ЖОЛМЕН ТАРАЙТЫН ВИРУСТЫ ИНФЕКЦИЯ. БАЛАЛАР ИНФЕКЦИЯСЫ БОЛЫП ЕСЕПТЕЛІНЕДІ, АУЫРҒАНДАРДЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР 80%-ҒА ЖЕТЕДІ. СЕМЕЙ АЙМАҒЫНДА СЫРҚАТТАНУ КӨРСЕТКІШІ 100 МЫҢ ХАЛЫҚҚА 200-400 АРАЛЫҒЫНДА.

Гепатит

В

В вирусты гепатиті (ағылш. Hepatitis B virus, HBV) — ВГВ вирусымен шақырылатын бауыр зақымы себебінен, сарғаюымен және зат алмасу процесінің бұзылуымен өтетін, өзінен кейін жиі созылмалы гепатитке және бауыр цирррозына әкеліп соғатын инфекциялық ауру.

Гепатит

С” вирусты гепатиті науқастардың көбінде (60-85%) аурудың созылмалы түріне айналады. Себебі ауру уақытылы анықталмай, әбден асқынған жағдайда бауыр циррозы, созылмалы гепатит сатысында өткен кезде ғана анықталады. Бұл ауруды “тілсіз жау” деп бекерге айтпаса керек. Созылмалы вирусты «С» гепатитімен ауырған науқастың бауыры кейде “С” вирусты созылмалы гепатит адамның басқа ағзаларының ауруына себепші болуы мүмкін.

Гепатит

Д

Вирусты гепатит Д (ВГД) – РНК-геномды дельтавирустармен шақырылатын, парентральды жолмен тарайтын, бауырды зақымдайтын, көбінесе қолайсыз аяқталатын жедел немесе созылмалы вирусты инфекция.