


# РЫБЫ

## Семейство - Тресковые

---


Абдуллин Р.  
Апушникова К.  
184 г. 2 курс.



Тип: Хордовые  
Класс:  
Лучепёрые  
рыбы

- Тресковые- семейство отряда трескообразных, обитающее в пресных и солёных водоёмах северной Атлантики и в морях Тихого океана. Включает около 100 видов.


За исключением Налима, все виды морские.  
Плавники тресковых не несут колючек.  
На подбородке, как правило, усик. Чешуя очень  
мелкая циклоидная, редко ктеноидная.



**Рис. 34. Семейство тресковых:**  
*1 — треска; 2 — пикша; 3 — навага; 4 — налим*

- Роды:  
Меньки  
Налимы  
Мерланги  
Сайды  
Пикши  
Минтаи

Жабры гребёнчатые, у всех тресковых рыб 3 спинных и 2 анальных плавника, а у Налима 2 спинных и 1 анальный плавник. Мясо белое, малокостное, вкусное, со специфическим морским запахом, тощее, но печень содержит до 70% жира. Используют эту рыбу для приготовления рыбного филе, консервов из печени.



- Менёк, или мень - вид лучепёрых рыб из семейства тресковых, максимальная длина тела 120 см, масса — 30 кг. Максимальная продолжительность жизни 20 лет.
- Верхняя челюсть немного длиннее нижней. Имеется 1 длинный подбородочный усик. На челюстях и сошнике расположены зубы в несколько рядов. Менёк отличается от других тресковых наличием одного длинного спинного плавника с 85—107 мягкими лучами, который проходит вдоль всей спины и частично соединяется с хвостовым плавником. Анальный плавник с 62—77 мягкими лучами длинный, но короче спинного, также соединяется с хвостовым плавником, отделён от последнего чёткой выемкой. Хвостовой плавник закруглённый. Грудные плавники широкие и закруглённые. В брюшных плавниках нет удлинённого луча.
- Окраска тела светло-жёлтая с коричневым оттенком, на спине несколько темнее, брюхо белое. Непарные плавники с белой каймой, за которой следует чёрная полоса.

# Среда Обитания Меньков

- Распространён в северной части Атлантического океана. У побережья Европы обитает у берегов Норвегии, Ирландии, Великобритании, Исландии и Фарерских островов. В северо-западной Атлантике — от Гренландии, Лабрадора и Ньюфаундленда до Нью-Джерси. Встречается в Баренцевом море у Кольского полуострова и Шпицбергена.