# Уравнение касательной к графику функции



# Верно ли определение?

Касательная – это прямая, имеющая с данной кривой одну общую точку.

**Пусть дана $y = x^2$ и две прямые $x = 1$ и $y = 2x - 1$, имеющая с данной параболой одну общую точку М (1;1).**






# На данном уроке:

1. выясним, что же такое касательная к графику функции в точке, как составить уравнение касательной;
2. рассмотрим основные задачи на составление уравнения касательной.

Для этого:

- вспомним общий вид уравнения прямой
- условия параллельности прямых
- определение производной
- правила дифференцирования
- Формулы дифференцирования

# Определение производной

Пусть функция $y = f(x)$ определена в некотором интервале, содержащем внутри себя точку $x_0$. Дадим аргументу $\Delta x$ приращение такое, чтобы не выйти из этого интервала. Найдем соответствующее приращение $\Delta y$ функции и составим отношение $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ .Если существует предел отношения при $\Delta x \to 0$ , то указанный предел называют ***<u>производной функции</u>*** $y = f(x)$ в точке $x_0$ и обозначают $f'(x_0)$ .

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0)$$

# Правила дифференцирования

1. Производная суммы равна сумме производных.

$$\left(f(x)+g(x)\right)' = f'(x)+g'(x)$$

2. Постоянный множитель можно вынести за знак производной.

$$\left(kf(x)\right)' = kf'(x)$$

3. Производная произведения двух функций равна сумме двух слагаемых; первое слагаемое есть произведение производной первой функции на вторую функцию, а второе слагаемое есть произведение первой функции на производную второй функции.

$$\left(f(x)g(x)\right)' = f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$$

4. Производная частного

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

# Основные формулы дифференцирования

| $f(x)$ | $f'(x)$ | $f(x)$ | $f'(x)$ |
|---|---|---|---|
| c | $0$ | $\sin x$ | $\cos x$ |
| $\frac{1}{x}$ | $-\frac{1}{x^2}$ | $\cos x$ | $-\sin x$ |
| $\sqrt{x}$ | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ | $tgx$ | $\frac{1}{\cos^2 x}$ |
| $x^{\alpha}$ | $\alpha \cdot x^{\alpha-1}$ | $ctgx$ | $-\frac{1}{\sin^2 x}$ |

Две ***прямые параллельны*** тогда и только тогда, когда их угловые коэффициенты равны

Параллельны ли прямые:

$$а)\ y = 2x - 1;$$

$$б)\ y = 2x + 2;$$

$$в)\ y = 3x - 1.$$



Пусть дан график функции y=f(x). На нем выбрана точка M(a;f(a)), в этой точке к графику функции проведена касательная (мы предполагаем, что она существует). Найти угловой коэффициент касательной.




$$y = f(x),\ M(a; f(a))$$

$$k_{сек} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$k_{кас} = \lim_{\Delta x \to 0} k_{сек}$$

$$k_{кас} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

# Геометрический смысл производной

Если к графику функции y = f (x) в точке $x = a$ можно провести касательную, непараллельную оси y, то $f'(a)$ выражает угловой коэффициент касательной

$$k_{кас} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \to a} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{(a + \Delta x) - a} = f'(a)$$

# Геометрический смысл производной

Производная в точке $x = x_0$ равна угловому коэффициенту касательной к графику функции $y = f(x)$ в этой точке.

Т.е. $$f'(x_0) = tg\alpha$$

Причем, если :

1. $f'(x_0) = tg\alpha > 0, то\ \alpha - острый$
2. $f'(x_0) = tg\alpha = 0, то\ \alpha - развернутый$
3. $f'(x_0) = tg\alpha < 0, то\ \alpha - тупой$



# Вывод уравнения касательной

Пусть прямая задана уравнением: $y = kx + m,\ M(a; f(a))$

$$k = f'(a)$$

$$f(a) = ka + m$$

$$m = f(a) - ka$$

$$y = kx + (f(a) - ka)$$

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

уравнение касательной к графику функции

$$y = f(x)$$

# Составить уравнение касательной:

- к графику функции $f(x) = x^2$ в точке $M(1;1)$

$$f(1) = 1^2 = 1$$

$$f'(x) = 2x$$

$$f'(1) = 2 \cdot 1 = 2$$

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

$$y = 1 + 2 \cdot (x - 1)$$

$$y = 1 + 2x - 2$$

$$y = 2x - 1$$



# Составить уравнение касательной:

к графику функции $y = tgx$ в точке $M(0;0)$

$$f(0) = tg0 = 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$f'(0) = \frac{1}{\cos^2 0} = 1$$

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

$$y = 0 + 1 \cdot (x - 0)$$

$$y = x$$



# Алгоритм нахождения уравнения касательной к графику функции y=f(x).

1. Обозначим абсциссу точки касания буквой *x*=*a*.
2. Вычислим $f(a)$.
3. Найдем $f'(x)$ и $f'(a)$.
4. Подставим найденные числа а , в формулу

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

# Составить уравнение касательной к графику функции $y = \frac{1}{x}$ в точке $x = 1$.

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

1) $a = 1$

2) $f(a) = f(1) = 1$

3) $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$

$$f'(a) = f'(1) = -\frac{1}{1^2} = -1$$

4) $y = 1 - (x - 1)$

$$y = 2 - x$$




<u>*Ответ*</u>:

$$y = 2 - x$$

К графику функции $y = \frac{x^3}{3}$ провести касательную так, чтобы она была параллельна прямой $y = 4x - 5$ .

$k_{кас} = 4, k_{кас} = f'(x)$ $f'(x) = 4$

$$f'(x) = \left(\frac{x^3}{3}\right)' = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot x^2 = x^2$$

$$f'(a) = a^2 \Rightarrow a^2 = 4,$$

1) $a_1 = 2, a_2 = -2$

2) $f(a_1) = \frac{2^3}{3} = \frac{8}{3}$ $, f(a_2) = \frac{(-2)^3}{3} = -\frac{8}{3}$

3) $f'(a_1) = f'(a_2) = 4$

4) $y = 4x + \frac{16}{3}$ $, y = 4x - \frac{16}{3}$



На рисунке изображен график функции $y = f(x)$ и касательная к этому графику, проведенная в точке с абсциссой 2. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке $x_0 = 2$.




$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0)$$

$$f'(x_0) = tg\alpha$$

$$\alpha - острый \Rightarrow tg\alpha > 0$$

$$f'(x_0) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0{,}5$$

Ответ: $f'(2) = 0{,}5$

# Самостоятельная работа

Напишите уравнение касательной к графику функции $y=f(x)$ в точке с абсциссой а.

1) $f(x) = x^2 + x + 1$, $a=1$

2) $f(x) = x - 3x^2$, $a=2$

# Ответьте на вопросы:

1. Что называется касательной к графику функции в точке?
2. В чем заключается геометрический смысл производной?
3. Сформулируйте алгоритм нахождения уравнения касательной?