





# \* ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

## Лекция 9

- 1.** Фенолы
- 2.** Простые эфиры


# \*ФЕНОЛЫ




## \*2. Классификация и изомерия

\*Как и спирты, фенолы бывают одноатомные (одна OH) и многоатомными (несколько OH).


\*Для фенолов характерна изомерия положения OH-группы и межклассовая изомерия



*o*-крезол  
(фенол)




бензиловый спирт  
(ароматический спирт)




анизол  
(простой эфир)


### \*3. Номенклатура




*пирокатехин*




*резорцин*




*гидрохинон*




*пирогаллол*



*о-крезол*




*м-крезол*



*п-крезол*





## \*4. Физические и биологические свойства



D.R.Allan, S.J.Clark, A.Dawson, P.A.McGregor, S.Parsons // Acta Crystallogr.,Sect.B, 2002, Vol.58, P.1018

01.01.1988

**Таблица.** Температуры плавления и кипения изомерных крезолов и метилфенилового эфира (C<sub>7</sub>H<sub>8</sub>O)

Формула	Название вещества	Температура плавления, °С	Температура кипения, °С
	анизол	-37	153
	о-крезол	30	191
	м-крезол	4	203
	п-крезол	36	202

- \* Фенол очень токсичен, при попадании на кожу вызывает ожоги. Фенол обладает хорошими дезинфицирующими свойствами; это было первое вещество, которое использовалось для дезинфекции (Дж. Листер, 1867)
- \* Фенолы входят в состав креозота - жидкости, получаемой из каменноугольной смолы и используемой для пропитки шпал для предотвращения их гниения. Очищенный креозот используется как антисептик в медицине.
- \* Пентахлорфенол применяется для пропитки древесины как антисептик, инсектицид и фунгицид. Пентахлорфенолятом натрия обработаны брёвна Кижских церквей.









## \* 5. Химические свойства



### \* 5.1. Кислотные свойства




## \* 5.1. Нуклеофильные свойства




### \*5.3. Электрофильное замещение в бензольном кольце





Пикриновая кислота представляет собой светло-желтые кристаллы,  $t_{\text{пл}} 122,5$  °С. Является мощным взрывчатым веществом. Применялась как взрывчатое вещество в кон. 19 – нач. 20 вв. под названиями мелинит (Россия, Франция), лиддит (Великобритания), шимоза (Япония) и с/88 (Германия). Применялась также как краситель для тканей.



\* Фенол взаимодействует с формальдегидом, образуя важные промышленные полимеры - фенолформальдегидные смолы






- \* Фенолформальдегидные смолы являются вязкими жидкостями или твердыми веществами. Отвержденные фенолоформальдегидные смолы обладают электроизоляционными и механическими свойствами. Применяются в производстве фенопластов, клеев, лаков, герметиков, фанеры, фенолформальдегидного волокна (кайнол).
- \* Фенолформальдегидные смолы являлись первыми промышленными синтетическими смолами; их производство под названием “бакелит” было начато в 1909 году.
- \* Также, в промышленности используются крезолоформальдегидные смолы, резорцино-формальдегидные смолы, феноло-анилино-формальдегидные смолы, фенолгексаметилентетраминовые смолы, феноло-фурфурольные смолы и смешанные смолы.

## \*5.4. Окисление фенолов



\* Производные бензохинона - убихиноны (коэнзимы Q) в митохондриях и пластохиноны в хлоропластах участвуют в переносе электрона и синтезе АТФ:




\* 5.5. Комплексообразование с солями железа(III) приводит к образованию окрашенных (сине-фиолетовых) комплексов, что используется для качественной идентификации фенольных гидроксильных групп в органических соединениях.


## \*6. Получение фенолов

6.1. Каменноугольная смола. Фенол был впервые выделен из каменноугольной смолы Рунге в 1834 году.

6.2. Гидролиз галогенопроизводных бензола




## \*6.3. Реакция запекания





## \*6.4. Метод Сергеева



Реакция открыта Р.Ю. Удрисом и Б.Д. Кружаловым в 1942 году в лаборатории, которой руководил П.Г. Сергеев.


В это время они были репрессированы и работали в лаборатории, которая была и местом заключения. Шарашка, где они работали, располагалась в Москве на шоссе Энтузиастов в “Химическом отделении” четвёртого Спецотдела НКВД СССР.

# \*ПРОСТЫЕ ЭФИРЫ


## \*1. Строение и классификация




*вода*




*спирт*




*простой эфир*



*смешанный эфир  
несимм.*




*несмешанный эфир  
симм*



Тетрагидрофуран - пример циклического эфира.

## \*2. Номенклатура

- \* Обычно простые эфиры называют по радикально-функциональной номенклатуре, перечисляя радикалы в виде прилагательного и добавляя слово эфир.
- \* По номенклатуре ИЮПАК эфиры называются как алкоксильные производные углеводородов, используя приставки алкокси-, алкенилокси-, арилокси- и т.д.




диметиловый эфир

метоксиметан


## \*3. Изомерия

### \*3.1. Структурная изомерия

#### \*3.1.1. Метамерия




*метилпропиловый эфир*




*диэтиловый эфир*

#### \*3.1.2. Изомерия углеродного скелета.



*метилбутиловый эфир*




*метилизобутиловый эфир*

### \*3.1.3. Межклассовая изомерия



*этанол*



*диметиловый эфир*



## \*4. Физические и биологические свойства






Рис.1. Температуры кипения спиртов и изомерных им несмешанных простых эфиров. n - число атомов углерода в молекуле.

- \* Простые эфиры являются довольно инертными соединениями, и значит относительно малотоксичными. Простые эфиры проявляют наркотические свойства: диэтиловый эфир широко использовался и используется для наркоза.
- \* Некоторые простые эфиры являются очень токсичными, так супертоксиканты **диоксины** - являются полихлорированными производными дибензодиоксина:



## \* 5. Химические свойства

### \* 5.1. Основные свойства



### \* 5.2. Расщепление эфиров




## \*5.3. Окисление эфиров

- \* При длительном контакте с кислородом в эфире накапливаются чрезвычайно взрывчатые гидроперекиси, которые могут образовать кристаллический осадок на дне ёмкости с эфиром.
- \* Особенно склонен образовывать такие соединения диизопропиловый эфир.

## \*7. Получение простых эфиров

### \*7.1. Межмолекулярная дегидратация спиртов



### \*7.2. Синтез Вильямсона





**Спасибо  
за  
Ваше внимание!**