



АЗБУКА СПИДА



СПИД


Носителями в мире уже
являются более 40 млн.




Сейчас давайте посмотрим на слайд, который хорошо иллюстрирует проблему СПИДа. Этот мужчина на лодке говорит другому: "Не бойся, это только несколько ветвей". Но он не видит опасный ствол под водой. Что случится, если они поедут дальше?




ВИЧ















Первая стадия: антитела к ВИЧ (а именно по их обнаружению в крови говорят об ВИЧ-инфицированности) появляются только через 3-6 месяцев после заражения. В этот период тесты на ВИЧ будут давать отрицательные результаты!



Вторая стадия - ВИЧ-носительство, бессимптомное течение ВИЧ-




Третья стадия - возникает через
несколько лет после заражения.




Четвертая стадия - собственно СПИД








ВИЧ инфицированные в России:







Айзек Азимов




Джиа Мария Караджи -



ТОМО



Рудольф Нуриев – великий русский танцор.



Майлс Дэвис – джазовый музыкант.



Артур Эш - теннисист



Лидер группы «QUEEN» - Фредди































Вопрос	Верно	Неверно
1. Опасно обнимать человека, больного СПИДом		
2. Заразиться ВИЧ можно, пользуясь общественным туалетом		
3. Люди, которые делают себе внутривенные инъекции, не должны пользоваться иглами и шприцами других людей.		
4. Нельзя заразиться вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), кусая один и то же бутерброд или, когда пьешь -из одного стакана с человеком, больным СПИДом		
5. Можно заразиться ВИЧ, если имел только один сексуальный контакт без использования презерватива		
6. ВИЧ можно заразиться, если ВИЧ-инфицированный или больной СПИДом чихает или кашляет на тебя		
7. СПИД - конечная стадия инфекции, вызываемой ВИЧ		
8. Положительный результат теста на ВИЧ означает, что человек болен СПИДом		
9. ВИЧ поражает красные кровяные тельца		
10. ВИЧ передается через все жидкие выделения человеческого организма		
11. ВИЧ передается только тремя путями: - через кровь (например, при совместном пользовании шприцами и иглами), - половым путем, - от матери к ребенку во время внутриутробного развития, рождения, кормления грудным молоком		
13. Правильное использование презерватива помогает избежать передачи ВИЧ половым путем		
14. Многие симптомы СПИДа напоминают симптомы других заболеваний		
15. Одна из проблем, связанных с ВИЧ/СПИДом, состоит в том, что между заражением ВИЧ и моментом проявления заболевания могут пройти годы		

