

Лечение неотложных состояний

Кадырова Д.М.

2016 г.

Анафилактический шок

Клиника

Быстрое падение АД

Нарушение сознания

Бронхоспазм

Анафилактический шок

Лечение

Адреналин 0,1 %

Норадреналин внутривенно

Допамин внутривенно, капельно

Инфузионная терапия декстран, NaCl

Гормональная терапия дексаметазон – капельно, преднизолон -
внутривенно струйно, метилпреднизолон – внутривенно струйно

Бронхолитические средства

Клемастин внутривенно , димедрол , аминафиллин - внутривенно
струйно, салбутамол через небулайзер , увлажненный кислород

Лечение гипертонического криза

140/90

1. Ингибиторы АПФ
2. Блокаторы ангиотензиновых рецепторов
3. Антагонисты кальциевых каналов
4. Диуретики
5. Бета – адреноблокаторы

6. Каптоприл (Сублингвально)
7. Нефидипин (Сублингвально)

Гипертонический криз, осложненный инфарктом миокарда

1. Нитроглицерин (Сублингвально)
2. Пропранолол (струйно)

Сохраненное высокое АД

1. Эналаприл внутривенно (на изотоническом растворе NaCl)
2. Морфин внутривенно (на изотоническом растворе NaCl)
3. Варфарин или ацетилсалициловая кислота (разжевать)

Левожелудочковая недостаточность

1. Эналаприл внутривенно (на изотоническом растворе NaCl)
2. Фуросемид внутривенно (на изотоническом растворе NaCl)

Нарушение мозгового кровообращения

Эналаприл внутривенно (на изотоническом растворе NaCl)

Эклампсия

1. Магния сульфат

Гломерулонефрит

1. Фуросемид внутривенно
2. Нефидипин внутрь

Стенокардия

1 линия

Нитроглицерин, изосорбида динитрат, метопролол, бисопролол, карведилол, небиволол, амлодипин, дилтиазем, верапамил, нифедипин

2 линия

Ивабрадин, триметазидин, никорандил, изосорбида мононитрат

Профилактика

Ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, антиатеросклеротические средства

Бронхиальная астма

1 ступень – сальбутамол, фенотерол

Альтернативные – ипратропия бромид

Пероральные B₂ - агонисты

2 ступень – беклометазон , будесонид, флутиказон+
ингаляционные короткодействующие

Альтернативные – монтелукаст

Обострение

Сальбутамол или ипратропия бромид через небулайзер