



**ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ  
ДИАГНОСТИКА  
СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИИ И  
ДИСЛАЛИИ**



- Наибольшую сложность при проведении дифференциальной диагностики, по общему мнению многих исследователей, представляет разграничение стертой псевдобульбарной дизартрии и дислалии. Данное разграничение следует проводить, так как коррекция имеющихся при дизартрии дефектов оказывается более сложной.



## АНАМНЕЗ

**Д**ИАГНОЗ СТРОИТСЯ НА ДАННЫХ ТЩАТЕЛЬНО СОБРАННОГО АНАМНЕЗА, ГДЕ УТОЧНЯЮТСЯ ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА НАЧИНАЯ С УТРОБНОГО ПЕРИОДА, ХАРАКТЕРА РОДОВ И РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. **З**ДЕСЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ НА ПРОТЕКАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У МАТЕРИ С УЧЕТОМ ТЕХ ВРЕДНОСТЕЙ, С КОТОРЫМИ СВЯЗАН ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОДА, НАЛИЧИЕ РОДОВЫХ ТРАВМ, АСФИКСИИ. **Н**АКОНЕЦ, ВАЖЕН ХАРАКТЕР ПЕРЕНЕСЕННЫХ РЕБЕНКОМ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ. **О**ЧЕНЬ ВАЖНО УТОЧНИТЬ У РОДИТЕЛЕЙ, КАК ПРОТЕКАЛИ ЛЮБЫЕ ДЕТСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НЕ СОПРОВОЖДАЛИСЬ ЛИ ОНИ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ, СУДОРОГАМИ, ПРИПАДКАМИ. **В** КЛИНИКЕ ИЗВЕСТНО, ЧТО ИНОГДА ПРОТЕКАНИЕ ОБЫЧНЫХ ДЕТСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ — КОРИ, КОКЛЮША, ВОСПАЛЕНИЯ ЛЕГКИХ, ГРИППА И ДР. — МОЖЕТ ОСЛОЖНИТЬСЯ ПОРАЖЕНИЕМ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТЫ), ЧТО В ПРАКТИКЕ НЕ РЕДКО НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ.



## Дислалия

У соматически ослабленных детей. Органики нет.


## Стертая дизартрия

Связана с поражением центральной нервной системы.



## Дислалия

Неврологическая симптоматика отсутствует.



## Стертая дизартрия

Ярко выражена асимметрия лица, языка, мягкого неба; рот в покое приоткрыт из-за пореза губ; сглаженность носогубных складок.



## Дислалия

Двигательная сфера без патологии, сухожильные рефлексы живые, равномерные.

## Стертая дизартрия

Страдает общая, мелкая и артикуляционная моторика.



## Дислалия

Страдает только звукопроизношение.  
Прогноз благоприятный.

## Стертая дизартрия

Наряду со звукопроизношением страдает просодика; поставленные звуки автоматизируются с трудом.



## Дислалия

Голос звонкий, громкий, богато модулированный.

## Стертая дизартрия

Голос глухой, слабый, сдавленный, затухающий, прерывистый.



Дислалия

Стертая дизартрия

Речевая активность  
повышена.

Речевая активность  
снижена.



## Дислалия

К своему дефекту ребенок критичен.

## Стертая дизартрия

К дефекту относится безразлично.



## Дислалия

Вегетативные нарушения проявляются в потливости конечностей, в красном дермографизме кожи.

## Стертая дизартрия

Вегетативные нарушения грубо выражены: синюшные, холодные, влажные конечности.



Дислалия	Стертая дизартрия
<p>Гигиенические навыки вырабатываются быстро, удерживаются стойко; внешне ребенок опрятен.</p>	<p>Гигиенические навыки из-за моторных нарушений вырабатываются с трудом, ребенок неопрятен.</p>



## Дислалия

Сон спокойный без ночных страхов и сновидений.

## Стертая дизартрия

Наблюдаются расстройства сна, ночные страхи, сновидения.



## Дислалия

Диафрагмально-речевое дыхание в норме.



## Стертая дизартрия

Дыхание поверхностное, ключичное, диафрагмально-речевое — не сформировано.



## Дислалия

В контакт ребенок входит легко, поведение адекватное.

## Стертая дизартрия

Поведение неровное, часты перепады настроения.



Дислалия	Стертая дизартрия
Память, внимание, работоспособность, мыслительные процессы, интеллект – в норме, редко наблюдается ЗПР.	Память снижена, кратковременна; внимание неустойчивое; низкая работоспособность; интеллект снижен (ЗПР, олигофрения)



## Дислалия

Ребенок активен, подвижен, занимается охотно, без особого труда переключается с одного вида деятельности на другой

## Стертая дизартрия

Медлительны или расторможены, уклоняются от занятий, жалуются на головную боль, с трудом переключаются с одного вида деятельности на другой



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

