

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение городского округа Балашиха
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

**ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ.
ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ
ПОЛОВЫМ ПУТЁМ**

9 КЛАСС

Цели:

- Сформировать ценностное отношение к своему здоровью.
- Познакомить учащихся с признаками основных инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), и причинами их распространения.
- Обсудить основные меры профилактики ИППП.

Инфекции, передаваемые половым путем



ЧТО ТАКОЕ ИППП?

Существуют около тридцати заболеваний, которые объединили в одну группу, потому что все они передаются человеку при сексуальных контактах.

Их сокращенно называют ИППП – инфекции, передаваемые половым путем.

Причинами ИППП могут быть различные возбудители:
вирусы, бактерии, дрожжевые грибы, простейшие и даже членистоногие насекомые.

ИППП имеют общие признаки:

- 1. Передаются при сексуальных контактах.**
- 2. Имеют скрытый период. От момента проникновения в организм до появления каких – либо признаков заболевания может пройти от 3 дней до 6 месяцев, иногда даже до нескольких лет.**
- 3. Часто протекают скрыто (без каких – либо проявлений) и случайно выявляются при обследовании.**
- 4. Повреждают многие органы и ткани организма (мочеполовую систему, нервную систему, печень, сердце, кожные покровы).**
- 5. Более раннее начало лечения чаще приводит к выздоровлению.**
- 6. Самопроизвольно не излечиваются.**

ИППП имеют общие признаки:

- 7. Приводят к большому количеству осложнений (бесплодие, импотенция, параличи, рак, поражение кожи и суставов, потеря зрения и прочее).***
- 8. Некоторые из этих заболеваний передаются через кровь (нестерильные иглы, шприцы, инструменты для татуировок, прокалывание ушей).***
- 9. Часто встречается сочетание нескольких ИППП у одного человека. Возбудители ИППП легко передаются от человека человеку.***

Какие заболевания относятся к ИППП?

Долгое время к числу ИППП относили общеизвестные заболевания:

- ✓ сифилис;
- ✓ гонорея;
- ✓ урогенитальный кандидоз (молочница).

В последнее время появилась группа ИППП второго поколения:

- ✓ трихомониаз;
- ✓ хламидиоз;
- ✓ генитальный герпес;
- ✓ венерические бородавки;
- ✓ гепатиты В и С;
- ✓ ВИЧ – инфекция;
- ✓ лобковый педикулез, чесотка.

Сифилис вызывается бледной спирохетой (трепонемой). Передается контактно-

Трихомоноз вызывается простейшим организмом – трихомонадой. Пути передачи – контактно- – купание в грязных водоемах, в том числе и в общественных банях.



Симптомы трихомоноза схожи с симптомами гонореи, поэтому лечение должно быть направлено на достижение комфорта в половых путях. Лечение включает прием антибиотиков и прочие препараты. Требуется лабораторная диагностика с целью определения возбудителя.

Заболевание излечимо.

отсутствует.

СПИД -

финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и передающаяся при половом контакте и с кровью человека



РИСК ЗАРАЖЕНИЯ СПИДОМ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ


ГРУППЫ РИСКА:

- 1 НАРКОМАНЫ
- 2 БИСЕКСУАЛИСТЫ
- 3 ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ



ПРИ БЕСПОРЯДОЧНЫХ
ПОЛОВЫХ СВЯЗЯХ

ПРИ СЕКСУАЛЬНЫХ
КОНТАКТАХ
С НЕЗНАКОМЫМИ
ЛЮДЬМИ



Заболевание ВИЧ длится в среднем от 1 до 10 лет и включает следующие стадии

Инкубационный период: от 2-4 недель до 8 месяцев

Первичные проявления болезни, выражающиеся в увеличении лимфатических узлов, лихорадочном состоянии, потливости в ночное время, головной боли, кашле. Они проходят достаточно быстро и как будто бесследно

Латентный период. Проявления болезни отсутствуют. Длится чаще 1-3 года. Прежде чем развернуться полной картине заболевания у больного отмечаются еще две следующие стадии

Лимфаденопатия - стойкое увеличение лимфатических узлов: шейных, подчелюстных, затылочных, но, как правило, не паховых

Ассоциируемый со СПИДом симптомокомплекс, характеризующийся постепенным повышением температуры до 38-39°С, недомоганием, сонливостью, сильной утомляемостью, обильным потоотделением особенно в ночное время, потерей аппетита, расстройством деятельности кишечника, зудом кожных покровов

Собственно СПИД, проявляющийся тяжелыми заболеваниями, которыми не страдают люди со здоровой иммунной системой

СПИД НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ



ЧЕРЕЗ СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩИМ ТУАЛЕТОМ



ПРИ СОВМЕСТНОМ КУПАНИИ В БАССЕЙНЕ

БЕЗОПАСНО:

1 ДОНОРСТВО,

2 ПОСЕЩЕНИЕ ПОЛИКЛИНИК, БОЛЬНИЦ

ПРИ РУКОПОЖАТИИ
ПРИ ПОЦЕЛУЕ



ЧЕРЕЗ СЛЕЗЫ, СЛЮНУ И ПРИ ЧИХАНИИ И КАШЛЕ


ЧЕРЕЗ УКУСЫ НАСЕКОМЫХ

ЧЕРЕЗ УКУСЫ ЖИВОТНЫХ



Что делать, если выявили ИППП?

- *Как можно раньше начать лечение, назначенное врачом.*
- *Обязательно соблюдать режим и дозировку приема лекарств.*
- *Позаботиться о том, чтобы защитить себя от ИППП в будущем.*



Если ИППП не лечить или заниматься самолечением, то:

- ***они могут вызывать тяжелые осложнения;***
- ***поздно начатое лечение может оказаться неэффективным.***



Заведомо известное заражение другого лица венерической болезнью наказывается по статье 121 УК РФ 1997 г. :

штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда

или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев

либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет

либо арестом на срок от трех до шести месяцев

Ответственность за заражение другого лица ВИЧ-инфекцией (Статья 122 УК РФ 1997 г.)

Заведомое поставление другого
лица в опасность заражения

Заражение другого лица лицом,
знавшим о наличии у него
ВИЧ-инфекции

ограничение свободы
на срок до трех лет

либо арест на срок от
трех до шести месяцев

либо лишение свободы
на срок до одного года

лишение свободы на
срок до пяти лет

Как можно избежать заражения ИППП?

- ⇒ *Воздерживаться от внебрачных сексуальных контактов.*
- ⇒ *Отказаться от контактов со случайными сексуальными партнерами.*
- ⇒ *Сохранять взаимную верность с единственным сексуальным партнером (обязательно здоровым).*
- ⇒ *Правильно использовать качественный презерватив при каждом сексуальном контакте.*
- ⇒ *Не использовать в медицинских целях нестерильные иглы, шприцы, чужие инструменты.*
- ⇒ *Соблюдать правила личной гигиены.*
- ⇒ *Не брать чужие и не давать другим людям свои вещи (белье, одежду, полотенца и прочее).*
- ⇒ *Воздержаться от употребления алкоголя и наркотических веществ. Под их воздействием часто совершаются необдуманные поступки.*

Профилактика ЗППП и ВИЧ



в
н
л
л
л
о

е правил
других
ивания крови



партнерами

с
л
л
л
л

