

Мерез – *Treponema pallidum* – мен шақырылатын, тері қабаттары мен ішкі ағзаларды, сүйектер мен ОЖЖ зақымдаумен көрініс беретін жұқпалы венерологиялық ауру.

Эпидемиологиясы:

- * Мерез антропонозды ауру тобына жатады.
- * Инфекция көзі- ауру адам болып табылады.
- * Негізгі жұғу жолы-жыныстық қатынас арқылы, сирек тұрмыстық және транспланцентарлы жолмен жұғады.

Клиникалық көріністері:

Инкубационный кезең 3-4 аптаға созылады.
Инкубациялық кезеңнен соң мерез жүйелі түрде өтеді:

- * -біріншілік,
- * -екіншілік,
- * -үшіншілік .




инкубационного
кезеңнен соң
басталады

- **Біріншілік кезең** – қатты шанкрдың пайда болуымен көрінеді, яғни жыныс жолдарының, ауыздың, анустың шырышты қабатында жиектері тығыз, қатты жаралар пайда болады. Ұзақтығы 6-7 апта.


- **Екіншілік кезеңде** -тері мен шырышты қабаттарда папулезды, везикулярлы немесе пустулезды бөртпелер пайда болады. Сонымен бірге бауыр, бүйрек, сүйектер, ОЖЖ мен жүрек-қан тамыр жүйесі зақымдалады. Бұл кезең ұзақ жылдарға созылады (2-4).






- Кейін 10 жылдан аса уақытқа созылатын **Үшінші кезең** дамиды. Мұнда мерездік бугороктар (гумм) пайда болады. Бугороктар және гуммдар өзара ыдырауға бейім, сол себепті ішкі ағзалардың құрылымдық бұзылысына алып келеді..

- **Емделмелмеген жағдайда 4 кезең дамиды-нейросифилис.** Бұл кезеңде ОЖЖ зақымдалуымен өршитін салдану пайда болады.



Гонорея (Соз)



– **Гонорея** – бұл жыныстық жолмен берілетін және зәр шығару жолдарының шырышты қабаттарының іріңді қабынуымен сипатталатын адамның жұқпалы ауруы. Қоздырғышы:

- **Neisseriaceae тұқымдастығына жататын, N.gonorrhoeae – мен шақырылады.**
- **Жиі әйелдерде симптомсыз жүреді, сондықтан инфекцияның негізгі резервуары – әйелдер болып табылады.**
- Жұғу көзі-науқас адам, әсіресе созылмалы симптомсыз гонореямен ауыратын адам.
- **Берілу жолы-жыныстық қатынас арқылы**, сирек тұрмыстық (ортақ мачалканы қолдану, бет орамалын ортақ қолдану).

Клинкалық сипаттамасы:

- Ауру қоздырғышы тек жыныс мүшесінің шырышты қабығын қабындырып қана қоймай, көздің, ауыздың, тік ішектің шырышты қабатын зақымдайды. Жасырын кезең 2-3 аптаға созылады.
- Науқастың денесі күйіп, қышына бастайды
- Кіші дәретке отырғанда ауырады
- Дене қызуы көтеріліп, табеті төмендейді
- Ер адамдарда үрпіден басталса, әйелдерде жатыр мойнына басталады
- Әйелдерде жатыр іріңге толып, белі мен іші төмен тартып ауырады
- Ауру асқынғанда кіші дәретке отыру қиындап, несепке қан араласады
- Ерлерде, әйелдерде толық жазылмаса бедеулікке ұшырайды





*Салауатты
өмір салтын
сақтайық!!!