


КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ И ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКЕ





Автор - студентка 11 группы
МФ № 3, VI курса

Малиновская Н.Д.

Почечная колика

- это острый приступ болей в поясничной области, вызванный резким нарушением оттока мочи из почки и нарушением кровообращения в ней. Боль обусловлена перерастяжением почечной лоханки под давлением не оттекающей мочи.







75%

■ Почечная колика

■ Другие урологические заболевания

патогенез

- Остро возникшей механической преградой, которая нарушает пассаж мочи;
- Воспалительным процессом в чашечно-лоханочной системе;
- Гемодинамическими нарушениями в почке, которые вызывают ишемию, артериальную и венозную гипертензию, тромбоемболические процессы в сосудах почки;
- Аллергическими реактивными явлениями в слизистой оболочке верхних мочевых;
- Спастическими явлениями в верхних мочевых путях, которые возникают рефлекторно при холецистите, аппендиците, инфаркте миокарда, во время менструального цикла и т.д.

Причины ПК:

- Мочекаменная болезнь
- Нарушение минерального обмена
- Пиелонефрит
- Нефроптоз
- Аномалии развития
- Гидронефроз
- Заболевания предстательной железы
- Опухоли
- Постлучевые стриктуры мочеточников
- Периуретерит



Клиническая картина:

1. Болевой синдром – 100%
 - а) боль в поясничной области – 93%
 - б) боль в брюшной области – 7%
2. Позитивный симптом Пастернацкого- 87,8%
 - а) резко позитивный – 65,3%
 - б) слабопозитивный – 22,5%
3. Боль в поясничной области без иррадиации – 18%
4. Боль с типичной иррадиацией – 36%
5. Боль с атипичной иррадиацией – 46%
 - а) в брюшную полость – 39%
 - б) в грудную полость и плече – 7%

Дизурия – 45,4%

Тошнота – 56%

Рвота – 41%

Повышение артериального давления – 92,6%

Повышение температуры тела в первые 2-3 дня (до 38С) - 38%



Лечение:

- Если t° пациента позволяет, то хорошо помогают теплые грелки, приложенные на область поясницы и низ живота, общая теплая ванна;
- баралгин в виде инъекций внутривенных или внутримышечных
- но-шпа таблетки
- смесь глюкозы и новокаина с платифиллином, баралгином и но-шпой в виде капельниц
- анальгин с пипольфеном и платифиллином внутримышечно
- галидор с пипольфеном внутримышечно
- атропин подкожно
- спаздолзин в виде свечей
- диклофенак в виде свечей или таблеток
- промедол с папаверином
- димедролом и но-шпой.



Лечение:

В последующем после снятия боли, назначаются препараты для нормализации работы мочевыделительной системы:

- урокалун
- ЛИТОВИТ
- СПАЗМОЦИСТЕНАЛ
 - пинабин
 - ОЛИМЕТИН
 - ависан.



СПАСИБО ЗА

Е Аплодировать можно сидя