



Бражник скабіозовий

Метелики активні вдень, живляться нектаром квітів. У сприятливі роки можливий розвиток другої генерації. Гусінь розвивається з травня до серпня. Черевце пухнасте, з чорними та бурими перев'язками, на кінці черевця є щіточка з темних видовжених лусочок.

Червона Книга Закарпаття



Підготував учень
5-А класу
Іляшко Іван




Бамбузіна Бребіссона

Ниткувата водорізь, нитки неприкріплені, зелені, слабо зігнуті. Клітини бочкоподібні, з хвилястими боками посередині, зрізаною верхівкою.

Ящірка зелена

Загальна довжина старих самців може перевищувати 38 см.

Характерними ознаками є довгий хвіст і значна довжина задньої ступні



Жимолость синя

Гілки з буруватою корою, яка розщепляється на довгасті смуги, що відслонюються від стовбурця і звисають. Листки довгасто-еліптичні або яйцеподібно-довгасті.

Трохета Биковського

Тіло дуже видовжене, відношення ширини тіла до довжини 1 : 14. В передній частині тіло циліндричне. Задня присоска невелика. Поверхня тіла гладенька. Забарвлення світло-сіре з помітним жовтуватим відтінком. Довжина — 100-140 мм.



Дрочок крилатий

Хамефіт. Кущ 15-30 см заввишки, із плескатим крилатим стеблом, при основі відстовбурчено-волосистим. Листки яйцеподібно-ланцетні, опушені. Квітки зібрані у верхівкову щільну китицю, жовті.

Підорлик малий

У дорослого птаха оперення буре, верх голови і задня частина шиї світліші; на надхвісті нерідко буває біла смуга; махові пера темно-бурі, покривні пера крил бурі або світло бурі; цівка вкрита пір'ям.



Клаваріадельф товкачиковий

Плодове тіло широкобулавоподібне, 7-15, інколи до 30 см завдовжки, 2-4, до 6 см у діаметрі, іноді сплющене, поздовжньозморшкувате, м'ясисте, світло-жовте, згодом вохряно-жовте, рудувате.