


ЛЕКЦИЯ № 25

СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРЯМОЙ КИШКИ

**ТРЕЩИНЫ ЗАДНЕГО ПРОХОДА, ГЕМОРРОЙ, ОСТРЫЙ И
ХРОНИЧЕСКИЙ ПАРАПРОКТИТ, ВЫПАДЕНИЕ ПРЯМОЙ
КИШКИ.**



- ◎ **Прямая кишка** – это самый дистальный отдел толстого кишечника, именной ей и заканчивается пищеварительный тракт человека.
- ◎ **Прямая кишка** состоит из верхней широкой части – ампулярная часть, и более узкой – заднепроходной, вокруг которой располагается мышечный сфинктер.

Прямая кишка легко доступна для обследования. Для этого больному необходимо принять **позу на корточках**. В этом положении можно увидеть выпадение прямой кишки и геморроидальные узлы. **Пальцевое исследование** проводят при положении больного на боку с прижатыми к животу ногами.

Это исследование помимо патологии в полости прямой кишки поможет оценить состояние окружающей кишку жировой клетчатки.

Понятие о колопроктологии.

Колопроктология - отрасль медицины, изучающая заболевания прямой кишки, толстой кишки и тканей околокишечной зоны.

Colon (лат.) - толстая кишка, **proctos** (греч.) - прямая кишка.

Факторы риска в развитии заболеваний прямой кишки.

Предрасполагающими к возникновению анальной трещины

- колиты,
- энтероколиты,
- геморрой и др.

Часто трещина сочетается с хроническими заболеваниями: гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистит.

Факторы риска при геморрое

- сидячий образ жизни,
- неправильное питание, запоры,
- беременность,
- злоупотребление алкоголем.

Предрасполагающими факторами возникновения острого парапроктита

- ослабление местного и гуморального иммунитета при истощении, алкоголизме, вследствие острой или хронической инфекции (ангина, грипп, сепсис);
- сосудистые изменения при сахарном диабете, атеросклерозе; запор, понос;
- наличие геморроя, трещин заднего прохода и др.

К предрасполагающим причинам выпадения прямой кишки относятся:

- наследственный фактор, особенности конституции организма и строения прямой кишки,

приобретенные дегенеративные изменения в мышцах запирательного аппарата и в стенке прямой кишки.

Непосредственными причинами выпадения прямой кишки могут быть острые и хронические желудочно-кишечные заболевания, тяжелый физический труд, истощение, тупые травмы живота, тяжелые роды.

В 12-13 % наблюдений выявляются относительно редкие причины заболевания - гомосексуализм, операции на органах малого таза и т. д.

Трещина заднего прохода

Анальная трещина - спонтанно возникающий линейный или эллипсовидный дефект слизистой оболочки анального канала.

Причины:

- длительные запоры;
- поносы;
- механические травмы;
- острицы и другие гельминты.

Клиника:

Для анальной трещины характерна *триада симптомов:*

боль в заднем проходе во время или после дефекации,
спазм анального сфинктера,
скудное кровотечение во время дефекации.



Осмотр:

В области задней спайки - трещина щелевидной формы, края плотные, омозолистые.

Пальцевое исследование - боль и спазм сфинктера. Палец в перчатке смазывают вазелином и вводят в прямую кишку. Определяют тонус сфинктера: наличие опухолей, болезненные точки, рубцы, размеры предстательной железы у мужчин.

Инструментальные методы диагностики, такие как

***ано-* или *ректороманоскопия*, у больных с анальной трещиной с выраженным болевым синдромом и спазмом сфинктера без обезболивания не выполняются. Необходимая ректороманоскопия на высоту до 20-25 см может быть выполнена после заживления трещины.**

ОСЛОЖНЕНИЯ

- ВЫРАЖЕННЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ,**
- КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ СТЕНОК АНАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ,**
- ОСТРЫЙ ПАРАПРОКТИТ.**

ЛЕЧЕНИЕ

- 1) ВОСХОДЯЩИЙ ДУШ, СИДЯЧИЕ ВАННЫ С РАСТВОРАМИ РОМАШКИ, ФУРАЦИЛЛИНОМ, ДИЕТА;**
 - 2) РАСТИТЕЛЬНЫЕ СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА: РЕГУЛАКС;**
 - 3) СВЕЧИ С АНЕСТЕЗИНОМ, АНУЗОЛОВЫЕ СВЕЧИ.**
- ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭФФЕКТА - ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО.**

Геморрой.


- ◎ Термин «геморрой» обозначает патологическое увеличение геморроидальных узлов, которое проявляется периодическим кровотечением из узлов, их выпадением из анального канала и частым воспалением.

Предрасполагающие факторы:

- слабость венозной стенки;
- длительные хронические запоры и поносы;
- нарушения мочеиспускания;
- эндокринные нарушения;
- заболевание кожи в анальной области.


Заболевание имеет две основные формы –
острую и хроническую.

По расположению различают
наружный и внутренний геморрой.



Степени тяжести внутреннего геморроя:

1. Первая степень – обнаруживаются отечные и, возможно, кровоточащие, но не выпадающие геморроидальные узлы;
2. Вторая степень – узлы выпадают и могут вправляться самостоятельно;
3. Третья степень – выпавшие узлы можно вправить только инструментально или с помощью манипуляции руками;
4. Четвертая степень – узлы вправить не удается.



Клиника:

В начале заболевания: мучительные боли, зуд, жжение, чувство «полноты» в области заднего прохода.

Затем: частые позывы к дефекации, появлению слизи и кровотечения различной интенсивности от нескольких капель до струйного, кровь алая, не смешана с каловыми массами.

При осмотре и исследовании определяются «узлы» или «шишки». Узлы могут выпадать при физической нагрузке, дефекации. Сначала они вправляются самостоятельно, затем выпадают даже при ходьбе и после вправления сразу же появляются вновь.

◎**При постановке DS** используют пальцевое исследование, ректороманоскопию, колоноскопию.

Осложнения:

- 1. Кровотечение**
- 2. Выпадение геморроидальных узлов**
- 3. Тромбоз геморроидальных узлов**
- 4. Инфекционные осложнения**


Лечение:

консервативное и комплексное:


- а) диета:** растительная пища, фрукты, овощи, соки, грубая клетчатка (овсяная каша, хлеб с отрубями).
- б) борьба с хроническими запорами:** диета плюс слабительные растительного происхождения: плоды жостера, кора крушины, листья сенны, регулакс и химические препараты;
- в) ежедневный прием холодной воды натощак 1 стакан, подмывать область заднего прохода, принимать **холодный душ**;**
- г) ректальные свечи перед сном:** проктоседил, ультрапрот, анузол, обезболивающие с анестезином и беладонной, прамоксин и др. Свечи перед сном.

◎ Сегодня в медицинской практике широко распространены **малоинвазивные методы лечения геморроя**, применяемые в амбулаторных условиях. К ним относятся **инфракрасная фотокоагуляция, склеротерапия, лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами, перевязка геморроидальных сосудов под контролем ультразвуковой допплерометрии** и другие.

◎ На поздних стадиях заболевания выполняется операция (**геморроидэктомия**).




Инъекция
склерозирующего
препарата



Кольцо вокруг
геморроидального
узла

Геморроидэктомия



Отсечение
геморроидальных
узлов

Профилактика геморроя


- Обязательно пить достаточно жидкости.**
- Избегать напряжения при дефекации.**
- Носить хлопковое белье.**
- Избегать туалетной бумаги с ароматизаторами и красителями.**
- Избегать резкого поднятия тяжестей.**
- Адекватная физическая нагрузка помогает сохранять сосуды в тонусе.**
- Избегать запоров. Включать в рацион большое количество продуктов с высоким содержанием клетчатки.**
- Приучите организм к дефекации в одно и то же время.**
- Избегать задержки дыхания во время прохождения стула.**
- Выходите из туалета, как только вы закончите процесс дефекации.**
- Избегать длительного сидения или стояния.**
- Если женщина беременна, рекомендовано спать на боку (это позволит снизить давление на кровеносные сосуды в области таза).**

Острый и хронический парапроктит.

Острый парапроктит - острое воспаление околопрямокишечной клетчатки.

◎ Воздушителем инфекции являются стафилококки и стрептококки в сочетании с кишечной палочкой, протеом. Специфическая инфекция (туберкулез, актиномикоз, клостридии) - достаточно редкое явление – 1-2%.

Гнойники могут располагаться под слизистой оболочкой или под кожей.



i На рисунке показаны:

Периректальный абсцесс (1), который образовался на месте очага воспаления тканей, окружающих прямую кишку (2).

Гной из абсцесса прорвался наружу, образовав свищ (3) заднего прохода.

Клиника:

Заболевание начинается остро, температура до 39-40 градусов С, озноб, боль в области заднего прохода, усиливающаяся при дефекации. При локализации гнойника в подкожной клетчатке клинические проявления выражены более ярко и определенно: болезненный инфильтрат в области заднего прохода, гиперемия кожи, повышение температуры тела.

Осмотр:

Припухлость, болезненность, гиперемия кожи, иногда может быть флюктуация, увеличение регионарных лимфоузлов. При глубоких гнойниках - позывы на стул и учащенное мочеиспускание.



*Лечение острого
парапроктита только
хирургическое.*

Операция относится к
разряду неотложных.

◎ Основные задачи
радикальной операции -
обязательное вскрытие
гнойника, дренирование
его, поиск и нахождение
гнояного хода, ликвидация
хода.

Осложнения.

- гнойное расплавление
стенки прямой кишки,
- гнойное расплавление
уретры,
- прорыв гноя в
брюшную полость и
забрюшинное
пространство,
- прорыв гнойника в
просвет прямой кишки
или влагалище,
- свищ прямой кишки.

Выпадение прямой кишки.


Выпадение прямой кишки - выход наружу всех слоев прямой кишки через заднепроходное отверстие.

Предрасполагающие факторы:

- ⦿ врожденная слабость связочного аппарата, долихосигма, чрезмерная подвижность сигмовидной и прямой кишок и др.
- ⦿ дисфункция кишечника (особенно запор), женский пол, бесплодие, неврологические изменения (травма спинного мозга, повреждение конского хвоста, старческие изменения).



Различают выпадение четырех степеней:



- а - выпадение слизистой оболочки анального канала (I степень), чаще во время акта дефекации, по окончании которого она быстро вправляется без посторонней помощи;**
- б - выпадение заднего прохода (II степень).** Слизистая оболочка заднего прохода, выпавшая при акте дефекации, медленно вправляется самостоятельно;
- в - выпадение прямой кишки (III степень).** При легком натуживании, кашле возникает выпадение всех слоев стенки прямой кишки. Вправление ее удается только с помощью пальцев. Появляется недержание газов и жидкого кала, учащаются кровотечения из прямой кишки. Сфинктер заднего прохода после вправления выпавшего отдела кишки остается расслабленным и чаще зияет.
- г - выпадение прямой кишки и заднего прохода (IV степень).** Выпадение кишки может происходить без какого-либо физического усилия, а лишь при принятии больным вертикального положения. Вправить выпавшую кишку удается с большим трудом.

Клиника:

Дискомфорт в области заднего прохода, мутные кровянистые выделения. При осмотре: слизистая растянута, отечна. Выпавший участок может ущемиться и некротизироваться.

Диагноз устанавливается при осмотре и потуживании в положении на корточках (как при дефекации).

Если кишка самостоятельно вправляется, то мышцы тазового дна, находятся в стадии компенсации. Необходимость ручного пособия для вправления прямой кишки свидетельствует о декомпенсации мышц тазового дна, что следует обязательно учитывать при выборе способа лечения.

Лечение:

- ◎ Консервативное при 1 и 2 степени. Применяют витамины, белковые препараты и препараты железа, а также средства, направленные на борьбу с запорами и поносами. Назначают также сидячие теплые ванны, электростимуляцию сфинктера заднего прохода.
- ◎ Хирургическое: если выпадения принимают постоянный характер (укрепление заднего прохода путем его сужения).

Доврачебная помощь при травмах прямой кишки, выпадении слизистой прямой кишки, кровотечении, выпадении и ущемлении геморроидальных узлов.

Повреждения толстой кишки могут быть следствием тупой и острой травмы, а также воздействия химически активных веществ. Разрыв прямой и ободочной кишки может возникнуть от внезапного повышения внутрикишечного давления, при промывании кишечника, клизме, неосторожном использовании технических средств и т. п. Наиболее часто ранения толстой кишки наблюдаются в военное время. В основном, это огнестрельные ранения (пулевые и осколочные), а также травмы, полученные при сдавливании брюшной полости, при падениях с высоты или сильных ударах под воздействием взрывной волны.

Доврачебная помощь при травмах прямой кишки

- ◎ Физический и эмоциональный покой.
- ◎ Запрещен прием жидкости, пищи, таблетированных препаратов.
- ◎ Холод на живот.
- ◎ Срочная щадящая госпитализация в хирургическое отделение.

Доврачебная помощь при выпадении слизистой прямой кишки.

У взрослых вправление выпавшей прямой кишки осуществляют в коленно-локтевом или коленно-плечевом положении больного. После вправления фельдшер рекомендует больному обратиться к хирургу.

Доврачебная помощь при кровотечении.

- ◎ Выделение крови из ануса может быть проявлением злокачественных новообразований в толстом кишечнике. При появлении этого симптома как можно скорее обратитесь к проктологу для уточнения диагноза.
- ◎ Доврачебная помощь при выпадении и ущемлении геморроидальных узлов.
- ◎ При оказании медицинской помощи производить вправление не надо, так как это может привести к тяжелым осложнениям.
- ◎ Необходимо обеспечить физический и эмоциональный покой, холод на живот и срочно госпитализировать в хирургическое отделение.

◎ Спасибо за внимание