

Рослини Червоної книги України



ПІДГОТУВАЛА УЧЕНИЦЯ 5
А КЛАСУ ВІРСЬКА ДАР'Я


Червона книга

1980 р.- Виданно першу Червону книгу України.

Червона книга України містить відомості про рідкісні та зникаючі види рослин та тварин. У цій книзі є різні сторінки: чорні, червоні, жовті, білі, сірі, зелені.



Рослини і тварини, яких ми вже ніколи не побачемо



Рідкісні рослини і тварини. Їх можна ще побачити, але дуже мало.



Рослини і тварини, кількість яких швидко зменшується



Численність цих рослин і тварин невелика



Рослини і тварини маловивчені, місця їх життя малодоступні



Рослини і тварини, яких здалося зберегти врятовані від вимирання

Чемерник чорний

Центральноєвропейський гірський вид на східній межі ареалу. Багаторічна вічнозелена рослина до 25 см заввишки. Цвіте у березні – квітні. Росте поодинокі у вологих лісах Придністров'я. Розмножується насінням і вегетативно. Отруйна рослина. Проте кореневище використовується як лікарська сировина, а квіти зриваються на букети. Необхідний контроль за станом популяцій.



Рутвиця смердюча

Реліктовий вид. Багаторічна трав'яниста, короткоопушена рослина до 50 см заввишки. Цвіте у липні. Розмножується насінням, але насіннєве відновлення рослин пригнічене, тому популяції нечисельні. Ростає на степових схилах, вапнякових та гранітних відслоненнях. Причини зміни чисельності – розробка вапняків, терасування схилів, протиерозійні насадження, випасання худоби.



Гніздівка звичайна



Цю рослину важко сплутати з іншими орхідеями. Вона зовсім позбавлена зеленого кольору. Це значить, що гніздівка живиться не за рахунок фотосинтезу, як більшість рослин, а відмерлими рештками. Її товсті численні корені утворюють в ґрунті кубло (тому і гніздівка), а над землею виростає лише квітконосне стебло. Цвіте у червні-липні. Росте вона у затінених листяних і соснових лісах на свіжих ґрунтах. Зберегти цю рослину важливо як своєрідний унікум рослинного світу, адже мало існує рослин, які б так пристосувалися до життя у лісі, як гніздівка.

Молочай волинський

Ендемічний вид Західного Лісостепу. Зростає на лучно-степових ділянках, узліссях, галявинах поодинокі або невеликими групами. Рослина отруйна, проте добре закріплює ґрунт, корисна в фіто-меліоративному відношенні. Обмеженість популяції пояснюється зміною екологічних умов...-терасуванням схилів, інтенсивним випасом худоби. Охороняється в заказниках: Совий Яр, Сатанівська Дача, Кармалюкова Гора, Панівецька Дача, Княжпільський тау Смотрицькому каньйоні.



Скополія карніолійська

Скополія – багаторічна рослина з товстим кореневищем названа так на честь італійського лікаря та відомого натураліста Г.А. Скополі. Це – середньоєвропейський лісовий вид на східній межі ареалу, пов'язаний з буковими лісами. На Україні зустрічається в Карпатах, а на схід доходить до східної межі букових лісів, на Поділлі – до р.Збруч. Скополія – лікарська рослина, використовується як основна сировина для отримання алкалоїдів атропіну і скопаламіну.



Використовується і як декоративна рослина, в Англії, наприклад, в культурі з 1780 року. Ареал виду катастрофічно скорочується внаслідок знищення місць розповсюдження цієї рослини. Потребує охорони шляхом організації заказників.

Змієголовник австрійський

Реліктовий вид. Багаторічна трав'яниста, опушена рослина. Цвіте у травні – липні, розмножується насінням. Причини зміни чисельності – зривання на букети та випасання худоби. Росте на вапнякових відслоненнях, серед чагарників, на світлих трав'янистих схилах. Охороняється у державних заказниках: Панівецька Дача, Сатанівська Дача, та Совий Яр.



Зозулині черевички

Реліктовий вид на східній межі ареалу. Багаторічна трав'яниста рослина з родини орхідних. Цвіте у травні – червні великими білими квітами, які не мають нектару, запилюються бджолами та джмелями, яких приваблюють вирости епіхілія. Перший надземний листок з'являється на 8-му році після проростання, зацвітає на 10-12-му. Зростає на узліссях, галявинах, серед чагарникових заростей поодинці або групами по декілька особин. Охороняється в Княжпільському заказнику.



Аспленій чорний



Багаторічна трав'яниста папороть до 30-40 см заввишки. Це-субсередземноморський вид на північній межі ареалу. Листки шкірясті, блискучі, зимують. Спори дозрівають у серпні-вересні. Росте на затінених скелях, у розколинах, кам'янистих місцях, іноді у прикореневій частині дерев бука, дуба, грабу. Чисельність зменшується внаслідок добування каменю в місцях, де цей вид зустрічається. В Хмельницькій області аспленій чорний охороняється в заказнику Сатанівська Дача.

Шоломниця весняна

Півкущик до 40 см заввишки з опушеними стеблами. Ендемічний вид, який росте на вапнякових, гіпсових та сланцевих відслоненнях вздовж Дністра та його приток. Місцями утворює невеликі "килимки". Але в результаті господарської діяльності руйнуються кам'янисті схили, де росте ця рослина. Цвіте в травні-липні. Розмножується насінням і вегетативно. Охороняється в державних заказниках Совиний Яр та Циківська Дача.



Шавлія кременецька

Ендемічний подільський вид. Багаторічна трав'яниста рослина з більш-менш пониклим гроновидним суцвіттям із синьо-фіолетових квітів. Цвіте у червні-липні. Розмножується насінням, але природне відновлення слабке. Росте на вапнякових схилах Подільської височини. Чисельність зменшується із-за випасання худоби і витоптування.



Ось ще декілька рослин



На цьому все!

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!