Америкалық ақ көбелек Hyphantria cunea drury Мақсұт Жадыра 312

Американалық ақ көбелек

- Қабыршақ қанаттылар отряды
- Кірекейлер тұқымдасы

Американалық ақ көбелек Канада,АҚШ,Корея, Жапония,Венгрия, Ресей мемлекеттерінде таралған. Қазақстанда жоқ.

- Құрттары 230 ағаш, бұта,шөп түрлерін зақымдайды.
- Солардың ішінде алмұрт, алма, шие, жүзім. Жапырақты шеттерінен кеміреді, ал 6-7 жаста жапырақтарды тегіс жеп қояды.
- Мекендеген ағаштардың белгісі өрмекші торында жиі орналасады.

- Қанаттарының өрісі 25-36мм,түсі ақ кейде қара қоңыр нүктелері болады.
- Денесі қалың ақ қылшықтармен қапталған.
- Ұрғашысының мұрты ара тәрізді, еркегінің мұрты тарақ тәрізді.

- Жұмыртқасы домалақ диаметрі 25-36мм, жасыл,сары жасыл кейде кір түсті.
- Құрттарының ұзындығы 25-36мм, барқытты қоңыр түсті.
- Арқасын бойлап қылшықтары бар екі қатар барқытты- қара жолақ орналасқан.

- Қуыршағының ұзындығы 8-15мм, қоңыр кремастерінде 10-15 тікенектер болады.
- Қуыршақ ұзындығы 17-20мм, ені 8-10мм сұр түсті піллә ішінде қыстайды.

- Көбелектер тиімді температура жиынтығы 130ºС тең болғанда ұшып шығуын бастайды. Бұл сәуір айының соңына мамыр айына тура келеді. Жаппай ұшып шығуы тиімді температура жиынтығы 175ºС тең келгенде өтеді, бір айға созылуы мүмкін.

Карантиндік және күрес шаралары

- шеттен келген жүктерді, көліктерді, карантиндік заттарды тексеру.
- мекендеген ағаштарда өрмекшінің торларын кесіп жою, 50м радиуста өсіп тұрған ағаштарды инсектицидтермен өңдеу
- құрттардың пайда болу кезінде 35% к.э. Фазолонмен өңдеу.
- Жемістерді бромды метилмен түтіндету, микробиопрепарат- эндобактеринді 0,3% суспензиясын қолдану.