

НПВС



Самый лучший Аспирин® только компании Bayer
АСПИРИН-С **АСПИРИН КОМПЛЕКС**
Помогает избавиться от боли и лихорадки Комплексное облегчение симптомов ОРВИ, простуды и гриппа
www.aspirin.ru Bayer Health Care

РЕШЕНИЕ ВИРУСНЫХ ПРОБЛЕМ!
средства от гриппа

РИНЗА ЕСТЬ. ПРОСТУДЫ НЕТ!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Производные пропионовой кислоты

Ибупрофен (Бруфен, Миг, Нурофен, Долгит, Фаспик, Бурана)

Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее действие.

Применение:

-воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата, болезнь Бехтерева
-болевого синдром, в т.ч. люмбагия, ишиалгия, грудной корешковый синдром, миалгия, лихорадка, головная боль.





Побочные эффекты:

-тошнота, анорексия, метеоризм, запор, изжога, диарея,

-головокружение, головная боль, возбуждение, бессонница,

-кожные аллергические реакции, нарушения зрения.

-Редко — эрозивно-язвенные поражения ЖКТ.

□ Формы выпуска: табл, капсулы, гель, суспензия, гранулы, крем, шипучие табл.

Комбинированные препараты: Новиган



Ибуклин



Напроксен (напросин)



- Кетопрофен (Артрозилен, Фастум, Кетонал, Фламакс, Оки (гранулят, раствор для полоскания), Феброфид, Быструмгель)

Формы выпуска: табл, гель, свечи, крем, раствор для инъекций, гранулят, раствор для полоскания, аэрозоль.



Показания к применению препарата АРТРОЗИЛЕН аэрозоль

- — заболевания опорно-двигательного аппарата (в т.ч. ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилоартрит, остеоартроз периферических суставов и позвоночника, ревматические поражения мягких тканей);
- — мышечные боли ревматического и неревматического происхождения;
- — травматические повреждения м



Производные фенилуксусной КИСЛОТЫ

Диклофенак (Ортофен, Диклак, Диклобене, Ортофен, Вольтарен)



Аэртал

- ▣ **Международное непатентованное название (МНН) ацеклофенак**
- ▣ Ацеклофенак обладает противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием.
Симптоматическое лечение ревматоидного артрита, остеоартроза, анкилозирующего спондилоартрита. Ревматическое поражение мягких тканей, сопровождающееся болью.



Побочное действие



Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея, боли в области эпигастрия, кишечная колика, диспепсия иногда отмечается головная боль, головокружение, нарушения сна ия, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой по 100 мг метеоризм, анорексия.

Производные антраниловой кислоты (феноматы)

Мефенамовая кислота



Нифлумовая кислота (Нифлурил)



Производные арилуксусной кислоты.

Кеторолак (Кетанов, Кеторол)



Askorbin.ru



Производные бензидамина

Бензидамин (Тантум верде)



Бензидамин (Тантум роза)



Тантум Роза® раствор
вагинальный во флаконе

Тантум® Роза гранулы для
вагинального раствора

II. Селективные блокаторы ЦОГ-2.

Нимесулид (Нимесил, Найз)



Оксикамы

Мелоксикам(Мовалис, Мовасин, Артрозан, Мирлокс, Амелотекс)



□ Пироксикам (Финальгель)

Теноксикам (Тексамен)



*гель наружн., туба 35 г,
пач. картон. 1*
Финалгель®

Таблетки покрытые оболочкой

Тексамен

тенوكсикам 20 мг

10 таблеток

© www.acmespb.ru

таблетки для приема внутрь

*противовоспалительный
препарат*

 Asfarma

Коксибы

- Целекоксиб (Целебрекс)



□ Рофекоксиб



□ Эторикоксиб (Аркоксия)



III. Селективные блокаторы ЦОГ-1

Малые дозы ацетилсалициловой кислоты.

