



# Производные пропионовой кислоты

Ибупрофен (Бруфен, Миг, Нурофен, Долгит, Фаспик, Бурана)

Противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее действие.

Применение:

-воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата, болезнь Бехтерева  
-болевого синдром, в т.ч. люмбагия, ишиалгия, грудной корешковый синдром, миалгия, лихорадка, головная боль.





## Побочные эффекты:

-тошнота, анорексия, метеоризм, запор, изжога, диарея,

-головокружение, головная боль, возбуждение, бессонница,

-кожные аллергические реакции, нарушения зрения.

-Редко — эрозивно-язвенные поражения ЖКТ.

□ Формы выпуска: табл, капсулы, гель, суспензия, гранулы, крем, шипучие табл.

# Комбинированные препараты: Новиган



# Ибуклин



# Напроксен (напросин)



- Кетопрофен (Артрозилен, Фастум, Кетонал, Фламакс, Оки (гранулят, раствор для полоскания), Феброфид, Быструмгель)

Формы выпуска: табл, гель, свечи, крем, раствор для инъекций, гранулят, раствор для полоскания, аэрозоль.



# Показания к применению препарата АРТРОЗИЛЕН аэрозоль

- — заболевания опорно-двигательного аппарата (в т.ч. ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилоартрит, остеоартроз периферических суставов и позвоночника, ревматические поражения мягких тканей);
- — мышечные боли ревматического и неревматического происхождения;
- — травматические повреждения м



# Производные фенилуксусной КИСЛОТЫ

Диклофенак (Ортофен, Диклак, Диклобене, Ортофен, Вольтарен)



# Аэртал

- ▣ **Международное непатентованное название (МНН) ацеклофенак**
- ▣ Ацеклофенак обладает противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием.  
Симптоматическое лечение ревматоидного артрита, остеоартроза, анкилозирующего спондилоартрита. Ревматическое поражение мягких тканей, сопровождающееся болью.



# Побочное действие



Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея, боли в области эпигастрия, кишечная колика, диспепсия иногда отмечается головная боль, головокружение, нарушения сна ия, Таблетки, покрытые пленочной оболочкой по 100 мг метеоризм, анорексия.

# Производные антраниловой кислоты (феноматы)

## Мефенамовая кислота



## Нифлумовая кислота (Нифлурил)





# Производные бензидамина

Бензидамин (Тантум верде)



# Бензидамин (Тантум роза)



Тантум Роза® раствор  
вагинальный во флаконе

Тантум® Роза гранулы для  
вагинального раствора

# II. Селективные блокаторы ЦОГ-2.

## Нимесулид (Нимесил, Найз)



# Оксикамы

Мелоксикам(Мовалис, Мовасин, Артрозан, Мирлокс, Амелотекс)



□ Пироксикам ( Финальгель)

Теноксикам (Тексамен)



*гель наружн., туба 35 г,  
пач. картон. 1  
Финалгель®*

Таблетки покрытые оболочкой

**Тексамен**

тенوكсикам 20 мг

**10 таблеток**

© [www.acmespb.ru](http://www.acmespb.ru)

таблетки для приема внутрь

*противовоспалительный  
препарат*

 Asfarma

# Коксибы

- Целекоксиб (Целебрекс)



□ Рофекоксиб



□ Эторикоксиб (Аркоксия)



# III. Селективные блокаторы ЦОГ-1

Малые дозы ацетилсалициловой кислоты.

