

Расстройства ЭМОЦИЙ

Лекция для студентов

Доцент кафедры психотерапии с курсом ИДПО

к.м.н. Пермякова О.А.

2017г.

Эмоции

- положительные
- отрицательные

- эпикритические – корковые
- протопатические – подкорковые

- стенические (мобилизующие)
- астенические (дезорганизирующие, угнетающие)

Основные функции эмоций

1. Сигнальная
2. Коммуникативная
3. Формирование поведения

Эмоции оценивают по:

- высказываниям больного
- внешнему виду
- выражению лица, мимике
- жестам
- тембру голоса
- вегетативным реакциям

По силе и длительности выделяют

- *Эмоциональные реакции*
- *Настроение*
- *Аффекты*

Симптомы эмоциональных расстройств:

- гипертимия,
- гипотимия,
- эйфория,
- дисфория,
- тревога
- амбивалентность
- эксплозивность
- эмоциональная лабильность
- эмоциональная ригидность
- болезненная психическая нечувствительность (anesthesia psihica dolorosa)
- апатия
- эмоциональная монотонность (эмоциональная тупость)
- эмоциональное огрубение

Аффект

- Физиологический

- Патологический

- сумеречное помрачение сознания
- аффективный разряд
- расслабленность вплоть до сна
- последующая амнезия
- признаются невменяемыми

**Эмоциональные
(аффективные
синдромы)**

```
graph TD; A[Эмоциональные (аффективные синдромы)] --> B[Депрессивный]; A --> C[Маниакальный];
```

Депрессивный

Маниакальный

Депрессивный синдром

Депрессивная триада

- Гипотимия
- Замедление мышления
- Двигательная заторможенность

Идеи самообвинения вплоть до
бредовых

Гипобулия

Бессонница

Усиление тоски утром

Суицидальные тенденции



Рис. 24. Инволюционная меланхолия.

Соматовегетативные проявления при депрессии

- Сухость кожных покровов, ломкость ногтей, волос
- выглядят старше своего возраста
- тахикардия
- колебания АД
- жар, холод
- запоры
- диспепсия
- снижение аппетита
- снижение массы тела
- разнообразные боли

Депрессия

```
graph TD; A[Депрессия] --> B[По этиологии]; A --> C[По клинической картине]; B --> B1[Эндогенная]; B --> B2[Психогенная]; B --> B3[Экзогенная]; C --> C1[Тревожная (ажитированная депрессия)]; C --> C2[апатическая]; C --> C3[ипохондрическая]; C --> C4[истерическая]; C --> C5[маскированная (соматизированная, скрытая)];
```

По этиологии

- Эндогенная
- Психогенная
- Экзогенная

По клинической картине

- Тревожная (ажитированная депрессия)
- апатическая
- ипохондрическая
- истерическая
- маскированная (соматизированная, скрытая)

Варианты депрессивного синдрома

- Тревожная (ажитированная депрессия)
- апатическая
- ипохондрическая
- истерическая
- маскированная (соматизированная, скрытая)


- Субдепрессия.

Маскированная депрессия

- Преобладают жалобы соматического характера
- Несоответствие субъективных ощущений и объективных данных
- Нет эффекта от традиционного лечения
- Несмотря на неэффективность лечения больные ходят к врачу
- Эффект от терапии антидепрессантами

Основные симптомы депрессии СОМАТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

*Встречаемость**



* При первом обращении к врачу

Маниакальный синдром

Триада

- Гипертимия
- Ускорение мышления
- Двигательное возбуждение

Переоценка собственных способностей


Усиление всех влечений

Укорочение сна

Гневливая мания

Гипомания





Ну хоть троечку

Спасибо за внимание !

