


Пироплазмоз у собак

Выполнила:
Харлампьева Елена,
Гр-В-031





Пироплазмоз -
кровопаразитарное
заболевание собак, лисиц и
других пушных зверей.
Возбудитель *Piroplasma*
canis локализуется в
эритроцитах, иногда плазме
крови, нейтрофилах,
мононуклеарах.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Симптомы:

- Снижение активности пса;
- Потеря аппетита;
- На 3-5 день появляется рвота, часто со слизью, иногда понос с характерным ярко-желтым или зеленоватым цветом жидких масс;
- Собака старается меньше двигаться, словно это приносит ей страдания. Её шаги скованны, она чаще предпочитает лежать;
- Главный признак пироплазмоза моча – она темнеет;
- У здоровых псов признаков недомогания может не наблюдаться, собака гибнет внезапно не проявляя признаков недомогания.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Как происходит заражение:

Пироплазмы в течение своего циклического развития имеют два вида хозяев. Первыми в качестве промежуточных выступают собаки, лисицы, волки, шакалы и прочие псовые, а вторыми в качестве окончательных — иксодовые клещи, в теле которых пироплазмы осуществляют размножение и дальнейшее превращение.

Самки — носители заразы передают её в отложенные яйца, откуда после выходят уже инфицированные личинки. Поэтому и на стадии личинок, и в дальнейшем, такой клещ, кусая здоровую собаку, будет заражать её инфекцией.

Пиковые вспышки заболевания у собак совпадают с периодом клещевой активности, которая, в отличие от угрозы для людей, более растянута во времени. Потому что личинки и нимфы практически не кусают человека, зато собака для них — вполне доступная жертва. Как раз тогда угрожающие симптомы укуса клеща возникают у собаки.

1

2

3

4

5

6

7


8

9

10

11

Регистрация случаев пироплазмоза происходит на протяжении всего периода плюсовых температур — от самого начала весны и по конец осени, не прекращаясь даже в середине лета, когда именно личинки и нимфы начинают охоту. Но поголовные вспышки приходятся традиционно на середину — конец весны и на конец лета — середину осени.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Собака, бегая по покрытой растительностью земле, становится лёгкой мишенью для ждущих там жертву клещей. Им достаточно просто зацепиться за шерсть, а потом спокойно под её покровом искать по несколько часов удобное место для присасывания и неторопливого насыщения, которое для самок паразита может затянуться на несколько дней.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Диагноз
ставят
только после
исследовани
я мазков
периферичес
кой крови
(из уха).



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Лечение пироплазмоза у собак после укуса клеща (только по назначению врача т. к. препараты очень токсичны и имеют массу побочных явлений)

Для начала назначают препараты для уничтожения пироплазм, затем необходимо назначить препараты для поддержания и лечения всего организма в целом.

Введение противопироплазмидозных средств (верибен, беренил и др.);

Внутривенное введение растворов электролитов и мочегонных препаратов для снятия интоксикации;

Сердечные препараты, витамины, гепатопротекторы (эссенциале, карсил и др).

1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

11



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Профилактика пироплазмоза и укуса клеща собак:

В теплое время года собак ежемесячно обрабатывают акарицидными препаратами в виде спрея или капель на холку (Фронтлайн, Адвантикс, Барс и др.).

Осматривают животное после прогулки на предмет клещей. Если же все таки вы обнаружили клещей, то аккуратно снимите их и обработайте место укуса йодом.

В последующие дни обязательно наблюдают за собакой, при появлении первых признаков необходимо срочно обратиться к ветеринарному врачу.

Чем раньше начато лечение пироплазмоза у собаки, тем больший шанс на выздоровление.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Пироплазмоз у собак

Выполнила:
Харлампьева Елена,
Гр-В-031

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11