



16. ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ

16.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Пусть имеется n переменных величин, и каждому набору их значений

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

из некоторого множества X соответствует определенное значение величины z .

Тогда говорят, что задана функция нескольких переменных

$$z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$



ПРИМЕР.

Функция

$$z = \pi \cdot x_1^2 \cdot x_2$$

задает объем цилиндра z как функцию двух переменных:

x_1 – радиус основания,

x_2 – высота цилиндра.





Переменные $x_1 \dots x_n$ называются независимыми переменными.

Z называется зависимой переменной.

Множество X называется областью определения функции.



ПРИМЕРЫ.

1

Найти область определения функции:

$$z = \sqrt{1 - x_1^2 - x_2^2}$$

РЕШЕНИЕ.

$$1 - x_1^2 - x_2^2 \geq 0 \quad \longrightarrow \quad x_1^2 + x_2^2 \leq 1$$

Поэтому областью определения является круг с центром в начале координат и радиусом, равным единице.



2

Найти область определения функции:

$$z = \frac{1}{x_1 \cdot x_2}$$

РЕШЕНИЕ.

$$x_1 \cdot x_2 \neq 0 \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} x_1 \neq 0 \\ x_2 \neq 0 \end{cases}$$

Поэтому областью определения является плоскость Ox_1x_2 , за исключением координатных прямых Ox_1 и Ox_2 .

Рассмотрим примеры функций нескольких переменных.

1

$$z = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + b$$
$$a_1, \dots, a_n, b = \text{const}$$

Линейная функция



2

$$z = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n b_{ij} \cdot x_i \cdot x_j$$

$$b_{ij} = \text{const}$$

Квадратическая функция





3

$$z = b_0 \cdot x_1^{b_1} \cdot x_2^{b_2}$$

$$b_1, b_2 = \text{const}$$

Функция Кобба-Дугла






В дальнейшем мы будем рассматривать частный случай функции нескольких переменных - функцию двух переменных, которая обозначается как

$$z = f(x, y)$$

Ее областью определения X является подмножество координатной плоскости XOY .



Окрестностью точки $M_0(x_0, y_0)$, принадлежащей множеству X , называется круг, содержащий точку M_0 .



Круг на плоскости есть двумерный аналог интервала на прямой.

Любой функции $f(x,y)$ можно поставить в соответствие пару функций одной переменной:

- при фиксированном значении $x=x_0$ функцию $z=f(x_0,y)$
- при фиксированном значении $y=y_0$ функцию $z=f(x,y_0)$

$$x = x_0$$



$$z = f(x_0, y)$$

$$y = y_0$$



$$z = f(x, y_0)$$



Хотя функции

$$z = f(x_0, y) \quad z = f(x, y_0)$$

имеют одинаковое происхождение, их вид может существенно отличаться.

Например, функция

$$z = (1 + x)^y$$

является степенной по переменной x , и показательной по переменной y .





Графиком функции двух переменных $z=f(x,y)$ называется множество точек трехмерного пространства (x,y,z) , аппликата которых связана с абсциссой и ординатой соотношением $z=f(x,y)$.



Для построение графика функции $f(x,y)$ полезно рассмотреть функции одной переменной:

$$z=f(x_0,y) \text{ и } z=f(x,y_0)$$

которые есть сечения графика $z=f(x,y)$ плоскостями, параллельными координатным плоскостям XOZ и YOZ , т.е. плоскостями

$$y=y_0 \text{ и } x=x_0$$




ПРИМЕР.

Построить график функции:

$$z = x^2 + y^2 - 2y$$




РЕШЕНИЕ.

Найдем сечения поверхности плоскостями, параллельными координатным плоскостям.

Для этого преобразуем функцию к виду:

$$z = x^2 + y^2 - 2y = x^2 + (y - 1)^2 - 1$$

При $y=0$ (сечение плоскостью XOZ):

$$z = x^2 \quad \text{- парабола}$$




При $x=0$ (сечение плоскостью YOZ):

$$z = (y - 1)^2 - 1 \quad \text{- парабола}$$


При $z=0$ (сечение плоскостью XOY):

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1$$

- окружность с центром в точке $(0, 1)$

Эта поверхность называется параболоидом.








Линией уровня функции двух переменных $z=f(x,y)$ называется множество точек на плоскости, таких что во всех этих точках значение функции одно и то же и равно C .

Число C называется уровнем.





ПРИМЕР.

Построить линии уровня функции:


$$z = x^2 + y^2 - 2y$$

РЕШЕНИЕ.

Линия уровня $z=C$ – это кривая на плоскости XOY ,
которая задается уравнением

$$C = x^2 + y^2 - 2y$$

ИЛИ



$$C = x^2 + (y-1)^2 - 1$$

$$x^2 + (y-1)^2 = C + 1$$



Это будет окружность с центром в точке $(0,1)$ и радиусом $R = \sqrt{C+1}$

При $C=-1$ имеем точку $(0,1)$.


При $C=0$ имеем окружность с $R = 1$

При $C=0.5$ имеем окружность с $R = \sqrt{0.5}$

При $C=1$ имеем окружность с $R = \sqrt{2}$

И так далее.







**Линия уровня позволяют представить график
данной функции.**

**Расстояния между линиями с одинаковым шагом
уровня уменьшаются при удалении от центра.**