





ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ

1. ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА

Пусть на отрезке $[a, b]$ задана неотрицательная функция $y=f(x)$.

Требуется найти площадь криволинейной трапеции, ограниченной кривой $y=f(x)$, прямыми $x=a$, $x=b$ и осью абсцисс $y=0$.

Рассмотрим ломаную, расположенную достаточно близко к кривой.





Фигура под ломаной состоит из трапеций и ее площадь равна сумме площадей всех трапеций:

$$S = \sum S_{trap}$$

Причем, площадь под кривой будет приближенно равна площади под ломаной, если ломаная достаточно близко подходит к кривой.







За искомую площадь под кривой берут предел площади под ломаной при условии, что ломаная неограниченно приближается к кривой.

Разобьем отрезок $[a, b]$ на n элементарных отрезков точками $x_0, x_1, \dots, x_n$.

Положим $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

На каждом из отрезков выберем точку ξ_i , и найдем значение функции в этой точке


$$f(\xi_i)$$



Сумму вида

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot \Delta x_i$$

*называют интегральной суммой
для функции $y=f(x)$ на отрезке $[a,b]$.*




Интегральная сумма зависит от способа разбиения отрезка и выбора точек ξ_i


Каждое отдельное слагаемое в интегральной сумме

$$f(\xi_i) \cdot \Delta x_i$$

равно площади S_i прямоугольника со сторонами

$$f(\xi_i) \text{ и } \Delta x_i$$



Наибольший из отрезков разбиения

$$[x_{i-1}, x_i]$$

обозначим как


$$\max \Delta x_i$$

Вся интегральная сумма будет равна

$$S = \sum_{i=1}^n S_i$$


Если существует конечный предел интегральной суммы при $\max \Delta x_i \rightarrow 0$ не зависящий от способа разбиения отрезка $[a, b]$ и выбора точек ξ_i , то он называется определенным интегралом от функции $y=f(x)$ на отрезке $[a, b]$.


$$\lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx$$



*Функция $y=f(x)$ называется интегрируемой
на отрезке $[a,b]$.*

*Числа a и b называются нижним и верхним
пределом, соответственно.*





Неопределенный интеграл $\int f(x)dx$

есть семейство функций, а определенный интеграл

$$\int_a^b f(x)dx$$

есть определенное число.

По определению предполагается, что $a < b$.


Положим

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$$




С учетом этого несущественно, какой предел больше или меньше.

Если $a = b$, то


$$\int_a^a f(x) dx = - \int_a^a f(x) dx$$

$$2 \int_a^a f(x) dx = 0$$


$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

2. СВОЙСТВА ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА

Необходимое условие существования определе

Интегрируемая на отрезке $[a,b]$ функция $y=f(x)$ ограничена на этом отрезке.

Достаточное условие существования определе

Если на отрезке $[a,b]$ функция $y=f(x)$ непрерывна, то она интегрируема на этом отрезке.

Свойства определенного и



*Постоянный множитель можно выносить
за знак определенного интеграла.*

$$\int_a^b k \cdot f(x) dx = k \cdot \int_a^b f(x) dx$$

Доказательство:

Пусть фиксировано разбиение отрезка $[a,b]$ и выбор точек

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$$

Рассмотрим интегральную сумму:

$$\sum_{i=1}^n k \cdot f(\xi_i) \Delta x_i = k \cdot \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

Переходим к пределу в левой и правой части равенства при $\max \Delta x_i \rightarrow 0$

$$\lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n k \cdot f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} k \cdot \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i =$$

$$= k \cdot \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

Следовательно по определению:

$$\int_a^b k \cdot f(x) dx = k \cdot \int_a^b f(x) dx$$





Определенный интеграл от алгебраической суммы (разности) двух функций равен сумме (разности) интегралов от этих функций.

$$\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$




Если отрезок интегрирования разбит на части, то интеграл на всем отрезке равен сумме интегралов по каждому из участков разбиения.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

Геометрически это означает, что если $a < c < b$ и функция $y=f(x)$ неотрицательна на $[a,b]$, то согласно геометрическому смыслу определенного интеграла

$$\int_a^b f(x)dx = S \quad \int_a^c f(x)dx = S_1 \quad \int_c^b f(x)dx = S_2$$

$$S_1 + S_2 = S$$





Если на $[a,b]$, где $a < b$,

$$f(x) \leq g(x)$$

то

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$


Доказательство:

Пусть фиксировано разбиение отрезка $[a,b]$ и выбор точек $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$


Если $f(x) \leq g(x)$ то для интегральных сумм:

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i$$

Переходим к пределу в левой и правой части неравенства при $\max \Delta x_i \rightarrow 0$


$$\lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i$$

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$



Следствие.

Пусть на $[a, b]$, где $a < b$,

$$m \leq f(x) \leq M$$

где m и M некоторые числа. Тогда

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

Доказательство:

По свойству 4 имеем:

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx$$

По свойству 1 и геометрическому смыслу
определенного интеграла:

$$\int_a^b m dx = m(b - a)$$

$$\int_a^b M dx = M(b - a)$$

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a)$$





Теорема о среднем

Если на $[a, b]$, где $a < b$, функция $y = f(x)$ непрерывна, то найдется такое значение

$$\xi \in [a, b]$$

что

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi) \cdot (b - a)$$

Доказательство:

По свойству функции, непрерывной на отрезке,
для произвольного значения


$$x \in [a, b]$$

справедливо неравенство:

$$m \leq f(x) \leq M$$

Где m и M – наименьшее и наибольшее значения
функции на отрезке. Тогда

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$



$$m \leq \int_a^b f(x) dx \cdot \frac{1}{b-a} \leq M$$

Но функция, непрерывная на отрезке, принимает любое значение, заключенное между ее наименьшим и наибольшим значениями, поэтому найдется такое число

$$\xi \in [a, b]$$

что

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi) \cdot (b-a)$$



Пусть


$$f(x) \geq 0$$

Тогда теорема о среднем утверждает, что найдется такая точка

$$\xi \in [a, b]$$

что площадь под кривой $y=f(x)$ на $[a, b]$ равна площади прямоугольника со сторонами

$$f(\xi) \text{ и } (b-a)$$



Равенство

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi) \cdot (b - a)$$

называется формулой среднего значения.

$f(\xi)$

называется средним значением функции.



Геометрический смысл определенного интеграла

Если на $[a, b]$ функция $y=f(x)$ неотрицательна, то площадь под этой кривой численно равна определенному интегралу

$$\int_a^b f(x) dx = S$$