

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. О. О.
БОГОМОЛЬЦЯ
КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ

НІМЕСИЛ

СОЛОВЕЙ МАРІЯ ГРІГОРІВНА

ВИКЛАДАЧІ:

Десятнюк Лілія Борисівна
Криштопа Альбіна Олександрівна

ПЛАН

- Фармакологічні властивості
- Показання для застосування
- Спосіб застосування та дози
- Побічна дія
- Протипоказання

Нимесил®

Нимесил®

Нимесил®

Нимесил®

Нимесил®

Нимесил®

Нимесил®

Нимесил®

Нимесил®

Нимесил®

Нимесил®

Нимесил®

Фармакологічні властивості

Німесил – це не стероїдний протизапальний засіб групи метансульфонанлідів, який виявляє протизапальну, знеболюючу та жарознижуючу дію.



Показання для застосування

Гострий біль при запаленнях; біль при ревматоїдному артриті та остеоартритах; при гінекологічних та оториноларингологічних захворюваннях; післяопераційний період; при травматичних ушкодженнях; після стоматологічних втручань.

Спосіб застосування та дози

A hand is shown pouring a pink liquid from a brown glass bottle into a white spoon. The background is white.

Вміст порційних пакетиків висипають у склянку і розчиняють водою.

Дорослі, підлітки (12-18 років) та особи похилого віку: 1 пакетик (100 мг) 2 рази на добу після їжі.

Побічна дія

Запаморочення;

Задишка;

Діарея, нудота, блювання;

Свербіж, висип;

Набряк;

Збільшення печінкових показників.



Протипоказання

Підвищена чутливість до німесулідю або до будь-якого компонента препарату, виразка шлунка чи дванадцяти палої кишки у фазі загострення, рецидивуючі виразки чи кровотечі у травному тракті, серцева, печінкова або ниркова недостатність, третій триместр вагітності та період годування груддю.



Дякую за увагу!

