


Болезни почек: Гломерулонефриты и
гломерулопатии. Нефротический синдром.

Амилоидоз почек. Острая и хроническая
почечная недостаточность. Классификация,
этиология, патогенез, клинико-
морфологическая характеристика,
осложнения, исходы


СТРОЕНИЕ НЕФРОНА

- 1. Клубочек и прилежащие извитые сегменты проксимального и дистального извитых канальцев (корковое вещество)***
- 2. Прямые сегменты проксимального и дистального извитых канальцев (корковое вещество)***
- 3. Нисходящий и восходящий сегменты петли Генле (мозговое вещество)***
- 4. Соединительные канальцы (корковое вещество) и собирательные трубочки (мозговое вещество)***

Строение нефрона



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1



Обозначения:

ММ – мезангиальный матрикс; МК – мезангиальные клетки; ЭНД – эндотелий; ПОД - подоцит

СТРОЕНИЕ ГЛОМЕРУЛЯРНОГО ФИЛЬТРА

- ***отростки подоцитов***
- ***трёхслойная базальная мембрана***
- ***фенестрированный эндотелий***


ОТРОСТКИ ПОДОЦТОВ (СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП)



ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОЧЕЧНЫХ КЛУБОЧКОВ

- ***глобальное*** - затронут весь клубочек
- ***сегментарное*** - затронута часть клубочка
- ***диффузное*** - поражаются все клубочки почки
- ***фокальное*** - поражается часть клубочков
почки

Виды повреждений почечных клубочков



Обозначения: а – нормальный клубочек;

виды повреждений почечных клубочков:

б – глобальное; в – сегментарное; г – диффузное; д - фокальное

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК

1. Гломерулопатии

а. Гломерулонефрит (первичный, вторичный)

б. Первичный нефротический синдром:

липидный нефроз, мембранозная нефропатия, ФСГГ

в. Амилоидоз почек

2. Тубулопатии (приобретённые, наследственные)

3. Стромально-сосудистые заболевания (пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, артериолосклероз)

4. Пороки развития почки

5. Опухоли почек

КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА

1. Нозология

- а. первичный***
- б. вторичный***

2. Этиология

- а. установленной этиологии***
 - бактерии (стрептококк)***
 - простейшие (малярийный плазмодий)***
 - вирусы***

3. Патогенез

- а. иммунологически обусловленный (иммунокомплексный, антигательный)***
- б. иммунологически необусловленный***

4. Течение (острый, подострый, хронический)


5. Морфология

- а. топография процесса***
 - интракапиллярный***
 - экстракапиллярный***
- б. распространённость процесса***
 - очаговый***
 - диффузный***
- в. характер процесса***
 - экссудативный***
 - пролиферативный***
 - смешанный***

МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ ПРИ ИММУНОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ

- 1. Циркулирующие иммунные комплексы
(ЦИКи) – острый сывороточный
нефрит***
- 2. Иммунные комплексы in situ –
нефрит Хайманна, анти-ГБМ нефрит***

ФИКСАЦИЯ ДЕПОЗИТОВ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ



НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ФОРМЫ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА

1. Острый постстрептококковый гломерулонефрит

иммунокомплексный

интракапиллярный экссудативный

экссудативно-пролиферативный

пролиферативный

2. Подострый гломерулонефрит

иммунокомплексный или антительный

экстракапиллярный пролиферативный

3. Хронический гломерулонефрит

иммунокомплексный

мезангиопротлиферативный


мезангиокапиллярный (мембранопротлиферативный)

фибропластический

Острый диффузный пролиферативный гломерулонефрит

Нормальный клубочек

Острый постинфекционный гломерулонефрит




Обозначения:

1 – пролиферация эндотелиальных клеток и инфильтрация петель нейтрофилами;


БОЛЬШАЯ ПЁСТРАЯ ПОЧКА



***ИНТРАКАПИЛЛЯРНЫЙ ПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ***



Быстропрогрессирующий полулунный гломерулонефрит




Коллапс капиллярных
петель

Эпителиальное полулуние,
содержащее макрофаги

ВИДЫ ПОЛУЛУНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ **ОТ СТРОЕНИЯ:**

- **ЭПИТЕЛИАЛЬНОЕ**
- **ФИБРОЭПИТЕЛИАЛЬНОЕ**
- **ФИБРОЗНОЕ**

**ЭКСТРАКАПИЛЛЯРНЫЙ ПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ,
Х400**



ПОЧЕЧНЫЕ СИНДРОМЫ

- 1. Нефритический*
- 2. Нефротический*
- 3. Гепато-ренальный*
- 4. Длительного раздавливания (краш-синдром)*
- 5. Лёгочно-почечный (синдром Гудпасчера)*
- 6. Острая почечная недостаточность*
- 7. Хроническая почечная недостаточность*

НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ


ПЕРВИЧНЫЙ

- 1. Болезнь минимальных изменений (липидный нефроз)***
- 2. Мембранозная нефропатия***
- 3. ФСГГ***

ВТОРИЧНЫЙ

При различных заболеваниях (гломерулонефрит, амилоидоз и др.)

Патогенез нефротического синдрома



Болезнь минимальных изменений (липоидный нефроз)

Нормальный почечный клубочек


Минимальные изменения


Мочевое
пространство

Гломерулярная
базальная
мембрана

Мезангий

Подоциты






Мембранозная нефропатия

ранние I-II стадии


поздние III-IV стадии




Обозначения:


1 – электронноплотные субэпителиальные депозиты в гломерулярной базальной мембране;
2 – слабая пролиферация мезангиальных клеток; 3 – растворение депозитов в утолщенной
гломерулярной базальной мембране; 4 – накопление мезангиального матрикса

МЕМБРАНОЗНАЯ НЕФРОПАТИЯ




МЕМБРАНОЗНАЯ НЕФРОПАТИЯ





ФСГГ – ФОКАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТАРНЫЙ ГЛОМЕРУЛЯРНЫЙ ГИАЛИНОЗ




МЕЗАНГИОПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ




МЕЗАНГИОПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

МЕМБРАНОПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ




МЕМБРАНОПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ






ФЕНОМЕН ИНТЕРПОЗИЦИИ МЕЗАНГИЯ



ДУПЛИКАТУРА БАЗАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ



ИгА-нефропатия




ВТОРИЧНО СМОРЩЕННАЯ ПОЧКА



ВТОРИЧНО СМОРЩЕННАЯ И НОРМАЛЬНАЯ ПОЧКА






ФИБРОПЛАСТИЧЕСКИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ, X400


СТАДИИ АМИЛОИДОЗА ПОЧЕК

- 1. Латентная***
- 2. Протеинурическая***
- 3. Нефротическая***
- 4. Уремическая***


АМИЛОИДОЗ ПОЧЕК



АМИЛОИДОЗ ПОЧЕК (окр. конго красным, X200)



ВОЛЧАНОЧНЫЙ НЕФРИТ, Х400



Острая почечная недостаточность (ОПН).

ОПН- синдром, включающий быстрое (в течении нескольких часов) снижение клубочковой фильтрации, задержку в организме конечных продуктов азотистого обмена нарушение объема внеклеточной жидкости, и нарушение электролитного и кислотно-щелочного равновесия.

Характеризуется повышением креатинина сыворотки крови на 0,5 мг% в сутки и мочевины на 10 мг% в сутки.

Морфологическим эквивалентом синдрома является некроз эпителия канальцев и нарушение почечного крово - и лимфообращения.

Острая почечная недостаточность отождествляется с некротическим нефрозом (некронефрозом).

Этиологические факторы ОПН.

1. Интоксикационные факторы:

- а. соли тяжелых металлов (ртуть, свинец, висмут, хром уран);**
- б. кислоты (серная, хлористоводородная, фосфорная, щавелевая);**
- в. многоатомные спирты (этиленгликоль – антифриз);**
- г. вещества наркотического ряда (хлороформ, барбитураты);**
- д. лекарственные препараты («сульфаниламидная» «анальгиновая» почка);**
- е. травматические повреждения (синдром длительного раздавливания – crush syndrome, послеоперационная острая почечная недостаточность, обширные ожоги, гемолиз – «гемолитическая почка», обезвоживание и обесхлоривание (хлоргидропеническая почка)**

2. Инфекционные факторы:


- а. холера; б. брюшной тиф; в. паратиф; г. дифтерия; д. сепсис.**

3. ОПН, как осложнение соматических заболеваний подразделяется на следующие категории:


- а. Заболевания с гипоперфузией почек без первичного поражения их паренхимы (преренальная азотемия, или преренальная ОПН) составляет 50% всех случаев ОПН .**
- б. Заболевания с поражением почечной паренхимы (ренальная азотемия, ренальная ОПН) составляет 45% всех случаев ОПН.**
- в. Заболевания сопровождающиеся обструкцией мочевых путей (постренальная азотемия или постренальная ОПН) составляет 5% всех случаев ОПН.**

Патогенез ОПН при шоковой реакции





Патогенез ОПН при токсическом воздействии.



ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ.

Имеет стадийное течение.

Выделяют следующие стадии течения ОПН:

1. Начальная (шоковая) стадия.

Венозное полнокровие интермедиарной зоны и пирамид, ишемия коркового слоя, отек интерстиция, лимфостаз, эпителий канальцев главных отделов в состоянии гидropической, гиалиново-капельной или жировой дистрофии.

2. Олиго- анурическая стадия.


Выраженные некротические изменения канальцев (главных отделов) носят очаговый характер, часть из них сопровождаются тубулорексисом. Цилиндры перекрывают нефрон на разных уровнях, застой клубочкового ультрафильтрата в полости капсулы клубочка. Усиление отека интерстиция, присоединение лейкоцитарной инфильтрации, возможны геморрагии, выражен венозный застой, возможен тромбоз вен.

3. Стадия восстановления диуреза.

Снижаются отечность и лейкоцитарная инфильтрация почек. Участки некроза эпителия чередуются с очагами-регенератами. Полностью регенерируют канальцы базальная мембрана которых сохранена. В очагах деструкции базальной мембраны возникают фокусы нефросклероза.


Патологическая анатомия ОПН.

**Макроскопически почка выглядит одинаково,
вне зависимости от стадии развития.**



**Увеличены, набухшие, отечные, фиброзная капсула наряжена,
снимается легко, корковый слой широкий, бледно-серый, отграничен
от темно-красных пирамид.**

Некроз эпителия извитых канальцев (некротический нефроз)



Плазмолизис, кариорексис.



Морфологические особенности почек в зависимости от причин ОПН.

«Сулемовая почка» - массивные отложения солей кальция в участках некроза эпителия извитых канальцев.

«Гемолитическая почка» - скопления в канальцах гемоглобина либо в виде аморфных масс, либо в виде кристаллов.

При отравлении сульфаниламидами – сульфаниламидные кристаллы в просвете канальцев.

Отравление антифризом – в просвете канальцев кристаллы оксалата кальция.

Хроническая почечная недостаточность


(ХПН) – синдром, медленно нарастающей почечной недостаточности, проявляющийся медленным нарастанием уровня креатинина и мочевины сыворотки крови.

**При ХПН наблюдается значительное повышение
Уровня креатинина и мочевины сыворотки крови,
Изменяется концентрация электролитов.**

Этиологические факторы хронической почечной недостаточности.

- 1. Первично-сморщенная почка (артериолосклеротический нефросклероз)
 - а. гипертоническая болезнь;**
 - б. симптоматические гипертензии (вазореальная, эндокринная ит.д.)****
- 2. Вторично-сморщенная почка - развивается при различных заболеваниях (пиелонефрит, гломерулонефрит и другие заболевания воспалительной природы).**
- 3. Дистрофические и диспластические процессы.**

**Первично-сморщенная почка
(сравнение с почкой нормальной величины)**



Хроническая почечная недостаточность (ХПН).

Выражается прогрессирующим необратимым повреждением клубочков- гломерулонефрит, амилоидоз, СД, ГБ, пиелонефрит.



Компенсаторное повышение клубочковой фильтрации, связанное с повышением давления в капиллярах оставшихся клубочков



Развитие компенсаторной гипертрофии



Развитие склероза в оставшихся клубочках



**УРЕМИ
Я**

Уремия.

Синдром, наблюдающийся при терминальном поражении почек и, в связи с этим выраженными функциональными нарушениями.

Нарушаются практически все функции почки:

Экскреторная функция. Ее нарушение приводит к повышению креатинина и мочевины сыворотки крови.

Снижение синтеза эритропоэтина. Нарушение этой функции приводит к развитию анемии.

Нарушение метаболизма углеводов, жиров, белков.

Дефекты в утилизации энергии.

Скорость клубочковой фильтрации и почечная недостаточность.

Скорость клубочковой фильтрации

**50%- 35%
от нормы**

**Заболевание протекает бессимптомно.
Компенсаторные механизмы напряжены.**

**35%- 20%
от нормы**

**Первые признаки почечной
недостаточности, азотемия.**

**Менее 20%
от нормы**

**Выраженная почечная недостаточность.
Ее терминальная стадия – уремия.**


Фибринозный перикардит



Фибринозный перикардит



Фибринозный плеврит



Экстраренальные проявления почечной недостаточности.

Кожа – серовато-зеленоватого цвета (наличие урохрома), с бархатистым налетом солей (хлориды, ураты), что связано с гиперфункцией потовых желез. Могут быть проявления геморрагического диатеза (геморрагическая сыпь, кровоизлияния).

Системное поражение слизистых оболочек дыхательной системы: уремический ларингит, бронхит, трахеит (воспаление имеет фибринозный или фибринозно-некротический характер).

Системное поражение слизистых оболочек ЖКТ (фарингит, гастрит, энтероколит), экссудат бывает катаральный, фибринозный или фибринозно-геморрагический.

Уремический полисерозит, уремический миокардит, отек с возможными очагами размягчения и кровоизлияний.

Селезенка увеличена, гиперплазирована, дает обильный соскоб пульпы.

Морфологическая основа развития фибринозного воспаления.

