



Кафедра акушерства и гинекологии




Плацентарная недостаточность Дистресс плода Задержка роста плода

Профессор
Жарких Анатолий Васильевич



- 1. В оплодотворенной яйцеклетке на стадии бластоцисты происходит реорганизация бластомеров на две субпопуляции: внутреннюю и наружную.
- 2. Внутренние клетки формируют эмбриобласт, из которого развивается зародышевый узелок, внезародышевая мезенхима, амнион, желточный мешок.
- 3. Наружные клетки – трофобласт, необходимый для имплантации (12-13 день эмбриогенеза).





Имплантация

- 1. Разрастание трофобласта и формирование из него хориона, дающего отростки (ворсинки) вглубь функционального слоя эндометрия матки.
- 2. Разрушение поверхностной сети капилляров эндометрия – излитие крови и образование лакун. Тяжи трофобласта, разделяющие лакуны, называются первичными ворсинками.
- 3. Бластоциста с этого времени называется плодным пузырем.
- 4. Врастание соединительной ткани (мезодермы) в первичные ворсины: превращение их во вторичные.
- 5. Разделение в ранние сроки беременности трофобластического эпителия на два слоя:
 - внутренний – шаровидные клетки Лангганса – цитотрофобласт
 - наружный – синцитий, не имеющий клеточных элементов (цитоплазма с большим количеством ядер)
- 6. Одновременное развитие эмбриобласта: формирование трех зародышевых листков (энто-, мезо- и эктодермы), из которых образуются все ткани и органы плода.


**Децидуальна оболонка
на ранніх строках вагітності**



**Імплантация заплідненої яйцеклітини
у децидуальну оболонку**



7. Завершение имплантации; затем вокруг зародыша формируется децидуальная оболочка, из базальной части которой формируется материнская часть плаценты.




Плацентация

- 1. Она начинается с третьей недели беременности и характеризуется развитием сосудистой сети ворсин: вторичные (бессосудистые) ворсины превращаются в третичные.
- 2. Проникновение крупных ветвей сосудов (артерии и вены) в хориальную пластинку и отходящие от нее ворсинки: устанавливается плодово-плацентарный кровоток (13-я неделя). Плацентация заканчивается к концу первого триместра; основные структуры плаценты сформированы.
- 3. Основная структурно-функциональная единица плаценты – котиледон (плацентон).
- Он образован стволовой ворсинкой первого порядка с отходящими от нее ворсинками второго и третьего порядка. В плаценте их насчитывается от 40 до 70.
- 4. В каждом котиледоне различают т.н. якорные ворсины, которые прикрепляются к децидуальной оболочке, и свободные, плавающие в материнской крови, которая циркулирует в межворсинчатом пространстве.
- 5. Межворсинчное пространство состоит из трех отделов:
 - артериальный в центре котиледона
 - капиллярный - в его основании
 - венозный, который соответствует субарахноидальному и междолевому пространству.

Плацентация



Розвиток плаценти




- 6. Из спиральных артерий кровь под большим давлением впадает в центральную часть котиледона, откуда поступает в вены, расположенные в основании котиледона и на периферии плаценты.
- 7. Материнский и плодовый кровоток не сообщается друг с другом. Их разделяет плацентарный барьер (ПБ)

Плацентация



Схематичне зображення плаценти



8. ПБ состоит из следующих компонентов ворсин: трофобласт, его базальная мембрана, строма, базальная мембрана эндотелия плодовых капилляров, эндотелий капилляров.

9. В терминальных ворсинках осуществляется обмен между кровью матери и плода. В синцитиокапиллярных мембранах непосредственно происходит транспорт и газообмен.



Основные функции плаценты

Плацента обеспечивает жизненно важные функции плода:

- Газообмен
- Трофическая
- Эндокринная
- Выделительная
- Защитная
- Антигенные и имунные свойства.

Все главные функции плаценты в первую очередь зависят от материнско-плацентарного и плодово-плацентарного кровообращения.



Плацентарная недостаточность




Плацентарная недостаточность (ПН)

- ПН – клинический синдром, обусловленный морфологическими и функциональными изменениями в плаценте.
- ПН – одна из главных проблем современного акушерства и перинатологии.
- Это патологическое состояние приводит к развитию гипотрофии и гипоксии плода и является основной причиной его антенатальной гибели.
- Частота ПН – 17 – 35% всех беременных.
- У 14 – 17% женщин с ПН развивается синдром задержки роста плода (ЗРП).



Терминология

- 1. Международная классификация болезней ВОЗ (10 – го пересмотра, Женева, 1995 г.)
 - плацентарная недостаточность
 - дисфункция плаценты
- 2. Клинические протоколы по акушерству и гинекологии (приказы МЗ Украины)
 - № 782 от 2005 года «**Задержка роста плода**»)
 - № 900 от 2006 года «**Дистресс плода при беременности и в родах**»

- 
- **«Дисфункция плаценты»** - это нарушение функции системы, органа или ткани организма, выражющееся неадекватностью реакции на действие раздражителей. В акушерской практике прочно укоренилось понятие «ПН». ПН отражает многофакторность в системе «мать-плацента-плод» и требует акушерского внимания ее на этапе ее начальных проявлений. Поэтому в практике используем понятие «ПН» как интегральный показатель неблагополучия в системе «мать-плацента-плод».



Эпидемиология

- ПН одинаково часто встречается как при акушерской, так и при экстрагенитальной патологии у беременных (15-35%)
 - угроза прерывания – практически у всех беременных,
 - преэклампсия, - 30,3%,
 - миома матки – 46%
 - АГ – 45%
 - анемия и изосерологическая несовместимость крови матери и плода – 32,2%
 - ожирение – 24%
 - перинатальная смертность при хронической ПН – 60%




Классификация

I. По клинико-морфологическим признакам

- 1. **Первичная** (ранняя) ПН (до 16 нед.) возникает при формировании плаценты под влиянием генетических, эндокринных, инфекционных и других факторов. ПН способствует ВПП, неразвивающейся беременности.
Клиника: угроза прерывания беременности или самопроизвольный аборт в ранние сроки.

- 2. **Вторичная** (поздняя) ПН возникает на фоне сформировавшейся плаценты после 16 недель под влиянием материнских факторов (артериальная гипотензия, гипертензия, инфаркты, отслойка плаценты, изменение реологических свойств крови, инфекция).




II. По клиническому течению

- **1. Острая** (быстрое нарушение маточно-плацентарного кровообращения). Проявлением острой ПН являются инфаркты, ПОНРП. В результате может быстро наступить смерть плода и прерывание беременности.
- **2. Хроническая** – наблюдается у каждой третьей беременной из группы высокого риска. Возникает уже во втором триместре беременности и протекает длительно.
- В хронической ПН в зависимости от степени морфологических нарушений выделяют такие формы:
 - А) гемодинамическая
 - Б)плацентарно-мембранная
 - В) клеточно-паренхиматозная



III. По состоянию компенсаторно-приспособительных механизмов в ХПН выделяют:

- **Относительная ПН** – при сохранности компенсаторных реакций в плаценте.
- **Абсолютная ПН** - наиболее тяжелая форма ХПН. Развивается на фоне нарушения созревания при повреждениях плаценты инволюционно-дистрофического, циркуляторного и воспалительного характера при отсутствии компенсаторно-приспособительных реакций хориона.



Этиология и патогенез

- ПН зависит от нарушений в самой плаценте, от наличия соматической и акушерской патологии у матери, а также от состояния плода.

Факторы риска развития ПН

- Социально-биологические: возраст матери и отца, неблагополучные условия работы, злоупотребление алкоголем, курение, росто-весовые показатели, эмоциональные нагрузки, семейное положение женщины.
- Акушерский анамнез: ПР, осложнения предыдущих родов, бесплодие, пороки развития матки, опухоли, ИЦН.
- Экстрагенитальные заболевания: сердечно-сосудистые, болезни почек, эндокринной системы, крови, острые и хронические инфекции.
- Осложнения данной беременности: кровотечения во второй половине, много- и маловодие, перенашивание и угроза прерывания, тяжелые формы гестоза, изоантителенная несовместимость крови матери и плода.
- Патология плода и ФПС (гипотрофия плода, снижение эстриола в моче).



Клиника

Основные клинические проявления хронической ПН являются **ЗРП** (гипотрофия) и его **внутриутробная гипоксия**.

Различают две основные формы ЗРП:

- - **симметричная гипотрофия плода** (гармонический тип) – пропорциональное отставание массы тела и длины плода
- -**асимметричная гипотрофия плода** (дисгармонический тип) – отставание массы тела при нормальной длине плода
- ПН может быть одним из проявлений антифосфолипидного синдрома (АФС).
- В основе его лежит образование аутоантител к фосфолипидным комплексам, которые в большом количестве находятся в эндотелии сосудов, тромбоцитах, тканях легких и мозга.
- Заболевание чаще развивается в молодом возрасте, встречается у детей и даже у новорожденных.
- Основные клинические проявления АФС: акушерская патология (перинатальные потери различного срока гестации, ЗРП, преэклампсия, ФПН и др.), артериальные и венозные тромбозы различной локализации, тромбоцитопения.



Перинатальные поражения новорожденных (65%)

- Гипоксия плода в родах, которая в дальнейшем проявляется в виде нарушений мозгового кровообращения гипоксическо-травматического генеза
- Гипотрофия (20%)
- Пороки развития
- Снижение мышечного тонуса и угнетение физиологических рефлексов.
- СДР, пневмония
- Острые респираторные вирусные инфекции, кишечные расстройства.




Диагностика ПН


- Диагноз ПН выставляется на основании результатов комплексного обследования беременных, данных тщательно собранного анамнеза с учетом условий жизни и труда, вредных привычек, экстрагенитальных заболеваний и осложнений беременности.

A. Определение степени и характера изменений в плаценте.

- 1. Динамическое наблюдение за комплексом гормонов ФПК
 - плацентарный лактоген (ПЛ), хорионический гонадотропин (ХГ) для диагностики состояния синцитиотрофобласта,
 - эстрадиол (Е2) и эстриол (Е3) для комплексной оценки ФПК (фетальные гормоны),
 - прогестерон (П2) – для оценки состояния системы мать-плацента.
- Уровень гормонов определяется в околоплодных водах, крови и моче беременных. ХГ – наиболее информативен в ранние сроки беременности, Пг – во второй половине беременности.




- **2.** Определение маточно-плацентарного кровотока с помощью динамической сцинтиграфии плаценты.
- **3.** Определение в крови активности ферментов – окситоциназы и термостабильной щелочной фосфатазы.
- **4.** УЗИ – локализация плаценты, ее структура и размеры (кальциноз, инфаркты, кисты, расширение межворсинчатых пространств)
- **5.** Допплерометрическое исследование дает возможность получить данные о нарушении маточного и фето-плацентарного кровообращения.



Б. Оценка состояния плода и ФПК.

- **1.** Определение ВДМ и ОЖ. Отставание размеров матки на 20 мм и больше в сроке 32-33 недели свидетельствует о ЗРП.
- **2.** Определение размеров плода (УЗИ): БПР головки, диаметр грудной клетки и живота. Достоверным признаком ЗРП является несоответствие в 2 недели и больше БПР головки плода фактическому сроку беременности.
- **3.** Изучение дыхательной активности плода с помощью БПП на протяжении не менее 30 минут.
- **4.** Изучение двигательной активности плода с помощью БПП (норма – 5 и более движений за 30 минут).

КТГ



5. Оценка сердечной деятельности плода с помощью КТГ. Во время анализа КТГ учитывают: базальную частоту сердечных сокращений (ЧСС), вариабельность ритма (частота и амплитуда осцилляций), наличие акцелераций и децелераций.



В. Функциональные пробы для изучения состояния плода:

- дозированные физические нагрузки,
- термическое раздражение кожи живота,
- введение вазоактивных препаратов,
- окситоциновый (стрессовый) тест.

Указанные диагностические мероприятия дают возможность выделить компенсированную, субкомпенсированную и декомпенсированную формы ПН.




Лечение ПН

Лечение ПН зависит от своевременной диагностики и лечения сопутствующих заболеваний и осложнений беременности.

Полностью ликвидировать морфофункциональные изменения в системе мать-плацента-плод невозможно. Методы проводимой терапии способствуют только стабилизации патологического процесса.


Цель лечения ПН

- - оптимизация гомеостаза
- - поддержка компенсаторно-приспособительных механизмов в системе мать-плацента-плод, что обеспечивает возможность пролонгирования беременности
- - подготовка к родоразрешению в оптимальные сроки



Терапия должна быть направлена на:

- - улучшение маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровообращения
- - интенсификацию газообмена
- - ликвидацию гиповолемии и гипопротеинемии
- - нормализацию сосудистого тонуса и сократительной активности матки
- - усиление антиоксидантной защиты
- - оптимизацию метаболических и обменных процессов

- 
- Стандартной схемы терапии ПН не может существовать вследствие индивидуальных сочетаний причинных факторов и патогенетических механизмов.

Подбор препаратов следует проводить индивидуально и дифференцированно с учетом степени тяжести и длительности ПН, этиологических факторов и патогенетических механизмов, что лежат в основе этой патологии.

- Терапию ПН начинают сразу после установления диагноза и проводят в стационаре не менее 4 недель с последующим её продолжением в ЖК. Общая длительность терапии составляет не менее 6-8 недель.
- Для оценки эффективности терапии проводят динамический контроль с помощью клинических, лабораторных и инструментальных методов исследования.
- Условия терапии ПН: режим беременной, полноценный отдых не менее 10-12 часов в сутки, ликвидация физических и эмоциональных перегрузок, рациональное сбалансированное питание.



Медикаментозная терапия

(Приказы МЗ Украины № 582 от 2003 г. и 624 от 2008 г.)

Для улучшения маточно-плацентарного кровообращения, реокоагуляционных свойств крови: эуфиллин, теоникол, трентал, реополиглюкин, гепарин, НМГ (клексан, фраксипарин), курантил.

- Для улучшения функции плаценты: актовегин, инстено, эссенциале, гипербарическая оксигенация, озонотерапия.
- Метаболическая терапия: рибофлавин, цианокобаламин, оротат калия, витамин В1, фолиевая кислота, хофитол, метионин.
- У женщин с угрозой прерывания беременности профилактика респираторного дистресс-синдрома плода с 24 по 34 неделю: дексаметазон в/м 6 мг каждые 12 часов – 24 мг или бетаметазон 12 мг каждые 24 часа – 24 мг.
- Для улучшения иммунного ответа организма матери на антигены ФПК: имунал, рефирон, виферон, анти-Rh(D) иммуноглобулин, сорбционная терапия (энтеросорбенты), системная энзимотерапия (вобензим), плазмаферез при инфекционных заболеваниях.



Профилактика ПН

Один из основных методов профилактики – раннее выявление и взятие на учет беременных группы риска развития ПН.


- Режим с полноценным отдыхом, ночным сном не менее 8-10 часов, дневным не менее 2-х часов, пребывание на свежем воздухе 3-4 часа.
- Рациональное сбалансированное питание (5-6 приемов небольшими порциями). В суточном рационе не менее 50% белков животного происхождения. Энергетическая ценность – 2500 ккал в день.
- Объем жидкости до 1-1,5 л.
- Дополнительный прием витаминов А и С.
- Медикаментозная профилактика - те же средства, что и для лечения.
- Профилактические мероприятия проводятся в 14-16 и 28-34 недели. Длительность каждого из курсов не менее 6-8 недель.
- Обязательная часть профилактических мероприятий-оценка их эффективности,
- оценка развития беременности, формирования плаценты, роста и развития плода на основе ультразвукового и лабораторного скрининга.
- Своевременная госпитализация беременных в акушерский стационар для подготовки к родам и решения вопроса о методе родоразрешения.



ДИСТРЕСС ПЛОДА

(во время беременности)

Приказ МЗ Украины №900 от 2006 года



■ Все нарушения функционального состояния плода в настоящее время обозначают термином «**дистресс плода**». Термины «хроническая гипоксия» и «острая гипоксия», «угроза гипоксии или асфиксии» не используются. Эти термины не являются клиническими, т.к. для диагностики этих состояний в обычной врачебной практике не используются показатели кислородного обеспечения плода (метаболический ацидоз)

ДИАГНОСТИКА

- Аусcultация сердечной деятельности (норма – **110-170** ударов в минуту),
- биофизический профиль плода (БПП)(с 30 недели беременности),
- допплерометрия скорости кровотока в атерии пуповины.

Оценка результатов определения показателей биофизического профиля плода

Параметри	Бали		
	2	1	0
Нестресовий тест (реактивність серцевої діяльності плода після його рухів за даними КТГ)	5 і більше акцелерацій ЧСС амплітудою не менше 15 уд./хв., тривалістю не менше 15 с, пов'язаних із рухами плода за 20 хвилин спостереження	2-4 акцелерацій ЧСС амплітудою не менше 15 уд./хв., тривалістю не менше 15 с, пов'язаних із рухами плода за 20 хвилин спостереження н	1 акцелерація або відсутність її за 20 хв. спостереження
Дихальні рухи плода (ДРП)	Не менше одного епізоду ДРП тривалістю 60 с. і більш за 30 хв. спостереження	Не менше одного епізоду ДРП тривалістю від 30 до 60 с. за 30 хв. спостереження	ДРП тривалістю менше 30 с. або їх відсутність за 3 хв. спостереження
Рухова активність плода	Не менше 3 генералізованих рухів за 30 хв. спостереження	1 або 2 генералізованих рухів за 30 хв. спостереження	Відсутність генералізованих рухів

Оценка результатов определения показателей биофизического профиля плода

Параметри	Бали		
	2	1	0
Тонус плода	Один епізод і більше розгинань із поверненням у згинальне положення хребта та кінцівок за 30 хв. спостереження	Не менше одного епізоду розгинання із поверненням у згинальне положення за 30 хв. спостереження	Кінцівки в розгинальному положенні
Об'єм навколоплідних вод	Води визначаються у матці, вертикальний діаметр вільної ділянки вод і більше	Вертикальний розмір вільної ділянки вод більше , але не менше	Тісне розташування дрібних частин плода, вертикальний діаметр вільної ділянки менше 1 см
Оцінка БПП	7-10 балів - задовільний стан плода; 5-6 балів - сумнівний тест (повторити через 2-3 дні) 4 балів і нижче - патологічна оцінка БПП (вирішити питання про термінове розродження)		



Ведение беременности

- Лечение сопутствующих заболеваний.
- Поэтапное динамическое наблюдение за состоянием плода.
- Амбулаторное наблюдение и пролонгирование беременности до доношенного срока при нормальных показателях БПП.
- Изучение БПП.
- Выявление ухудшения показателей плодового кровотока является показанием к экстренному родоразрешению путем кесаревого сечения.
- Госпитализация беременной в ОПБ при плохих показателях БПП.

Лечение

- До 30 недель лечение сопутствующих заболеваний, приводящих к возникновению дистресса плода.
- После 30 недель – наиболее эффективным и оправданным методом лечения является оперативное родоразрешение.

Методы родоразрешения

- 1. Через естественные родовые пути.
- 2. Оперативное



Дистресс плода в родах

ДИАГНОСТИКА


- 1. Аусcultация плода.
- 2. Кардиотокография.

- При выявлении дистресса плода необходимо срочное родоразрешение:
 - I период родов – кесарево сечение
 - II период родов: при головном прилежании - акушерские щипцы, при тазовом – экстракция плода за тазовый конец.



Задержка роста плода (ЗРП)

Приказ МЗ Украины № 782 от 2005 г.



Это осложнение беременности, развивающееся вследствие плацентарной недостаточности и приводящее к рождению детей с малыми росто-весовыми параметрами.

ФОРМЫ ЗРП

- **Симметричная** – масса и длина плода пропорционально снижены, все органы равномерно уменьшены в размерах.
- **Ассиметрическая** – снижение массы плода при нормальных показателях его длины, непропорциональными размерами разных органов плода.

ФАКТОРЫ РИСКА ЗРП

- Медицинские (общие и акушерские)
- Социально-экономические

ДИАГНОСТИКА

- Биометрические методы
 - высота стояния дна матки (ВДМ) во II-III триместрах
 - ультразвуковая фетометрия (с 20 недель)
- Мониторинг состояния плода
- БПП (таблица) – оценивается сумма баллов отдельных биофизических параметров.
- Допплерометрия скорости кровотока а артериях пуповины.



Тактика ведения беременных с ЗРП

1. Лечение заболеваний беременной.
2. Поэтапное динамическое наблюдение за плодом:
 - амбулаторное наблюдение при нормальных показателях БПП
 - госпитализация в акушерский стационар III уровня оказания медицинской помощи при наличии патологии БПП

Поскольку нет эффективного метода лечения ЗРП и дистресса плода, ключевым моментом в ведении таких беременных является четкая оценка состояния плода и своевременное родоразрешение:

- -до 30 недель – индивидуально в зависимости от акушерской ситуации
- -после 30 недель – операция кесарева сечения.



Роды

1. Через естественные родовые пути под кардиомониторным наблюдением за состоянием плода при отсутствии дистресса плода(БПП 6 баллов и выше)

2. Кесарево сечение:

- а) при патологическом кровотоке (нулевой и реверсный) независимо от срока беременности
- б) при остром дистрессе плода (ЧСС менее 100 уд/мин)
- в) при патологическом БПП (4 балла и ниже) при отсутствии готовности зрелости шейки матки (после 30 недель беременности).



Благодарим за внимание!

