

Выполнила ученица 11Б Удальцова Ульяна.

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ.



▪ **ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем)** — группа инфекций, которые передаются от человека к человеку при сексуальном контакте.


▪ ЗППП поражают *не только половые органы, но и весь организм*, и нередко приводят к серьезным последствиям.



▪ Современная медицина насчитывает около 30 инфекций, которые можно отнести к ЗППП. Большая часть из них может протекать бессимптомно, и это делает их весьма опасными для здоровья разных органов и систем.

Наиболее часто у человека диагностируются следующие ЗППП:

- *Сифилис.*
- *Гонорея.*
- *Трихомониаз.*
- *Хламидиоз.*
- *Микоплазмоз.*
- *Гарднереллез.*
- *Вирус папилломы человека.*
- *Генитальный герпес.*
- *Цитомегаловирус.*
- *ВИЧ.*
- *Гепатит.*
- *Кандидоз.*




ВИЧ или вирус иммунодефицита человека.

- Самое опасное заболевание, передающееся половым путем. ВИЧ дает о себе знать далеко не сразу — инкубационный период заболевания длится от 21 до 90 дней. Симптомы: воспаление лимфатических узлов, хроническая слабость, головные боли, потеря аппетита, повышение температуры тела до 37-37,5 градусов. Организм атакуют всевозможные вирусные и бактериальные заболевания: пневмония, герпес, туберкулез, кандидоз. Как следствие — развивается СПИД.

Передача ВИЧ от зараженного человека здоровому возможна тремя путями



Через кровь, например, при использовании загрязненных кровью шприцев



Половой путь



«Мать-дитя» при беременности и кормлении грудью



Гепатит.

- *Воспалительные процессы в печени.*
Могут быть как стремительными и быстро излечимыми, так и опасными с тяжелыми последствиями – фиброз, рак, цирроз и т. д. Вирусных гепатитов 5 видов – А, В, С, Д, Е.


- *Симптоматика:*

1. тошнота,
2. рвота;
3. накопление жидкости в области живота;
4. диарея или запор;
5. острые и тупые боли в животе;
6. вздутие;
7. изменение цвета кала и мочи;
8. изменение цвета глазных белков и кожи т. д.



Сифилис.


- Системное, хроническое заболевание, поражающее кожу человека, слизистые оболочки, органы, нервную и костную системы. Возбудитель – трепонема паллидум. С момента заражения до проявления болезни – от 3 дней до 3 недель. Сифилис состоит из 4 периодов: инкубации, первичного вторичного и третичного.



- Симптоматика – формирование твердого шанкра, язвочки, окруженной отечностью тканей. Внутри шанкра – гной.
- Обычно возникает возле влагалища, на губе, в ротовой полости, в редких случаях рядом с задним проходом. У мужчин может поразить мошонку или половой член.


Гонорея.

- Второе название *триппер*, возбудитель – гонококк, нейссерия гонореи. Поражаются слизистые на половых и мочеиспускательных зонах. Также может быть поражена слизистая прямой кишки, рта, глотки, конъюнктивы.
- Симптоматика:
 - выделения желтого, белого оттенка из полового члена, влагалища;
 - болевые ощущения внизу живота;
 - кровотечения в межменструальные периоды;
 - боли и рези при мочеиспускании.



Трихомониаз.

- Инфекционное заболевание мочеполовой системы, которое вызывается влагалищной трихомонадой.




Симптомы:

- зуд в области половых органов;
- жжение и рези при мочеиспускании;
- частые позывы в туалет;
- аномальные выделения из уретры или влагалища;
- резкий гнилостный запах;
- мутная моча, примеси гноя или крови.


Хламидиоз.

- Возбудитель – хламидия трахоматис. Инкубационный период – от недели до нескольких месяцев.
- Хламидии обычно поражают половые органы: шейку матки, влагалище, придатки, трубы, эндометрии, мочевого пузыря и бартолиниевую железу. Вследствие возникает воспалительный процесс слизистой оболочки, сопровождаемый:
 - болями внизу живота;
 - частым и нарушенным мочеиспусканием;
 - болезненным мочеиспусканием;
 - болевыми ощущениями в пояснице;
 - повышенной температурой и влажностью в области гениталий;
 - необычными выделениями;
 - зудом, жжением.




Микоплазмоз.

Возбудитель — бактерия микоплазма. В первые дни после инфицирования никак себя не проявляет, затем возникают боли при сексуальном контакте, зуд и жжение во время вытока мочи. Опасными последствиями микоплазмоза могут быть: пиелонефрит; бесплодие; воспаление яичников, яичек. У беременных может стать причиной выкидыша, преждевременных родов.



Уреаплазмоз.

- Возбудитель — уреаплазма, бактерия, обитаемая на слизистой оболочке мочевого канала и половых органов.
- Симптомы:
 - уретрит негонококковый;
 - выделения;
 - боли и рези при половом контакте и вытоке мочи;
 - воспаление яичек;
 - бесплодие;
 - болезненные ощущения внизу живота.




Генитальный герпес.



- Вирусное заболевание с крайне высокой восприимчивостью. Передается не только при половом акте, но и при контакте «кожа с кожей». Возбудитель — вирус простого герпеса. Через сутки после заражения появляются маленькие пузырьки на наружных половых органах. Они сопровождаются зудом и легким пощипыванием. В следующие несколько дней происходит превращение пузырьков в болезненные язвочки, наблюдается лихорадка и увеличение лимфатических узлов. Высыпания — лишь видимая часть болезни. Даже после их исчезновения вирус герпеса остается в организме на всю жизнь.

Мать с активной герпетической инфекцией (хотя активная инфекция может быть незаметна)



Волдыри из-за врожденного герпеса


Папилломавирус человека.

Для инфекции типично проникновение в организм половым и бытовым способом. Внешние признаки – остроконечные кондиломы и бородавки на слизистых тканях детородных органов и ануса. Некоторые разновидности, особенно, опасны – они приводят к онкологии груди и шейки матки у женщин.




Гарднереллез.

- Воспалительное заболевание мочеполовых органов, обусловленное ростом условно-патогенной бактерии *Gardnerella vaginalis*.
- Симптомы:
 - Непроходящее ощущение жжения и зуда.
 - Изменение менструального цикла.
 - Возникновение запаха «гнилой» рыбы.
 - Усиление менструального кровотечения.
 - Нарушение мочеиспускания – частые позывы, зуд или боль при походе в туалет, уменьшение объема мочи.
 - Болезненность во время сексуального контакта.



Цитомегаловирус.



В 95% случаев внутриутробное инфицирование плода цитомегаловирусом не вызывает развития заболевания, а протекает бессимптомно.

Венерические заболевания, передаваемые бытовым путём:

- Сифилис попадает на одежду, постельное белье, полотенце, мыло, зубную щетку, мочалку, с мочой и слюной может попадать на поверхность унитаза, раковины, ванны. Также с рук больного человека может осесть на всех предметах, которыми он пользуется. Далее с этих предметов возбудитель сифилиса переносится на кожу или слизистые здорового человека и вызывает у него заболевание.
- ВИЧ и гепатиты передаются бытовым путем, если на поверхности предметов находится кровь, слюна или другие биологические жидкости с примесью крови, в которой некоторое время находится вирус иммунодефицита или гепатита.
- Возбудители венерических уретритов и вагинитов такие, как гонококк, хламидия, уреоплазма, трихомонада, гарднерелла находятся в огромном количестве в выделениях, налетах, слизи. Основная их масса остается на одежде, полотенце, руках больного человека, с которых переходит на окружающие предметы и далее к вновь инфицированному. Очень часто наблюдаем попадание этих инфекций в глаза, нос и ротоглотку, вызывая воспаление этих органов.
- Вирус папилломы человека, ВПЧ передается также контактным путем, попадая на слизистые оболочки и вызывая появление различных наростов, бородавок и кондилом.
- Случаи бытового инфицирования кандидозом – молочница у женщин, выявлены были при совместном использовании постельного и нижнего белья, средств гигиены.

Профилактика.

- отказ от случайных половых связей;
- информирование населения относительно путей передачи, симптомов, последствий инфекционных заболеваний передающихся половым путем;
- секс только с одним партнером;
- обязательное применение барьерных методов контрацепции, то есть презервативов;
- соблюдение правил личной гигиены, что подразумевает использование только своих мочалок, полотенце, белья;
- посещение гинеколога 1 раз в 6 месяцев для женщин и уролога 1 раз в год для мужчин с обязательной сдачей анализов на ЗППП;
- следует пользоваться услугами татуажа, косметолога, маникюра исключительно в проверенных салонах;
- вакцинация против некоторых вирусов (гепатит, ВПЧ);
- немедленное обращение к врачу после незащищенного полового акта и обнаружения тревожных симптомов после него.



Вывод.

- Венерические заболевания, передаваемые через интимный контакт, долгое время скрываются пациентами. Им банально стыдно за недуг, что позволяет болезнетворным микроорганизмам размножаться и поражать не только половые, но и внутренние органы человека. Во-первых, – такой подход к вопросу не принесет ничего хорошего. Во-вторых, есть смысл начать стыдиться своих поступков при частой смене партнеров по сексу и легкомысленном отношении к вопросам защищенного секса.
- Особая ответственность лежит на плечах родителей, воспитывающих молодежь. Необходимо вести с любимым чадом беседы о защищенном сексе с подросткового возраста и о том, какие виды заболеваний передаются половым путем.

С ПОЛНЫМ БУКЕТОМ -
ВНЕ ОЧЕРЕДИ!

ВЕНЕРОЛОГ

CARICATURA.RU

