

СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАФЕДРА: ИНТЕРНАТУРА БОЙЫНША ЖАЛПЫ ДӘРІГЕРЛІК КӨМЕК КАЕДРАСЫ

ТАҚЫРЫБЫ: **БЖАИЖ.Анемия.**



СЕМЕЙ
2017 ЖЫЛ

ОРЫНДАҒАН: СЕТЕРБАЕВ А.А
608 ТОП
ТЕКСЕРГЕН: ДОСБАЕВА А.М

ЖАЛПЫ ҚАУІП БЕЛГІЛЕРІ БАР МА, ТЕКСЕРІҢІЗ.

СҰЙЫҚ ІШЕ
АЛМАЙДЫ ӘЛДЕ
ЕМШЕК СОРА
АЛМАЙДЫ

ТАМАҚТАН КЕЙІН
НЕМЕСЕ
СҰЙЫҚ ІШУДЕН КЕЙІН
ҚҰСУ БОЛДЫ

ОСЫ АУРУ КЕЗІНДЕ
ТЫРЫСУ БОЛДЫ.

ЕСІНЕН ТАНҒАН
НЕМЕСЕ ЛЕТАРГИЯЛЫҚ

**СОНАН KEЙІН БАЛАНЫҢ ТАМАҚТАНУЫНДА БҰЗЫЛЫСТАР
ЖӘНЕ АНЕМИЯ БАР, ЖОҚТЫҒЫН АНЫҚТАҢЫЗ.**



Қараңыз, көзге көрінетін ауыр арықтау бар ма?

Қараңыз, алақаны бозғылт емес пе екендігін. Айқын?
Шамалы?

Қараңыз, екі тобықта ісік бар, жоқ?

Бала салмағының жасына сәйкес екендігін анықтаңыз.

Қараңыз,көзге көрінетін ауыр арықтау бар ма?

Көзге көрінетін ауыр арықтау бар-жоғын тексеру үшін, нәрестені шешіндіріңіз. Қараңыз, иық, білек, бөкселер мен аяқтардағы бұлшықеттердің көрінетін ауыр арықтауы байқалады ма. Баланың жамбастарын қараңыз. Егер сіз оларды кеуде және іш бөлігін салыстырсаңыз, олар кіші болып көрінуі мүмкін. Бөкселерде майлы қабат бар-жоғын білу үшін балаға бүйірінен қараңыз. Бөкселер мен жамбастарда тым көп сарқылу кезінде, терінің көптеген қатпарлары болады. Бөкселеріне салынған шалбар киген секілді көрінеді.



Қараңыз, алақаны бозғылт емес пе екендігін.



Баланың алақанының түсін өз қолымен, сондай-ақ басқа балалар алақанымен салыстырыңыз.

Егер баланың алақанындағы тері бозғылт болса, онда бала алақанының шамалы бозару.

Егер баланың алақанындағы терісі өте ақшыл немесе ақшыл болса, айқын алақанның бозаруы.

Қараңыз, екі тобықта ісік бар ма?

Баланың екі аяғының ісінуі бар-жоғын анықтап көріңіз. Бас саусақтарыңызды әрбір аяғының арт жағына бірнеше секунд басып тұрыңыз және алыңыз. Егер аяқтан саусақты алып тастағаннан кейін, баланың аяғында із болса, ол тобықта ісік бар екенін білдіреді.




Қараңыз, көзге көрінетін ауыр арықтау бар екендігі.

- Баланың салмағын өлшеңіз (баланың салмағы бүгінгі күні өлшенбесе). Салмақ өлшер кезінде бала жұқа киінуі керек.
- Баланың жасын айларда есептеңіз (3 айға дейін - апталарда).
- Баланың салмағы аз екенін анықтау үшін графиктен бала жасын салмаққа сәйкес келетін анықтаңыз.

- 0-ден 6 айға дейінгі қыздарға арналған.
- 6 айдан 2 жасқа дейінгі қыздарға арналған.
- 2 жастан 5 жасқа дейінгі қыздарға арналған.
- 0-ден 6 айға дейінгі ұлдарға.
- 6 жастан 2 жасқа дейінгі ұлдар үшін.
- 2 жастан 5 жасқа дейінгі жасөспірімдерге .


Weight-for-age BOYS

Birth to 6 months (Z-scores)



Weight-for-age GIRLS

0 months to 5 years (Z-scores)



<ul style="list-style-type: none"> • Көрініп тұрған ауру арықтау немесе: • Алақанның айқын бозғылттығы немесе • Екі тобықтың ісінуі 	<p>АУЫР ТАМАҚТАНУ БҰЗЫЛЫСЫ НЕМЕСЕ АУЫР АНЕМИЯ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ ЖЕДЕЛ стационарға жіберіңіз □ Витамин А тағайындаңыз.
<ul style="list-style-type: none"> • Алақанның шамалы бозғылттығы немесе • Бала салмағы төмен жасына сәйкес емес. 	<p>САЛМАҒЫ ТӨМЕН НЕМЕСЕ АНЕМИЯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ Баланың тамақтануына баға беріңіз және анасына түсіндіру жүйесі бойынша тамақтандыру мәселелеріне түсіндірме беріңіз. □ Егер бозару болса: темір препаратын беріңіз. Анасына қашан қаралу керек екенін түсіндіріңіз. Егер бозару сақталса, қайта қарау 14 күннен кейін. Егер салмағы жасына сай болмаса, қайта қаралу 14 күннен кейін.
<p>Анемия немесе тамақтанудың бұзылуының басқа белгілері боламса және салмағы жасына сәйкес болса.</p>	<p>АНЕМИЯ ЖОҚ НЕМЕСЕ САЛМАҒЫ ТӨМЕН ЕМЕС.</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ Егер баланың жасы 2-ге толмаса, тамақтануына баға беріңіз және анасына. Анасына консультация беру схемасына сәйкес тамақтандыру туралы нұсқау беріңіз. □ Егер тамақтануда проблема болса, келесі қарау 5 күннен кейін. Анасына қашан қайта қаралу керегін түсіндіріңіз.

А ВИТАМИНІНІН БЕРІҢІЗ.

**2 дозасын беріңіз. Бірінші дозасын амбулаторияда беріңіз.
Анасына келесі күні үйінде беру үшін 1 доза беріңіз.**



ЖАСЫ	А Витамині капсулада	
	200000 ХБ	50 000 ХБ
6 айға дейін	1/2 капсула.	1 капсула.
6 айдан 12 айға дейін	1 капсула.	2 капсула.
12 айдан 5айға дейін.	2 капсула.	4 капсула.

**ТЕМІР ПРЕПАРАТТАРЫН БЕРІҢІЗ.
14 күн бойы, күніне бір дозасын беріңіз.**

ЖАСЫ НЕМЕСЕ САЛМАҒЫ	ТАБЛЕТКА-ТЕМІР/ ФОЛАТ Темір сульфаты 200 мг + 250 мг Фолат (60 мг элем- ентарлы темір).	ТЕМІР СИРОПЫ 5 мл-де темір фумараты 100 мг (1 мл-де 20 мг элементарлы темір).
2 айдан 4айға дейін (4<)		1,00 мл (< 1/4 ш.к.)
4 айдан 12айға дейін (6<)		1,25 мл (1/4 ш.к.)
12 айдан 3 айға дейін (10<)	1 / 2таблетка	2,00 мл (< 1 /2 ш.к.)
3 айдан 5айға дейін (14<)	1 / 2 таблетка	2,5 мл (1 / 2 ш.к.)