НАСЕКОМЫЕ-ВРЕДИТЕЛИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ И ПЕРЕНОСЧИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА

Прямокрылые
Азиатская перелетная саранча

- Одно насекомое съедает до 250-300 г зелёной массы. Личинки саранчи объедают всё растение целиком, а взрослые особи могут просто перегрызать основания стеблей.

Тли

- Угнетают развитие растений, высасывая из них сок.
- Могут переносить вирусы, вызывающие болезни растений.

Клоп постельный – кровососущий паразит

Майский жук – вредитель леса

Яблонная плодожорка

Небольшая серая бабочка, в размахе крыльев до 18мм. Повреждает гусеница желто-белого или розоватого цвета с коричневой головой, плоды яблони, реже – груши. Гусеницы появляются после цветения и вгрызаются в мякоть плодов. Проникнув в семенную камеру, выедают часть семян. В результате поврежденные плоды теряют товарную ценность и не пригодны к хранению. В отдельные годы с засушливым летом плодожорка уничтожает до50-60% урожая.

Оводы

Личинки оводов, которые развиваются под кожей млекопитающих, вызывают воспаление.

Тараканы

Загрязняют и портят своими экскрементами продукты питания. Могут переносить различные болезнетворные микроорганизмы и яйца глистов. Выделения тараканов часто вызывают аллергию у людей.

Вши

Питаются кровью человека. Являются переносчиками сыпного и возвратного тифа.

Блохи

Бескрылые насекомые длиной до 5 мм. Сплющенное с боков тело приспособлено к обитанию в шерсти зверей и в перьях птиц. Задние ноги прыгательные. Ротовой аппарат колюще-сосущий.

Методы борьбы с насекомыми-вредителями

1) Физические
2) Химические
3) Агротехнические
4) Биологические