



СЕВЕРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО  
УНИВЕРСИТЕТА "МИФИ"

Кафедра ВМиИТ

# СПЕЦ. ГЛАВЫ МАТЕМАТИКИ

Лектор к. ф.-м. н.  
Фаустова И.Л.

Северск 2017

# Глава 1. Дифференциальные уравнения

## *Тема 1. Дифференциальные уравнения первого порядка*

§1. Основные понятия

§2. Теорема существования и единственности решения задачи Коши для уравнения  $y' = f(x,y)$

§3. Уравнения с разделенными переменными

§4. Уравнения с разделяющимися переменными

§5. Однородные уравнения

§6. Уравнения, приводящиеся к однородным

§7. Линейные уравнения первого порядка

§8. Уравнение Бернулли

§9. Уравнения в полных дифференциалах

§10. Интегрирующий множитель

# §1. Основные понятия

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ.** *Обыкновенным дифференциальным уравнением* (ОДУ) называется уравнение, связывающее независимую переменную  $x$ , искомую функцию  $y = y(x)$  и ее производные  $y'(x)$ ,  $y''(x)$ , ...,  $y^{(n)}(x)$ .

⇒ в общем случае ОДУ имеет вид

$$F(x, y, y', y'', y''', \dots, y^{(n)}) = 0.$$

Порядок старшей производной, входящей в ОДУ, называется *порядком дифференциального уравнения*.

**ПРИМЕР.** Определить порядок уравнений:

$$\begin{array}{lll} y' + xy - x^2 = 0, & x(y')^2 + e^x = 0, & (y')^5 + e^{y^2} = 0, \\ xy'' - (y')^3 - y = 0, & y'' - y' = 1, & y^2 - y''' + x^5 = 0. \end{array}$$

**Замечание.** Уравнение, связывающее неизвестную функцию  $y$  и переменных, ее аргументы и ее частные производные, называется **уравнением в частных производных**.

Функция  $y = \phi(x)$  называется **решением дифференциального уравнения** на интервале  $(a;b)$ , если при ее подстановке в это уравнение получается тождество, справедливое для всех  $x$  из интервала  $(a;b)$ .

ПРИМЕР.

1)  $y = \cos x$  – решение ДУ  $y'' + y = 0$  на  $(-\infty, +\infty)$ ;

2)  $y = \sqrt{1 - x^2}$  – решение ДУ  $y' = -\frac{x}{y}$  в интервале  $(-1; 1)$ .

Уравнение  $\Phi(x,y) = 0$ , задающее в неявном виде решение дифференциального уравнения, называется **интегралом дифференциального уравнения**.

График решения (интеграла) дифференциального уравнения называется **интегральной кривой**.

Процесс нахождения решений дифференциального уравнения называется **интегрированием дифференциального уравнения**.

Дифференциальное уравнение называется ***интегрируемым в квадратурах***, если все его решения могут быть получены в результате конечной последовательности элементарных действий над известными функциями и интегрированием этих функций.

## §2. Теорема существования и единственности решения задачи Коши для уравнения $y' = f(x,y)$

Общий вид ДУ 1-го порядка:

$$F(x, y, y') = 0, \quad (1)$$

где  $x$  – независимая переменная,  $y$  – неизвестная функция,  $y'$  – ее производная,  $F$  – заданная функция трех переменных.

*Дифференциальное уравнение первого порядка, которое можно записать в виде  $y' = f(x,y)$  (2)*

*называется **уравнением первого порядка, разрешенным относительно производной.***

## ТЕОРЕМА 1 (Коши).

Пусть для уравнения  $y' = f(x, y)$  выполняются два условия:

- 1)  $f(x, y)$  непрерывна в некоторой области  $D$  плоскости  $xOy$ ,
- 2)  $f'_y(x, y)$  в области  $D$  ограничена.

Тогда для любой точки  $M_0(x_0, y_0) \in D$  существует единственное решение  $y = \phi(x)$  уравнения (2), определенное в некотором интервале  $(a; b)$  содержащем точку  $x_0$ , и удовлетворяющее условию  $y_0 = \phi(x_0)$ .

Числа  $x_0, y_0$  называются **начальными значениями (данными)** для решения  $y = \phi(x)$ .

Условие  $y(x_0) = y_0$  называется **начальным условием**.

Геометрически, задание начального условия означает, что на плоскости  $xOy$  задается точка  $(x_0, y_0)$ , через которую проходит интегральная кривая  $y(x)$ .

Задача нахождения решения дифференциального уравнения  $F(x, y, y') = 0$ , удовлетворяющего начальному условию  $y(x_0) = y_0$ , называется **задачей Коши**.

Теорему **1** называют **теоремой существования и единственности решения задачи Коши** для ДУ 1-го порядка, разрешенного относительно производной.

Решение (интеграл), в каждой точке которого выполняется условие единственности, называется **частным**.

Решение (интеграл)  $y = \psi(x)$ , в каждой точке которого нарушено условие единственности (т.е. через каждую точку кривой  $y = \psi(x)$  проходит еще хотя бы одна, отличная от  $y = \psi(x)$ , интегральная кривая), называется **особым**.

График особого решения называют **особой интегральной кривой уравнения**.



**Замечание.** Теорема 1 дает достаточные условия существования и единственности решения задачи Коши.

$\Rightarrow$  Возможно, что в точке  $(x_0, y_0)$  условия теоремы 1 не выполняются, а решение  $y = y(x)$  уравнения (2), удовлетворяющее условию  $y(x_0) = y_0$ , существует и единственно.

Из теоремы 1  $\Rightarrow$

- 1) вся область  $D$  покрыта интегральными кривыми уравнения (2), которые нигде между собой не пересекаются;
- 2) ДУ (2) имеет множество решений. Совокупность решений зависит от произвольной постоянной.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ.** *Общим решением* дифференциального уравнения  $y' = f(x, y)$  в области  $D$  существования и единственности решения задачи Коши называется функция

$$y = \phi(x, C),$$

зависящая от  $x$  и одной произвольной постоянной  $C$ , которая удовлетворяет следующим двум условиям:

- 1) при любом допустимом значении постоянной  $C$  она удовлетворяет уравнению (2);
- 2) каково бы ни было начальное условие  $y(x_0) = y_0$  (где  $(x_0, y_0) \in D$ ), можно найти единственное значение  $C = C_0$  такое, что функция  $y = \phi(x, C_0)$  удовлетворяет данному начальному условию.

Уравнение  $\Phi(x, y, C) = 0$ , задающее общее решение в неявном виде, называется *общим интегралом уравнения*.

Любое решение (интеграл), получающееся из общего решения (интеграла) при конкретном значении постоянной  $C$  (включая  $C = \pm\infty$ ), является частным.


Особое решение, очевидно, не входит в общее решение дифференциального уравнения.

Особое решение всегда «теряется» в процессе интегрирования и обладает тем свойством, что оно может быть включено в общее решение, если допустить  $C = C(x)$ .

С геометрической точки зрения особая интегральная кривая является огибающей семейства интегральных кривых.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ.** *Линия  $\ell$  называется **огибающей** однопараметрического семейства кривых, если она в каждой своей точке касается одной кривой семейства, причем в различных точках она касается различных кривых.*

ПРИМЕР. Прямые  $y = \pm R$  являются огибающими семейства окружностей  $(x + C)^2 + y^2 = R^2$ .



### §3. Уравнения с разделенными переменными

ДУ 1-го порядка, разрешенное относительно  $y'$ , имеет две формы записи:

1) обычную, т.е.  $y' = f(x,y)$ ,

2) *дифференциальную*, т.е.

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0. \quad (3)$$

При этом, если уравнение записано в виде (3), то обычно предполагают, что переменные  $x$  и  $y$  равноправны.

*Дифференциальным уравнением с разделенными переменными* называется уравнение, дифференциальная форма которого имеет вид

$$f(x)dx + \phi(y)dy = 0, \quad (4)$$

где  $f(x)$  и  $\phi(y)$  – непрерывные функции.

Пусть  $F(x)$  – первообразная функции  $f(x)$ ,  
 $\Phi(y)$  – первообразная функции  $\phi(y)$ .

Тогда общий интеграл уравнения (4) имеет вид:

$$F(x) + \Phi(y) = C,$$

где  $C$  – произвольная постоянная.

**Замечание.** В теории дифференциальных уравнений символом

$$\int f(x)dx$$

принято обозначать ОДНУ из первообразных функции  $f(x)$  (а не все множество первообразных, как это принято в других разделах математического анализа).

Поэтому общий интеграл уравнения (4) принято записывать в виде:

$$\int f(x)dx + \int \phi(y)dy = C,$$

где  $C$  – произвольная постоянная.

## §4. Уравнения с разделяющимися переменными

*Дифференциальным уравнением с разделяющимися*

*переменными* называется уравнение, дифференциальная форма которого имеет вид

$$f_1(x) \cdot \phi_1(y)dx + f_2(x) \cdot \phi_2(y)dy = 0, \quad (5)$$

где  $f_1(x), f_2(x), \phi_1(y), \phi_2(y)$  – непрерывные функции.

Разделим обе части уравнения на  $\phi_1(y) \cdot f_2(x)$ :

$$\frac{f_1(x)}{f_2(x)} dx + \frac{\phi_2(y)}{\phi_1(y)} dy = 0.$$

⇒ Общий интеграл уравнения (5) имеет вид:

$$\int \frac{f_1(x)}{f_2(x)} dx + \int \frac{\phi_2(y)}{\phi_1(y)} dy = C.$$

## Замечания.

1) Деление на  $\phi_1(y) \cdot f_2(x)$  может привести к потере решений. Поэтому чтобы получить полное решение, необходимо рассмотреть корни уравнений  $\phi_1(y) = 0$ ,  $f_2(x) = 0$ .

2) Обычная форма дифференциального уравнения с разделяющимися переменными имеет вид:

$$y' = f(x) \cdot \phi(y).$$

Рассмотрим уравнение

$$y' = f(ax + by + c), \quad (6)$$

где  $a$ ,  $b$  и  $c$  – некоторые числа.

Оно приводится к уравнению с разделяющимися переменными заменой  $z(x) = ax + by + c$  и его общий интеграл имеет вид:

$$\int \frac{dz}{bf(z) + a} = x + C.$$



## §5. Однородные уравнения

Функция  $M(x, y)$  называется **однородной степени  $m$**  (или **измерения  $m$** ), если  $\forall t \neq 0$  справедливо равенство

$$M(tx, ty) = t^m \cdot M(x, y).$$

ПРИМЕРЫ однородных функций:

$$f(x, y) = x^3 + 3x^2y,$$

$$f(x, y) = \sqrt[4]{x^8 + y^8},$$

$$f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + xy + y^2},$$

$$f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{xy},$$

$$f(x, y) = \sin \frac{x}{y} + \ln y - \ln x.$$

*Дифференциальное уравнение первого порядка*

$$y' = f(x, y)$$

*называется **однородным** относительно  $x$  и  $y$ , если функция  $f(x, y)$  является однородной нулевой степени.*

*Дифференциальное уравнение*

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

*является однородным относительно  $x$  и  $y$ , если функции  $M(x, y)$  и  $N(x, y)$  – однородные функции одного и того же измерения.*

*Однородное уравнение приводится к уравнению с разделяющимися переменными заменой*

$$z(x) = \frac{y}{x}$$

***Замечание.** Некоторые однородные уравнения проще интегрируются с помощью замены*

$$\frac{x}{y} = z(y)$$

## §6. Уравнения, приводящиеся к однородным

### 1. Уравнения вида

$$y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$$

Рассмотрим уравнение (7)  $y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$

Если  $c_1 = c_2 = 0$ , то уравнение (7) будет однородным, т.к.

$$f\left(\frac{a_1x + b_1y}{a_2x + b_2y}\right) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right).$$

Пусть  $c_1 \neq 0$  или  $c_2 \neq 0$ . Тогда уравнение (7) заменой переменных приводится либо к уравнению с разделяющимися переменными, либо к однородному.

Это зависит от определителя  $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ .

а) Если  $\Delta \neq 0$ , то (7) приводится к однородному уравнению.

Действительно, если  $\Delta \neq 0$ , то система уравнений

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$$

имеет единственное решение  $x = \alpha$ ,  $y = \beta$ .

Сделаем в (7) замену переменных:  $x = t + \alpha$ ,  $y = z + \beta$ .

Тогда:  $\frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dt}$ ;  $\Rightarrow \frac{dz}{dt} = f\left(\frac{a_1(t + \alpha) + b_1(z + \beta) + c_1}{a_2(t + \alpha) + b_2(z + \beta) + c_2}\right)$ ,

$$\Rightarrow \frac{dz}{dt} = f\left(\frac{a_1t + b_1z + (a_1\alpha + b_1\beta + c_1)}{a_2t + b_2z + (a_2\alpha + b_2\beta + c_2)}\right), \quad \frac{dz}{dt} = f\left(\frac{a_1t + b_1z}{a_2t + b_2z}\right).$$

б) Если  $\Delta = 0$ , то уравнение (7) приводится к уравнению с разделяющимися переменными.

Действительно, если  $\Delta = 0$ , то строки определителя  $\Delta$  пропорциональны,

$$\text{т.е. } a_2 = \lambda a_1, \quad b_2 = \lambda b_1.$$

Тогда

$$y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{\lambda(a_1x + b_1y) + c_2}\right)$$
$$\Rightarrow y' = \phi(a_1x + b_1y).$$

Это уравнение (6) (см. §4). Оно приводится к уравнению с разделяющимися переменными с помощью замены

$$z(x) = a_1x + b_1y.$$

## 2. Обобщенно однородные уравнения

Уравнение 1-го порядка называется **обобщенно однородным**, если существует такое рациональное число  $\alpha$ , что каждое слагаемое уравнения – однородная функция степени  $m$  относительно  $x, y, y'$  (относительно  $x, y, dx, dy$ ), если считать  $x$  – величиной измерения 1,  $y$  – величиной измерения  $\alpha$ ,  $y'(dy)$  – величиной измерения  $\alpha - 1$ ,  $dx$  – величиной измерения 0.

Иначе говоря, уравнение  $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$  – обобщенно однородное, если  $\exists \alpha \in \mathbb{Q}$  такое, что

$$P(tx, t^\alpha y)dx + Q(tx, t^\alpha y) \cdot (t^{\alpha-1} dy) = t^m \cdot [ P(x, y)dx + Q(x, y)dy ] .$$

**Обобщенно однородное уравнение приводится к однородному уравнению** заменой  $y = z^\alpha$  .

**Обобщенно однородное уравнение приводится к уравнению с разделяющимися переменными** заменой  $y = zx^\alpha$  .

## §7. Линейные уравнения первого порядка

*Линейным дифференциальным уравнением первого порядка* называется ДУ 1-го порядка, линейное относительно неизвестной функции  $y$  и ее производной  $y'$ .

⇒ В общем случае линейное уравнение 1-го порядка можно записать в виде

$$y' + p(x) \cdot y = f(x), (8)$$

где  $p(x)$ ,  $f(x)$  – заданные непрерывные функции.

Если  $f(x) \equiv 0$ , то линейное уравнение называется **однородным**.  
В противном случае уравнение называется **неоднородным**.

Линейное однородное уравнение

$$y' + p(x) \cdot y = 0$$

является уравнением с разделяющимися переменными.

Его общее решение:

$$(9) \quad y = C \cdot e^{-\int p(x) dx}, \quad \forall C.$$

Рассмотрим линейное неоднородное уравнение (8):

$$y' + p(x) \cdot y = f(x). \quad (8)$$

Существуют два метода его интегрирования.

### I) Метод вариации постоянной (метод Лагранжа)

1) Интегрируем однородное уравнение  $y' + p(x) \cdot y = 0$ , соответствующее данному неоднородному уравнению.

Его общее решение имеет вид (9):

$$y = C \cdot e^{-\int p(x) dx}.$$



2) Полагаем, что решение неоднородного уравнения по структуре совпадает с решением соответствующего линейного однородного уравнения.

⇒ Оно имеет вид 
$$y = C(x) \cdot e^{-\int p(x) dx}.$$

Функцию  $C(x)$  найдем, подставив  $y$  и  $y'$  в исходное неоднородное уравнение (8).

Получим: 
$$C(x) = \int f(x) \cdot e^{\int p(x) dx} dx + C.$$

Таким образом, общее решение линейного неоднородного уравнения (8) имеет вид:

$$(10) \quad y(x) = \left( \int f(x) \cdot e^{\int p(x) dx} dx + C \right) \cdot e^{-\int p(x) dx}.$$

## *Замечания.*

1) Раскроем скобки в (10):

$$y(x) = C \cdot e^{-\int p(x) dx} + e^{-\int p(x) dx} \cdot \int f(x) \cdot e^{\int p(x) dx} dx.$$

Заметим, что первое слагаемое в (11) – общее решение линейного однородного уравнения, а второе – частное решение линейного неоднородного уравнения (получается из общего решения при  $C = 0$ ).

2) Так как  $e^x \neq 0$ , то любую функцию  $y(x)$  можно записать в виде

$$y(x) = \frac{y(x)}{e^x} \cdot e^x.$$

Это является основанием метода вариации постоянной.

## II) Метод Бернулли.

Будем искать решение (8) в следующем виде:

$$y = u(x) \cdot v(x) .$$

Тогда  $y' = u' \cdot v + u \cdot v' .$

Подставим  $y$  и  $y'$  в уравнение (8) и получим:

$$u' \cdot v + u \cdot v' + puv = f(x)$$

или  $u' \cdot v + u \cdot [v' + pv] = f(x) .$

Полагаем, что функция  $v(x)$  такова, что

$$[v' + pv] = 0 .$$

Тогда  $u' \cdot v = f(x) .$

(12)

Условия (12) позволяют однозначно определить  $v(x)$  и  $u(x)$  .  
При этом получим

$$v(x) = e^{-\int p(x)dx} ,$$

$$u(x) = \int f(x) \cdot e^{\int p(x)dx} dx + C .$$

$$\Rightarrow y = e^{-\int p(x)dx} \cdot \left[ \int f(x) \cdot e^{\int p(x)dx} dx + C \right] .$$

**Замечание.** Линейное неоднородное уравнение вида

$$y' + a \cdot y = b$$

проще интегрировать как уравнение с разделяющимися переменными

## §8. Уравнения Бернулли

**Уравнением Бернулли** называется уравнение вида

$$y' + p(x) \cdot y = f(x) \cdot y^n, \quad (13)$$

где  $p(x)$ ,  $f(x)$  – заданные непрерывные функции,  
 $n \neq 0$ ,  $n \neq 1$  (иначе это будет линейное уравнение).

Уравнение Бернулли можно привести к линейному уравнению.

Для этого надо

- 1) обе части уравнения (13) разделить на  $y^n$ ,
- 2) сделать замену  $z = y^{1-n}$ .

**Замечания.**

- 1) Уравнение Бернулли при  $n > 0$  имеет решение  $y = 0$ . Оно будет частным решением при  $n > 1$  (обычно входит в общее при  $C = \infty$ ) и особым при  $0 < n < 1$ .

2) Решив получившееся после замены линейное уравнение методом Бернулли, получим:

$$z = u(x) \cdot v(x),$$

$$\Rightarrow \frac{1}{y^{n-1}} = u(x) \cdot v(x),$$

$$\Rightarrow y^{n-1} = \frac{1}{u(x)} \cdot \frac{1}{v(x)},$$

$$\Rightarrow y = \left( \frac{1}{u(x)} \right)^{\frac{1}{n-1}} \cdot \left( \frac{1}{v(x)} \right)^{\frac{1}{n-1}} = \tilde{u}(x) \cdot \tilde{v}(x).$$

Таким образом, решение уравнения Бернулли можно сразу искать в виде произведения двух функций методом Бернулли, не приводя предварительно к линейному уравнению.

## §9. Уравнения в полных дифференциалах

Уравнение  $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$  (14)

называется **уравнением в полных дифференциалах**, если его левая часть является полным дифференциалом некоторой функции  $u(x, y)$ , т.е. если

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = du(x, y).$$

Общий интеграл уравнения в полных дифференциалах имеет вид  $u(x, y) = C$ .

⇒ Задачи:

1) научиться определять, когда выражение

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

является полным дифференциалом;

2) научиться находить функцию  $u(x, y)$ , зная ее полный дифференциал.

## ТЕОРЕМА 2.

Пусть функции  $M(x, y)$ ,  $N(x, y)$  определены и непрерывны в области  $D$  плоскости  $xOy$  и имеют в ней непрерывные частные производные

$$\frac{\partial M}{\partial y} \quad \text{и} \quad \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Для того чтобы выражение

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

представляло собой полный дифференциал некоторой функции  $u(x, y)$ , необходимо и достаточно, чтобы во всех точках области  $D$  выполнялось условие

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$



## Способы нахождения функции $u(x, y)$ :

- 1) используя алгоритм, предложенный в доказательстве теоремы 2;
- 2) используя одну из следующих формул:

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x M(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y N(x, y) dy$$

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x M(x, y) dx + \int_{y_0}^y N(x_0, y) dy$$

где  $(x_0, y_0)$  – любая точка области  $D$  непрерывности функций  $M(x, y)$ ,  $N(x, y)$ .

3) методом *интегрируемых комбинаций*.

Суть метода интегрируемых комбинаций: выделить в

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

выражения, являющиеся дифференциалами известных функций («*интегрируемые комбинации*») и привести его таким образом к виду  $du(x, y)$ .

ПРИМЕРЫ интегрируемых комбинаций:

$$x^n dx = d\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right), \quad \frac{dx}{x} = d(\ln |x|),$$

$$x dy + y dx = d(xy), \quad \frac{y dx - x dy}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right).$$

## §10. Интегрирующий множитель

Функция  $\mu(x,y)$  называется **интегрирующим множителем** уравнения  $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ , (14) если после его умножения на  $\mu(x,y)$  левая часть уравнения становится полным дифференциалом некоторой функции.

Пусть функции  $M(x,y)$ ,  $N(x,y)$  определены и непрерывны в области  $D$  плоскости  $xOy$  и имеют в ней непрерывные частные производные

$$\frac{\partial M}{\partial y} \quad \text{и} \quad \frac{\partial N}{\partial x}.$$

**ТЕОРЕМА 3** (о существовании интегрирующего множителя вида  $\mu(x)$  или  $\mu(y)$ ).

Пусть

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = \varphi, \quad \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{M} = \psi.$$

1) Если  $\varphi = \varphi(x)$ , то уравнение (14) имеет интегрирующий множитель  $\mu(x)$ , который является решением уравнения

$$\frac{d \ln \mu}{dx} = \varphi(x);$$

2) Если  $\psi = \psi(y)$ , то уравнение (14) имеет интегрирующий множитель  $\mu(y)$ , который является решением уравнения

$$\frac{d \ln \mu}{dy} = -\psi(y).$$