

Амізон



Підготував
студент групи ФМ – 31
Дацюк Олександр



План

Загальна характеристика

Історична ремарка

Склад препарату

Форма випуску

Фармакотерапевтична група та

фармакологічні властивості

Показання для застосування

Спосіб застосування та дози

Побічна дія

Умови та термін зберігання

Статистика



Історична ремарка

Сьогодні Амізон відомий всім як один із виробників найбільш ефективних препаратів проти грипу та інших вірусних інфекцій. Амізон був офіційно зареєстрований і дозволений до медичного застосування в Україні у 1996 році. Промислове виробництво препарату було розпочате компанією ВАТ «Фармак», яка по сьогоднішній день залишається єдиним його виробником.



Загальна характеристика

- Міжнародна та хімічна назви:
- Основні фізико-хімічні властивості:
таблетки круглої форми з плоскою поверхнею, рисою і фаскою, жовтого або зеленувато-жовтого кольору, на поверхні таблеток допускається наявність незначних вкраплень



Склад Амізону

Мікрокристалічна
целюлоза

Натрію
кроскармелоза

Кальцію стеорат

Лактоза
моногідрат



Форма випуску

Препарат випускається в таблетках
по 0.25Г



Фармакотерапевтична група та фармакологічні властивості

Фармакотерапевтична група: Протівірусні препарати.

Амізон належить до групи ненаркотичних анальгетиків, справляє протизапальну, жарознижувальну, анальгетичну та імуномодулюючий інтерферогенний ефект.



Амізон усуває:

- ✓ Жар
- ✓ Біль
- ✓ Запалення
- ✓ Інтоксикацію


Амізон

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Показання та застосування

Амізон[®] призначають з лікувальною і профілактичною метою при таких захворюваннях:

- грип та інші респіраторні вірусні інфекції, в тому числі у дітей, які довго і часто хворіють;
- вірусні, вірусно-бактеріальні та бактеріальні пневмонії, ангіни, інфекційний мононуклеоз;
- кір, краснуха, вітряна віспа, скарлатина, паротитна інфекція;
- шкірно-суглобова форма еризипелоїду, феліноз (хвороба котячої подряпини);
- для термінової неспецифічної хіміопротекції в осередках паротитної інфекції, скарлатини, гепатитів А, Е та мікст-інфекції (гепатити А + Е).



Спосіб застосування та ДОЗИ



Амізон приймають всередину після їди, не розжовуючи. Максимальна разова доза - 1 г, добова - 2 г. Якщо немає інших рекомендацій, з лікувальною метою дорослим звичайно призначають по 0,25-0,5 г (1-2 таблетки) 2-4 рази на день, до 2 г на добу протягом 5-7 днів; дітям від 6 до 12 років призначають по 0,125 г (½ таблетки) 2-3 рази на день протягом 5-7 днів.

Побічна дія

В терапевтичних дозах Амизон[®] звичайно добре переноситься, не призводить до неприємних явищ та алергізуючої дії. В окремих випадках може виникати відчуття гіркоти у роті, легкий набряк слизової оболонки ротової порожнини, що не потребує додаткового лікування або відміни препарату.



Умови та термін зберігання

Зберігати в захищених від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°C.

Термін придатності - 3 роки.



Статистика

Питома вага дітей, які захворіли на грип та ГРВІ за віковими категоріями (Україна, 5 тиждень 2016)

