Животные Архангельской области

Делал Мирослав Крамин

О май гад Данила ты что крейзи?

Разнообразие животного мира

```
Разнообразие животного мира в области по классам позвоночных животных представлено следующим количеством видов (Андреев В.А., 1998): круглоротые (минога) – 2; рыбы – 144; земноводные – 6; рептилии – 5; птицы – 298, из них гнездятся – 260; млекопитающие – 83.
```





бурундук



• Описание вида. Зверек размером мельче белки. Пять темных полос вдоль спины позволяют легко узнать бурундука в природе, к тому же он очень любопытен и не боится человека. Ведет дневной образ жизни. Хорошо лазает по деревьям и отличается большой подвижностью. Часто издает различные звуки – свист, урчание, цоканье. Наиболее характерен весенний призывный бурлящий голос, напоминающий по звучанию «бурунбурун», отчего, вероятно, и получил свое видовое название бурундук. При явной опасности спасается на деревьях, в прикорневых пустотах или в валежнике. Питается растительными кормами: побегами, семенами, ягодами, нередко делая набеги на огороды и сельскохозяйственные поля. Устраивает запасы в нескольких кладовых на осень и весну. С наступлением зимы впадает в спячку, пробуждаясь в апреле – мае.

Распространение и места обитания. Вид обитает у западной границы ареала, которая проходит по линии железной дороги Архангельск – Вологда. Граница обитания медленно смещается к западу, поскольку имеются сведения о встречах зверька в Онежском и Плесецком районах. На востоке области этот зверек не является редким. Населяет разреженные хвойные и смешанные, преимущественно пойменные, сильно захламленные леса с обилием подлеска и подроста; границы леса с сельхозугодьями. Гнездо бурундука располагается в почве на глубине 30–50 см, вход обычно находится в корнях деревьев или под валежником.

Убежище имеет две камеры, в одной из которых располагается гнездо из сухой травы и мха, в другой – зимние запасы корма.

Меры охраны. Охранная зона устанавливается в пределах таксационного выдела, в котором обнаружен вид. В охранной зоне рекомендуется исключить сплошные и постепенные рубки. Разрешаются выборочные рубки интенсивностью не более 30% с исключением из рубки участков с наличием валежа, бурелома и подлеска.

Распространение и места обитания. Данных по распространению барсука в Архангельской области очень мало. Вид встречается по всей лесной зоне, но везде очень редок. Северную границу ареала условно можно провести от низовьев Северной Двины к верховьям Мезени и Печоры. Известны единичные случаи заходов зверей по долинам Кулоя и Мезени к побережью Белого моря.

Избегает глухой темнохвойной тайги. Селится в сосняках, смешанных и мелколиственных лесах, иногда вблизи поселений человека.



Меры охраны. Охранная зона устанавливается в пределах таксационного выдела, в котором обнаружена нора. В охранной зоне рекомендуется исключить любые виды рубок и другие виды хозяйственной деятельности.



Летучяя мышь

Описание вида. Масса тела варьирует от 8 до 14 г, размах крыльев около 24–28 см. Шерсть длинная, двухцветная, на спине шоколадно- или темно-бурая, с золотистыми концами, на брюхе – буровато-палевая, с темно-серыми основаниями.
Вылетает на охоту сразу после захода солнца, охотится на средней и большой высоте на летающих насекомых над просеками, лесными прогалами и в аграрных ландшафтах. Полет быстрый, маневренный.

Это оседлые животные, зимуют поодиночке или небольшими группами в пещерах при температуре около ноля градусов. Выводковые колонии по 10–80 самок, самцы держатся обособленно. Роды проходят в начале – середине лета, в выводке 1–2 детеныша. Живет до 15 лет.

Распространение и места обитания. Населяет лесные области. Далее других видов летучих мышей проникает на север. Убежища – деревянные постройки, дупла, скальные трещины.

Меры охраны. Охранная зона устанавливается полосой, равной по ширине водоохраной зоне водного объекта, вблизи которого обнаружен вид, и протяженностью по 250 м в обе стороны от места обнаружения вида. В охранной зоне необходимо исключить любые виды рубок и другие виды хозяйственной деятельности.

При необходимости проведения санитарных рубок оставляют деревья с дуплами, даже если они имеют признаки патологии, но не представляют опасности как источник распространения стволовых вредителей или инфекционных болезней.

Красная книга



Краснозобая гаггара Сибирский углозуб Бабочка мнемозина

Сапсан







Это не конец

• . . .

С новым годом

