

Стигматизация ВИЧ-инфицированных больных в медицинских учреждениях

Интерн кафедры психиатрии и наркологии Е.В. Селютина
Научные руководители – доц. Н.Б. Халезова, проф. М.Я. Киссин

*Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова
Кафедра психиатрии и наркологии*

Актуальность исследования

- Высокая распространенность ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге
- Дискриминация ВИЧ-инфицированных больных среди медицинского персонала
- Дезадаптация ВИЧ-инфицированных больных вследствие стигматизации со стороны медицинских работников

Задачи исследования:

- Оценить отношение сотрудников медицинских учреждений к работе с ВИЧ-инфицированными пациентами
- Описать уровень толерантности медицинского персонала
- Определить психологические установки медицинских работников

Материал и методы

- 97 сотрудников (врачебный и средний медицинский персонал, психологи) Центре СПИД
- 109 сотрудников (врачебный и средний медицинский персонал) 2 многопрофильных стационаров
- 53 сотрудника (врачебный и средний медицинский персонал, психологи) 2 психиатрических стационаров

1) *Анкетирование*


2) *Экспериментально-психологический метод*

□ *Методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф.Потемкиной (1993 г.)*


□ *Опросник профессиональных предпочтений Дж.Холланда (1966 г.)*

3) *Статистический метод (Statistica 8.0)*


Общая характеристика выборки.




Распределение опрошенных по возрасту и стажу работы в медицине, (лет)




Распределение опрошенных по полу, (%)



Распределение опрошенных по профессиям, (%)




Давность взаимодействия с ВИЧ-инфицированными пациентами в медицинских учреждениях



Частота столкновения с ВИЧ-инфицированными пациентами в медицинских учреждениях

Оценка риска ВИЧ-инфицирования и тревога в связи с возможным ВИЧ-инфицированием у сотрудников медицинских учреждений



Выраженность стигматизации ВИЧ-инфицированных пациентов у сотрудников медицинских учреждений

- Наибольшая склонность к стигматизации – у медсестер ПБ
- 16% медицинских сестер психиатрических больниц отметили, что ВИЧ-инфицирование – это однозначное следствие рискованного поведения.
- 34% медсестер психиатрических больниц считали, что ВИЧ-инфицированных больных необходимо ограничивать в трудоустройстве и оказании медицинской помощи.

Выраженность признаков утомления от работы в медицинских учреждениях


- Наибольшую усталость от работы продемонстрировали сотрудники ЦСПИД.
- У них чаще отмечались чувства душевного переутомления, эмоционального истощения
- Конфликты с пациентами чаще возникали у специалистов ЦСПИД, нежели в других медицинских учреждениях.
- Частота конфликтных ситуаций была напрямую связана с утомляемостью от работы.

«С ВИЧ-инфицированным я мог(ла) бы...?»

	Оценка возможности		
	Центр СПИД	Многопрофильные стационары	Психиатрические больницы
Жить в одном дворе, доме	3,9	3,2	3,4
Работать (в качестве коллеги)	3,8	2,6	2,9
Дружить	3,6	2,5	2,7
Познакомить с родными	3,4	2,1	2,1
Оказать первую помощь	3,6	3,3	3,1
Доверить ему (ей) детей на время	2,7	1,2	1,4
Принять в семью, если он - родственник (например, оказавшийся без поддержки или в трудных обстоятельствах)	3,2	2,4	2,5
Принять в семью, если он - приемный ребенок	2,4	1,6	1,3
Выйти за него замуж / Жениться	1,4	0,5	0,5
Отдать замуж дочь/сына	1,3	0,3	0,6

«Чему Вас научили ВИЧ-инфицированные пациенты?»


	Центр СПИД (%)	Многопрофильные стационары (%)	Психиатрические больницы (%)
Ответы гуманистического характера («оптимизму, жизнелюбию; умению жить с болезнью; никогда не сдаваться; не опускать руки в трудной ситуации»)	16,5	4,6	7,6
Настороженность в отношении заражения ВИЧ («осторожности; быть внимательнее к своему здоровью; бояться ВИЧ-инфицированных пациентов»)	13,4	25,7	17,1
Превосходство над больными («ничему; это я учу их жить с болезнью; пациенты вряд ли могут чему-то научить»)	5,2	16,6	38,0



«Ваш ребенок ходит в детский сад (школу), выясняется каким-то случайным образом (а ведь это случается), что в его группе (классе) есть ВИЧ+ ребенок. Что Вы будете делать?»

Варианты ответов	Частота ответа у сотрудников		
	Центр СПИД (%)	Многопрофильные стационары (%)	Психиатрические стационары (%)
Переведу в другой сад/школу	4,1	24,8	-
Затрудняюсь ответить, вопрос пропущен	18,6	22,9	41,5
Расскажу своему ребенку о правилах поведения, о путях передачи ВИЧ, о безопасности, осторожности	20,6	19,3	19,0
Ничего не буду делать	41,2	18,3	17,0
Ограничу общение с ним моего ребенка (в том числе, из-за сопутствующих инфекций, таких как туберкулез)	1,0	4,6	1,9
Приглашу учителя/воспитателя, на пояснительную беседу о ВИЧ, составлю мнение о медработниках учреждения, пообщаюсь с родителями ВИЧ-положительного ребенка	4,1	-	3,8
Поговорю с сотрудниками о санэпидрежиме	-	2,7	-
Объясню ребенку, что ВИЧ-положительный ребенок такой же, как все	5,2	2,7	-
Буду добиваться перевода ВИЧ-инфицированного ребенка	-	2,7	1,9
Буду требовать от учреждения гарантии безопасности моего ребенка	-	0,9	-

Ассоциации со словом «ВИЧ-инфицированный»




Плохо, грустно;
несчастный;
приговор;
пострадавший;
обреченный;
тяжкая ноша;
беда;
сострадание;
неизлечимый;
испытание;
сочувствие;
приговор

Наркоман;
распущенный;
брезгливость;
почти чума;
асоциальный;
неправильного
поведения;
больной морально;
проститутка;
человек «с
прошлым»


Затрудняюсь
ответить

Ничего страшного;
не приговор;
обычный человек;
пациент;
требует серьезного
подхода;
хронический
больной;
диагноз;
не такая уж большая
проблема

Выраженность социально-психологических установок у сотрудников различных учреждений



Выраженность профессиональных типов у сотрудников различных учреждений



Выводы

- ❖ **Страх ВИЧ-инфицирования влияет на качество работы сотрудников медицинских учреждений, усиливает чувство утомления от работы. Наихудшее отношение к больным ВИЧ-инфекцией продемонстрировали медицинские сестры и психологи психиатрических больниц, что скорее всего связано с их низкой осведомленностью по поводу ВИЧ-инфекции.**
- ❖ **У сотрудников Центра СПИД отмечались наибольший уровень душевного переутомления, эмоционального напряжения, усталости от общения с пациентами, что можно объяснить высокой распространенностью ВИЧ-инфекции, ежедневной вовлеченностью в проблемы ВИЧ-инфицированных больных и неизлечимостью ВИЧ-инфекции в настоящее время.**
- ❖ **Несмотря на предвестники эмоционального выгорания, сотрудники ЦСПИД показали самый высокий уровень толерантности и наименьшую выраженность страха ВИЧ-инфицирования.**
- ❖ **Все анкетированные демонстрировали низкий уровень социальной мотивации, что не влияло на отношение к ВИЧ-инфицированным пациентам.**
- ❖ **Выраженность исследовательского, социального и артистического типа связана с позитивным отношением к ВИЧ-больным.**

Эволюция отношения к ВИЧ-инфицированным пациентам

Страх

Моральная оценка

Сопереживание

**Рациональный
подход**

