




# Дальний Восток



# Физическая карта России

Северный Ледовитый  
океан

Центрально-  
Якутская равнина

Тихий  
океан




Центрально-Якутская равнина находится в субарктическом и умеренном климатических поясах.

Климат Центрально-Якутской равнины является резко-континентальным, с крайне суровыми зимами и малым количеством осадков.






# Лиственный лес



# Зейно-Буреинская равнина




Зейно-  
Буреинская  
равнина





# Корякское нагорье



# Физическая карта России



Северный Ледовитый океан

Анадырское плоскогорье

Чукотское нагорье

Черский хребет

Верхоянский хребет

Корякское нагорье

Охотское море

Джугдзур

Становой хребет

Калымское нагорье

Сихотэ-Алинь

# Ключевская Сопка



# Курильские острова



# Курильские острова



# Животный мир Дальнего Востока



Бурый медведь




Лиса

# Остров Сахалин



Недра Дальнего Востока богаты разнообразными полезными ископаемыми: золото, оловянные, ртутные, медные, никелевые, полиметаллические, железные, марганцевые, вольфрамовые руды, каменный и бурый уголь, фосфориты, апатиты, графит, нефть, природный газ.





Арктический и антарктический

Субарктический и субантарктический


Умеренные

Субтропические

Тропические


Субэкваториальный

Экваториальный



Климат формируется под влиянием муссонов.

Летом осадков выпадает много в основном в виде ливневых дождей.



Зимой мощность снежного покрова невелика, что приводит к глубокому промерзанию грунта.



Самое мощное землетрясение на севере острова Сахалин в 1995 году.

В эпицентре сила толчков, по разным оценкам, достигала 8–10 баллов.



