



Кафедра: Хиругиялық стоматология



# Жергілікті жансыздандырудан кейінгі асқынулар



Орындаған: Үргенішбаева Ж.Р.

Факультет : стоматология

Тобы: 007-03-01

Жетекшісі: Амантаев Б.А.



# Жергілікті жансыздандырудан кейінгі асқынулар


## Жалпы



### Жергілікті:

- Иненің сынып қалуы
- Жұмсақ тіндер қан тамырлары мен өрімдерін жарақаттау
- Бет терісінің ишемиясы
- Нерв талшықтарын жарақаттау
- Ауа эмболиясы
- Инфекция енгізу
- Жұмсақ андай парезі
- Мұрын қуысы шырышты қабығы жарақаттануы
- Қосарлану (диплопия)
- Инфекциядан кейін домбығу мен ауырсыну

**Естен тану-** мидың тамырларының рефлекторлы таралуынан пайда болады, (оған себепшілер тіс жұлу алдындағы қорқыныш сезімі, үйқысыз тұн болуы мүмкін, т.б.)



# Клиникасы

Терінің тез арада бозаруы

Естен тануы

Бас айналуы

Әлсіздік

Жүрек айнуы

Тыныс алу беткей,  
жиілеуі

Қан тамыр соғуы жиіленуі





# ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

## Шұғыл көмек




горизонтальді жағдайға басын төмендету  
(миға қан келуін жақсарту үшін)

- Мұсәтір спиртін иіскетіп(тыныс алу  
орталығын қоздыру үшін)
- Терезелерді ашуға жағдай жасау керек

ЕМД

- Көк тамырға 1 мл 10-20% кофеин ерітіндісін
  - ❖ 1-2мл кордамин,
  - ❖ 1-2 мл корглюкон енгізілуі тиіс.



Коллапс-тамырлардың  
немесе жүрек қан  
тамырларының  
жетіспеушілігі, оның  
негізінде тамырлардың  
бірден кеңеюі әсерінен  
пайда болатын үрдіс.




# Клиникасы :

- ✓ Бозару
- ✓ Терінің кеүіп кетуі
- ✓ Суық тердің шығуы
- ✓ Есі айқын
- ✓ Аритмия
- ✓ Жүрек дыбысының анық шықпауы
- ✓ Қан қысымы 90/30 с.б.
- ✓ Қан тамыр соғуы нашарлайды
- ✓ Устіртін тыныс алуды жиіленеді
- ✓ Бас айналу
- ✓ Жүрек айнуы
- ✓ Құсуы
- ✓ Әлсіздену

# Емдеу шаralары

- ❖ Науқасты горизонтальді жағдайға келтіреді
- ❖ Аяқ жағын жоғары көтеріп қою
  - ❖ Денесін жылдыту
  - ❖ Жылы шай, кофе ішкізу
  - ❖ Көк тамырға: адреналин, мезатон
    - ❖ Глюкокортикоидтар
- ❖ Жүрек қызметін жақсартатын дәрілер



## **Есекжем.**

- ✓ күлдіреуіктер пайда болады
- ✓ Катты қышыну мен күйдіру сезімдері пайда болады
- ✓ Жөтелу, тұншығу сезімдері
- ✓ күлдіреуіктер бір жерде жазылып, басқа жерде қайта шығуы мүмкін.

**Емі**

**Ішке димедрол, бром препараттары, адреналин, гормондар**





MedUniver.com  
все по медицине...

**Квинке ісінуі-** көтере алмайтын заттардың енгізілуінің әсерінен тері мен шырышты қабаттарда жедел шектеулі ісінудің пайда болуы.

### Клиникасы:

1. Ерін, ұрт, қабақ тез арада ісінуі
2. Тыныс алу және жұтыну қыындауы
3. Ісінген орын бозғылт түсті, қызыу болмайды
4. Қалқанша без жұмысы нашарлаған науқастарда кездеседі.



Рис. 3. 56-летний мужчина с диабетом и гипертензией в анамнезе, принимавший антигипертензионный препарат рамиоприл. Первая дозу он принял вечером, наутро проснулся с отеками губами.

**Анафилактикалық шок-**  
жансыздандырыш дәрілердің көтере  
алмауынан туындайтын аллергиялық  
реакция.

Анафилактикалық шок ағымына байланысты:

- A. Жедел қатерсіз
- B. Жедел қатерлі
- C. Кеш ағымды
- D. Рецедивті ағымды
- E. Абортывті ағым



# Анафилактикалық шок түрлері


Типикалық




Гемодинамикалық



Асфиксиялық




Церебральді



Абдоминальді

Тромбоэмболиялық




- Бронхоларингоспазм
- Жұтқыншақ ісінуінен тыныс алудың қындауы
- Респираторлық дисресс синдромы
  - Гипоксия




- Жүрек аймағында қатты ауру сезімі
  - АҚ тез төмендеуі
  - Пульс әлсіздігі
  - Жүрек ритмі бұзылышы
- Перифериялық қан тамырларының спазмы (бозғылт) немесе олардың кенеюі (таралған гиперемия)
- Микроциркуляция дисфункциясы

# Церебральды анафилактикалық шок



- ✓ Психомотор, қорқыныш сезімінен тырыспа синдромы
- ✓ тамыр қозғалтқыш бұзылышы әсерінен тыныс аритмиясы
- ✓ Менингиальді синдром
- ✓ Мезэнцефальді синдром

- “Жалған жедел іш ауруы” секілді симтоматика
- Эпигастрний аймағында ауру сезімі
  - Іште тітіркену сезімі



# Диагностика критерийлері


## Шок симптомдары:

- ❖ Тері түсінің өзгерісі
- ❖ Әр түрлі әкзантемалар
- ❖ Бет, мұрын, қабақ ісінуі
  - ❖ Суық тер
- ❖ Түшкіру, жөтелу, қалтырау
  - ❖ Көзден жас ағу
  - ❖ Құсу
- ❖ Клоникалық тырысу
- ❖ Қозғалудың шектелуі
- ❖ Несеп, үлкен дәрет бөліну бұзылысы

## Объективті көрінісі:


- ❖ жіп тәрізді пульс
- ❖ Тахикардия
- ❖ Жүрек тоны әлсіз
  - ❖ АК↓
- ❖ Тыныс алу бұзылысы
- ❖ Көз қарашығы үлкейген, жарыққа әсері жоқ





- Науқастың ауырлық жағдайын бағалау
  - Дәрілік затты енгізуді тоқтату
- Горизонтальді жағдайға келтіреді, аяғын жоғары көтереді
- Оттегімен дем алдыраады
  - Арнайы шарадар:
- Эпинефрин+натрий хлориді, әр 3-5 минут сайын
- Преднизалон, гидрокартизон, дексаметазон
  - Антигистаминді препараттар
- Гормондық препараттарды әр 4сағат сайын





Ф. Лежаръ, 1902



Лучшая жидкость для инъекций—соленая вода, отъ 8 до 10 граммъ хлористаго натрія на литръ;

Приложение к журналу "Медицинский вестник", 1902 год.

искусственная серотерапия замѣнила почти во всѣхъ случаяхъ трансфузію крови съ болѣе сложной техникой и сомнительными результатами



Назарларыңызға рахмет!!!

