




*Вітряна віспа* – це гостре інфекційне захворювання, яке супроводжується появою поліморфного (плямисто-папульозно-везикульозного) висипу на шкірі і слизових та підвищенням температури.



Етіологія – вірус (летючий, нестійкий).

Джерело інфекції – хворий.

Заразний період – з початку захворювання до 5-го дня з моменту останнього висипу.

Шлях передачі – повітряно-краплинний.

Сприйнятливість – дуже висока.

## Клініка

Інкубаційний період – 11-21 день.

Підвищення температури, інтоксикація.

Поява на шкірі, волосяній частині голови, слизових плям, папул, везикул.

Висипає поштовхами 2-5 днів.

На місті везикули утворюється кірочка, яка відпадає.











**Ранняя и поздняя стадии  
ветряной оспы**





## Форми:

- рудіментарна;
- пустульозна;
- бульозна;
- геморагічна;
- генералізована (вісцеральна).

## Ускладнення:

Піодермія, отит, ларингіт, кон'юнктивіт,  
пневмонія, енцефаліт тощо.



## Лікування та профілактика

- ізоляція хворого до 5-го дня з моменту останнього висипання;
- карантин на 21 день;
- повідомлення в СЕС, огляд контактних;
- лікування симптоматичне (обробка елементів висипу розчином діамантового зеленого, жарознижуючі при температурі);
- госпіталізація при тяжких формах.

# Паротитна інфекція

- Це гостре інфекційне захворювання, яке характеризується загальною інтоксикацією, ураженням залозистої тканини (переважно слинних залоз), нервової системи.

Етіологія – вірус (малостійкий).

Джерело інфекції – хворий.

Заразний період – до 9-го дня з моменту захворювання.

Шлях передачі – повітряно-краплинний, через ослинені предмети.

## *Клініка.*

Інкубаційний період 11-23 дні.

Підвищується температура, з'являється еластично-щільнувата припухлість між соскоподібним відростком і кутом нижньої щелепи, болюча, шкіра над нею не змінена.

Припухлість зникає на 8-10-й день.


Може бути двобічна.

Біль при жуванні, зменшення слини.

Гіперемія і набряк слизової оболонки у ділянці устя протоки привушної залози.











## Форми


- паротит;
- орхіт;
- панкреатит;
- менінгіт.





## Ускладнення

- менінгоенцефаліт;
- парези периферичних нервів;
- пневмонія;
- отит;
- стоматит тощо.



## Лікування та профілактика

- ізоляція хворого до 9-го дня з моменту захворювання;
- карантин 21 день;
- специфічна профілактика (вакцинація) – вакцина КПК (кір, паротит, краснуха) в дозі 0,5 мл підшкірно в плече в 12 місяців (“пріорікс”, “трімовакс”);
- ревакцинація – в 6 років;
- лікування симптоматичне (жарознижуючі, знеболюючі, полоскання рота).