

СПИД – последняя, смертельная стадия ВИЧ-инфекции.

- Больной резко теряет в весе (10% и более), месяцами страдает от повышенной температуры тела, сильного ночного потоотделения, хронической усталости, увеличения лимфатических узлов, постоянного кашля и расстройства кишечника.
- В конце концов, наступает момент, когда сопротивляемость организма окончательно утрачивается, обостряются многочисленные болезни (пневмония, рак, инфекционные заболевания) и человек умирает.



ЧТО ТАКОЕ «ПЕРИОД ОКНА»?

Период окна – это время от момента проникновения вируса в организм до появления антител к ВИЧ. Этот период длится от 3 недель до 3 месяцев. В это время анализы не регистрируют заболевание, но человек уже может заражать других, не подозревая об этом

КАКОВА ЖЕ

«СТЕПЕНЬ РИСКА» ЗАРАЗИТЬСЯ?

Высокий риск

Оральный секс

Половой акт с
потреблением наркотиков

Небольшой риск

Инъекция в лечебном учр - ии

Половая жизнь в браке

Переливание крови

Множественные половые связи

Прокалывание ушей

Нанесение татуировки

Риск отсутствует

Поцелуй в щеку

Пользование чужой зуб. щет.

Плавание в бассейне

Глубокий поцелуй

Уход за больным СПИДом

Укус комара

Проживание в одной комнате
с больным СПИДом

Объятия с больным СПИДом

Пользование общественным
туалетом

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА

Половой

-половой контакт без использования презерватива



Очень часто инфицируются наркоманы, вводящие наркотики загрязненными шприцами и иглами

Через кровь

- при переливании инфицированной крови;
- при трансплантации органов и тканей;
- через инфицированные медицинские инструменты.



От матери к плоду

-до, во время и после родов;
-во время кормления ребенка грудью.



НЕВОЗМОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ



- 1) при рукопожатии, объятиях и поцелуях;
- 2) при пользовании туалетом, ванной, дверными ручками;
- 3) через посуду, бытовые предметы, постельное белье, деньги;
- 4) через слезы, пот, при кашле и чихании;
- 5) через кошек и собак.



Кровососущие насекомые, вопреки распространенному мнению, ВИЧ передавать не могут.

ДИАГНОСТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ



- ❑ После попадания ВИЧ в организм, начинают вырабатываться антитела для борьбы с вирусом, которые выявляет **анализ крови (тест) на ВИЧ**.
- ❑ Антитела определяются лишь через 3-6 месяцев после заражения. Период, когда вирус в организме уже есть, а антитела к нему еще не определяются, называется **серо-негативным окном**. В это время у ВИЧ-инфицированного человека анализы крови на ВИЧ являются отрицательными.
- ❑ Достоверные результаты теста на ВИЧ могут быть получены не ранее, чем через 3 месяца после заражения.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬСЯ ОТ ВИЧ?



- Лекарства, действующие на ВИЧ, называются антиретровирусными (АРВ) препаратами. Эти препараты останавливают развитие и размножение вируса и позволяют иммунной системе восстанавливаться.
- В настоящее время АРВ терапия не избавляет организм от ВИЧ, но значительно продлевает жизнь человека с ВИЧ.
- Если антиретровирусная терапия начата и не развивается устойчивость к применяемым препаратам, продолжительность жизни больного составляет 22.5 года.

УПРАЖНЕНИЕ «ЖИЗНЬ С БОЛЕЗНЬЮ»

Цель: сознание участниками проблем, связанных с ВИЧ/СПИД; изменение взглядов на проблему ВИЧ-инфицированных.

Предлагаю каждому из Вас по 12 листочков бумаги.
Напишите, пожалуйста,

на 4-х листочках - название любимых блюд;

на 4-х – название увлечений;

на 4-х – имена близких или любимых людей.



МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ,

что лучший способ избежать заражения ВИЧ – это воздержание от секса до тех пор, пока они не станут взрослыми и будут готовы создать семью или осознанные и основанные на взаимном доверии отношения с партнерами.


КАЖДЫЙ ВПРАВЕ ВЫБИРАТЬ

свой стиль поведения, тип сексуальных отношений, возраст начала половой жизни,

НО

юноши и девушки должны помнить, что раннее начало половой жизни несет с собой:

- раннюю беременность,
- аборты,
- бесплодие,
- болезни, передающиеся половым путем (гепатиты, хламидиоз, сифилис, гонорея...
- вынужденные браки,
- несбывшиеся надежды и невыполненные планы,
- прерывание дальнейшего образования.



Стоит ли рисковать?

ВОПРОСЫ - РАЗМЫШЛЕНИЯ

- **Если ты любишь человека,**
тебе не придет в голову усомниться в нем.
Это так?
- По человеку сразу видно,
болеет ли он ИППП или нет?
- **Только тот (!),**
у кого было очень много партнеров
должен беспокоиться,
не заразился ли он чем-нибудь?