

Смешанные дистрофии

Выполнили: студенты 3 курса лечебного
факультета Гасанов Расим, Токмин Алексей

ХАБАРОВСК 2016

Смешанные дистрофии

Смешанные дистрофии — это морфологические проявления нарушенного метаболизма, выявляемые как в паренхиме, так и в строме органов и тканей, возникающие при нарушении обмена сложных белков — эндогенных пигментов (хромопротеидов), нуклеопротеидов и минералов.

Нарушения обмена эндогенных пигментов – эндогенные пигментации

- Эндогенные пигменты (хромопротеиды) – окрашенные вещества различной химической природы, которые синтезируются в организме.
- Эндогенные пигментации обычно связаны с избыточным накоплением пигментов, образующихся в норме, реже – только в условиях патологии.
- Эндогенные пигментации могут быть как приобретенными, так и наследственными.
- Среди эндогенных пигментов выделяют гемоглобиногенные, протеиногенные (тирозиногенные) и липидогенные.

Гемоглобиногенные пигменты

- Представляют собой различные производные гемоглобина, возникающие при синтезе или распаде эритроцитов.
 - а. В **норме** образуются **ферритин, гемосидерин, билирубин и порфирины** (порфирины, являясь предшественниками гема, могут обнаруживаться в минимальных количествах в крови и моче в норме).
 - б. В условиях патологии образуются **гематоидин и гематины** (солянокислый гематин, формалиновый пигмент, малярийный пигмент (гемомеланин)).

Гемосидероз

Возникает при повышенном гемолизе — разрушении эритроцитов.

Может быть **местным** и **общим**, или **распространенным**.

Местный гемосидероз

- Возникает при внесосудистом гемолизе в очагах кровоизлияний (гематомах).
- Гемосидероз легкого (бурая индурация легких) при венозном застое вследствие пороков сердца.

Общий гемосидероз


- Возникает при внутрисосудистом гемолизе, развивающемся:
 - а) при заболеваниях системы крови (анемиях, лейкозах, врожденных дефектах эритроцитов и гемоглобина);
 - б) при отравлениях гемолитическими ядами;
 - в) при инфекционных заболеваниях (малярия, сепсис, возвратный тиф и др.)
 - г) при переливаниях несовместимой крови и резус-конфликте.

- **Гемосидерин** появляется первоначально и преимущественно в мононуклеарных фагоцитах селезенки, печени, лимфатических узлов и костного мозга, а также в макрофагах, разбросанных по другим органам – в коже, поджелудочной железе, почках. В дальнейшем может появляться и в клетках паренхимы (гепатоцитах).
- По мере накопления пигмента органы приобретают бурую (ржавую) окраску.
- Микроскопически гемосидерин коричневого цвета, при реакции Перлса голубовато-зеленоватого цвета.
- В большинстве случаев накопление пигмента в органах не приводит к их дисфункции.


ПЕЧЕНЬ В РАЗРЕЗЕ




ГЕМОСИДЕРИН В ПЕЧЕНИ (ОКР ГЕМАТОКС. И ЭОЗИН)



РЕАКЦІЯ ПЕРЛСА





Гематины – окисленная форма гема при гидролизе оксигемоглобина

1. гемомеланин – накапливается внутри эритроцитов под воздействием малярийного плазмодия (имеет вид мелких черных зерен), после распада Э. захватывается макрофагами печени, селезенки. Может накапливаться в головном мозге (коматозная форма острой малярии). Органы, содержащие пигмент, темно-серого цвета.
2. соляно-кислый гематин – в слизистой желудка при кровоизлияниях (в эрозиях и острых язвах) – темно-коричневого цвета
3. формалиновый пигмент- при помещении тканей в формалин с кислой р-цией

Билирубин. Основной пигмент желчи.

- Образуется в клетке при разрушении гемоглобина, железа не содержит.
- В крови связывается с альбумином.
- В гепатоцитах происходит конъюгация – связывание билирубина с глюкуроновой кислотой, после чего он выделяется с желчью.
- При избыточном накоплении билирубина в крови (более 20 мкмоль/л) в тканях развивается желтуха (появляется желтушное окрашивание кожи, склер, слизистых оболочек и пр.).

Различают следующие виды желтухи.

1. Надпеченочная (гемолитическая) – возникает при внутрисосудистом гемолизе наряду с общим гемосидерозом; в крови увеличивается содержание неконъюгированного билирубина.

2. Печеночная (паренхиматозная) – возникает при заболеваниях печени (гепатиты, гепатозы, циррозы);


– нарушаются захват и конъюгация билирубина поврежденными гепатоцитами;


– увеличивается содержание конъюгированного и неконъюгированного билирубина.

3. Подпеченочная (механическая) – возникает при обтурации желчных путей (опухолью, камнем);

– нарушается экскреция желчи, конъюгированный билирубин поступает в кровь; сопровождается холестазом.







Протеиногенные (тирозиногенные) пигменты: меланин, адренохром, пигмент гранул энтерохромаффинных клеток

Меланин. Синтезируется в меланосомах в клетках (меланоцитах) из тирозина под действием тирозиназы.

Меланоциты – клетки нейроэктодермального происхождения, обнаруживаются базальном слое эпидермиса, сетчатке и радужной оболочке глаза, мягких мозговых оболочках.

Пигмент может поглощаться макрофагами – **меланофагами.**

Гистохимический метод – **аргентаффинная реакция.**

Нарушения обмена – распространенные и местные гиперпигментации и гипопигментации.

Гиперпигментации (гипермеланозы)

а. **Распространенные.** Приобретенные: Аддисонова б-нь (туберкулез, опухоли, амилоидоз, аутоиммунные поражения надпочечников), при кахексии, при эндокринных расстройствах – аденоме гипофиза, гипогонадизме, гипертиреозидизме, сах. диабете, оп. яичников, а также при использовании гормональных контрацептивов и беременности. **Макро**: меланодермия (коричневая окраска кожи, сухость ее и шелушение). **Микро**: повышение содержания меланина в базальных слоях эпидермиса, атрофия эпидермиса, гиперкератоз. Врожденные: пигментная ксеродерма (пятнистая пигментация кожи, отек, гиперкератоз) – предраковый процесс (рак, меланома)

б. **Местные**: невусы, меланома


Гипопигментации: а. распространенные – альбинизм,

б. местные – витилиго, лейкодерма



Липидогенные пигменты

- **Липофусцин** – пигмент старения, изнашивания. При кахексии, старении в клетках печени, миокарда, скелетных мышц.
- **1. Бурая атрофия сердца:** сердце маленькое, количество жировой клетчатки под эпикардом значительно уменьшено, венечные артерии извитые, миокард плотный, бурого цвета, микро – в цитоплазме бурые зерна пигмента.
- **2. Бурая атрофия печени** –печень уменьшена, плотная, край ее острый, бурого цвета. Микро: истончение печеночных балок, зерна бурого пигмента в цитоплазме гепатоцитов.



Нарушение обмена нуклеопротеидов

- Подагра, мочекаменная болезнь мочекислый инфаркт,
- **Подагра** – хр. заболевание, связанное с наследственным дефектом пуринового обмена.
- Мужчины 40–50 лет
- Гиперурикемия, гиперурикурия
- Периодическое выпадение уратов в мелких суставах пальцев рук и ног, в сухожилиях, околоуставных тканях, в ответ – некроз и воспаление (артриты. бурситы) с развитием соединительной ткани и образованием подагрических шишек (деформация). Микро: некроз, аморфные массы с кристаллами мочекислового натрия, воспалительный инфильтрат с гигантскими многоядерными клетками инородных тел и развитие соединительной ткани. Подагрическая почка (выпадение солей – атрофия, склероз, воспаление).

Минеральные дистрофии

Нарушения обмена кальция

С кальцием связаны процессы проницаемости клеточных мембран, возбудимости нервно-мышечного аппарата, свертываемости крови, регуляции кислотно-щелочного равновесия, формирования скелета.

Метаболизм кальция

- Кальций всасывается в виде фосфата в верхнем отрезке тонкой кишки.
- Для адсорбции кальция в кишке необходим витамин D, который стимулирует образование его растворимых фосфатов.

- Основная масса кальция депонируется в костях: компактная кость – стабильное депо, губчатая кость эпифизов и метафизов – лабильное депо.
- Растворение кости и вымывание кальция из депо в одних случаях происходит с помощью остеокластов (лакунарное рассасывание), в других – образуется «жидкая кость» без участия клеток (гладкая резорбция).
- Поступление кальция с пищей и из депо уравнивается экскрецией его толстой кишкой, почками.
- Паратгормон (гормон околощитовидных желез) способствует вымыванию кальция из костей (стимулируя остеокласты); кальцитонин (гормон щитовидной железы) действует противоположным образом.

Кальцинозы (известковые дистрофии, или обызвествления).

- Характеризуются отложениями в тканях солей кальция.
- Могут быть системными и местными
- По механизму развития различают метастатическое, дистрофическое и метаболическое обызвествление.


1. Метастатическое обызвествление.


- Основную роль играет гиперкальциемия, возникающая:
 1. При патологии органов регуляции обмена кальция – гиперпаратиреозидизме (аденомы, гиперплазия околощитовидных желез);
 2. При патологии депо кальция – массивной резорбции костной ткани (миеломная болезнь, метастазы злокачественных опухолей в кости, множественные переломы, длительная иммобилизация костей);
 3. При патологии органов выделения кальция (при хронической почечной недостаточности, хронических колитах).


- Носит системный характер:
- – поражаются почки, миокард, крупные артерии, легкие (т.е. органы, в которых рН несколько выше, чем в других);
- – соли кальция в виде фосфата (апатита) в первую очередь выпадают на кристах митохондрий и в лизосомах, которые являются матрицей обызвествления;
- – после гибели клеток обызвествление распространяется на волокнистые структуры.

Известковые фокусы – фокусы метастатического обызвествления:

- макроскопически обычно не выявляются;
- микроскопически обнаруживаются многочисленные мелкие очаги темно-фиолетового цвета, представленные инкрустированными солями кальция, некротизированными клетками (кардиомиоциты, эпителий канальцев почки и пр.), часто с прилежащими участками стромы, вокруг которых могут быть воспалительный инфильтрат и склероз;
- специфической окраской для выявления фокусов обызвествления является серебрение по Коссе, при котором они окрашиваются в черный цвет;
- обычно метастатическое обызвествление не приводит к нарушению функции, лишь изредка в связи с поражением легких развивается дыхательная недостаточность, а массивный нефрокальциноз может привести к почечной недостаточности.







2. Дистрофическое обызвествление.

- Уровень кальция в крови не меняется.
- Возникает местно при некрозе, дистрофии, склерозе.
- Для развития имеют значение ощелачивание среды и повышение активности фосфатаз, высвобождающихся из поврежденных тканей.
- Фокусы дистрофического обызвествления называются петрификатами.
- Петрифицироваться могут как отдельные некротизированные клетки (псаммомные тельца), так и большие участки некроза

- Наиболее часто встречаются следующие проявления дистрофического обызвествления:

- а) петрификаты в легких, возникающие при заживлении фокусов казеозного некроза при туберкулезе — очаги белого цвета, каменистой плотности, окруженные соединительнотканной капсулой;
- б) обызвествленные атеросклеротические бляшки (атерокальциноз).

3. Метаболическое обызвествление

(интерстициальный кальциноз, известковая подагра).

- Уровень кальция в крови не меняется.

В развитии обсуждается роль следующих факторов:

- а) нестойкость буферных систем, удерживающих кальций в растворенном состоянии;
- б) кальцифилаксия – повышенная чувствительность тканей к кальцию.

- Может быть системным (распространенным) или ограниченным:

- а) при системном кальцинозе соли кальция выпадают в коже, подкожной клетчатке, по ходу сухожилий, фасций, в мышцах и сосудах;
- б) при ограниченном кальцинозе характерны отложения извести в виде пластинок в коже пальцев рук.

Спасибо за внимание!