

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ РОСЛИН ДЕКОРАТИВНИХ ЛУК

Різнотрав'я

Різнотрав'я, група трав'янистих рослин, що включає всі види, крім злаків, бобових і осокових.

Поширення:

- у травостоях на ранніх стадіях розвитку луків;
- при порушенні лук в результаті надмірного випасу;
- на перенасичених органічними добривами місцях;
- при відмирання злаків в місцях вимокання на заплавах луках.

У травостоях різних типів луків Різнотрав'я становить від 10 до 60% і більше.

Айстрові.

Кульбаба лікарська

Taraxacum officinale

Багаторічна рослина з довгим стрижневим коренем, який може утворювати додаткові бруньки. Стебла заввишки 10-40 см. Листки перисторозсічені, зібрані в прикореневу розетку. Кошики великі, квіти яскраво-жовті, цвіте у квітні–серпні. Розмножується насінням і вегетативно. Росте повсюдно на луках з родючими ґрунтами, на галявинах, вигонах, біля доріг, як бур'ян на полях.



Осот польовий

Cirsium arvense

Стебла 40-160 см заввишки, листки здебільшого перисто-розсічені з надрізними пластинками, з довгими і міцними колючками по краях.

Кошики з буруватою або бруднувато-пурпурватою обгорткою.

Розмножується насінням, яке має летючки, завдяки чому далеко розноситься вітром, а також відростанням із коренів порослі протягом вегетаційного періоду.



Осот прибережний

Cirsium rivulare

Багаторічна рослина, 60–120 см зав вишки. Стебла під кошиками білуваті, облистнені переважно в нижній частині.


Прикореневі та найнижчі стеблові листки короткочерешкові, еліптичні та довгасто-еліптичні, закінчуються коротенькою тонкою колючкою. Середні стеблові листки сидячі, стеблообгортні.



Цикорій дикий

Cichorium intybus

Багаторічна розсіяно-волосиста рослина з веретеноподібним коренем, заввишки 15–120 см. Нижні листки ліроподібні, верхні – ланцетні. Кошики сидячі, квітки голубі, білі або рожевуваті.



Деревій звичайний

Achillea millefolium L.

Багаторічна рослина, заввишки 40-100 см, з рідкуватим опушенням і перисторозсіченими листками.

Кошики в щитоподібних суцвіттях.

Квітки білі, цвіте у червні–серпні.

Трапляється окремими рослинами на легких ґрунтах, на узліссях, галявинах, біля доріг.



Підбіл звичайний (мати-й-мачуха)

Tussilago farfara L.

Багаторічна рослина з повзучим кореневищем, заввишки 10-25 см. Після цвітіння розвиваються прикореневі округло-серцеподібні, знизу білоповстисті, зверху голі листки.

Кошики поодинокі, квітки золотисто-жовті.

Цвіте в березні–травні.

Має широкі розетки і м'ясисті листки, через що сильно затінює ґрунт і пригнічує трави.



Любочки осінні

Leontodon autumnalis L.

Багаторічна рослина, стебло опушене, 15–60 см заввишки. Листки в прикореневій розетці. Квітки жовті, цвіте в червні–жовтні. Рослини перезимовують у вигляді розеток.



Козельці лучні

Tragopogon pratensis L.

Однорічна рослина з лінійними цілокраїми листками до 80 см заввишки.

Кошики багатоквіткові, розміщені на кінцях стебел.

Квітки яскраво-жовті, цвіте у травні–вересні.

Розкриті суцвіття – кошики – завжди повертаються за сонцем. Поширені на луках, узліссях, серед чагарників, на лісових галявинах та схилах гір.

До ґрунтів невибагливі, витримують затінення.



Королиця звичайна

Leucanthemum vulgare Lam.

Багаторічна рослина із стрижневим коренем, заввишки 20–65 см.

Листки прикореневі, а нижні стеблові довгасті або оберненояцеподібні, надрізано-зубчасті.

Кошики поодинокі, розміщуються на кінцях стебел.

Крайові квітки язичкові, білі, серединні – трубчасті, двостатеві, жовті.

Розмножується насінням і вегетативно.

Зимує у вигляді розетки



Полин звичайний

Artemisia vulgaris

Багаторічна рослина,
50-150 см заввишки.
Цвіте в липні–серпні.
Поширений по всій Україні,
переважно по берегах
річок, на вологих луках,
перелогах, серед
чагарників, на узліссях, при
дорогах, в усіх смугах
Карпат.



Полини



Полин
кримський



Полин
солончаковий



Полин
австрійський

Лободові

Лобода біла


Chenopodium album

Однорічна рослина, до 100 см заввишки.

Цвіте в липні–вересні.

Поширена на забур'янених місцях, вздовж доріг, як бур'ян городніх культур. Іноді утворює суцільні зарості.

Насіння має тверду оболонку і добре зберігається в ґрунті, не втрачаючи схожості протягом багатьох років.



Курай іберійський (перекотиполе)

Salsola ruthenica Czernae et Schmidt

Однорічна рослина з коротковолосистими стеблами та листками.

Стебло 20-75 см заввишки, від основи розгалужене.

Квітки в колосоподібних суцвіттях.

Цвіте в липні–вересні.



Віниччя сланке

Kochia prostrata

Багаторічна сіроопушена гілляста рослина, 50–60 см заввишки, поширена на каштанових і солонцюватих ґрунтах у Степу, зокрема в Криму.

Влітку, коли інші трави вигоряють, віниччя росте нормально.



Зонтичні

Кмин звичайний

Carum carvi L.

Дворічна (рідше багаторічна) ефіроолійна рослина, 40–100 см заввишки.

Корінь веретеноподібний або циліндричний.

Рослина гола.

Стебло від середини розгалужене.

У травостоях нерідко утворює розріджені зарості, поширений на лучних угіддях, часто на перелогах.



Бедринець ломикаменевий

Pimpinella saxifrage L.

Багаторічна рослина, 30–70 см заввишки.

Стебло циліндричне, тонкоборозенчасте.

Квітки білі.

Цвіте в червні–серпні.

Поширений на сухих і середньовологих угіддях, по чагарниках, на галявинах, вздовж доріг.

Рослина невибаглива до ґрунтів.

Посухо- і морозостійка



Морква дика

Daucus carota L.

Дворічна рослина, до 80 см заввишки, жорстковолосиста. Квітки білі. Цвіте у червні– серпні. Трапляється на лісових полянах, узліссях, на полях, біля доріг.



Розові

Родовик лікарський

Sanguisorba officinalis

Багаторічна малооблиственена рослина з голим стеблом, 50-150 см заввишки.

Квітки темно-червоні, зібрані щільними головчастими суцвіттями.

Цвіте в червні–серпні.

Поширений на середньовологих, багатих на гумус лучних ґрунтах, які влітку періодично пересихають.



Перстач гусячий (гусячі лапки)

Potentilla anserine L.

Багаторічна рослина, 15-40 см заввишки.

Стебла тонкі, стеляться по землі.

З вузлів надземних пагонів, які вкорінюються, виростають непарноперисті, з нижнього боку – шовковисто-сріблясті листки і світло-жовті квітки.

Трапляється на вологих луках, осушених торфовищах.



Гречкові

Щавель кислий

Rumex acetosa L.

Багаторічна рослина з тонким, мичкуватим корінням.

Стебло до 100 см заввишки.

Прикореневі та нижні стеблові листки довгочерешкові, з трикутними, спрямованими вниз боковими пластинками.

Суцвіття – циліндрична або овальна волоть.

Пелюстки рожеві, червоні чи жовті.

Поширений у невеликих кількостях на луках, лісових галявинах, серед чагарників, на схилах гір.

Розмножується насінням.



Кінський щавель

Rumex Confertus Willd.

Багаторічна рослина, до 150 см заввишки.

Нижні листки довгасто-серцеподібні, з довгастим, зверху жолобкуватим черешком, по краях хвилясті, верхні – яйцеподібно-ланцетні.

Листки знизу, особливо по жилках, шорстковолосисті.

Суцвіття вузьке й густе, майже безлисте.

Росте на луках, вогкуватих узліссях, галявинах, берегах річок, при дорогах.



Альпійський щавель

Rumex alpinus

Подібний до кінського, що росте на рівнинах.

Має широкі листки.



Спориш звичайний (гірчак звичайний) *Polygonum aviculare* L.

Однорічна рослина з лежачими або висхідними, дуже розгалуженими, густо вкритими листками, стеблами, заввишки 20–40 см.

Листки еліптичні й рідше вузькодовгасті. Квітки білі або рожевуваті.

Цвіте у травні–жовтні. Росте на ущільнених ділянках, дорогах та в дворах.

Розмножується насінням, яке прилипає до ніг тварин і людей, до коліс машин і таким чином поширюється й проростає у сприятливих умовах.



Гвоздичні Коронарія зозуляча (зозулин цвіт) *Coronaria floscuculi*

Багаторічна рослина,
заввишки 30–70 см.

Стебла прямостоячі, вгорі
розгалужені.

Квітки в рідкому волотистому
або щитковидно-волотистому
суцвітті, пелюстки рожеві з
глибокою пальчасто-
чотирироздільною
пластинкою.

Цвіте у червні-серпні.
Росте на вологих луках, по
краях боліт, серед чагарників.



Подорожник ланцетолистий

Plantago lanceolata L.

Багаторічна опушена
рослина, заввишки до 50 см.

Листки ланцетні з довгим
жолобчастим черешком.

Квітки малі, зібрані у коло
соподібні верхівкові суцвіття.

Цвіте у квітні-вересні.

Трапляється в посівах
багаторічних трав.



Подорожник великий (звичайний) *Plantago major* L.



З'являється при інтенсивному використанні лук часто

Губоцвітні

М'ята польова

Mentha arvensis L.

Багаторічна кореневищна рослина.

Стебло чотиригранне, малорозгалужене, вкрите волосками, до 60 см заввишки.

Листки яйцеподібно-загострені, блискучі, при розтиранні мають запах м'ятної олії.

Квітки лілові або рожево-лілові.

Поширена на заплавах, по берегах водойм.



**До родини губоцвітих
належать:**



Жабрій
звичайний



Суховершки
звичайні