

Олени

Виды и особенности их
поведения



Подлужнов
Андрей



Выпускник СПбГАВМ
1999

Работа в оленеводстве с 2013 года

Семейство Оленевые Cervidae



Согласно Википедии в мире 51 вид

Pudu deer – «Мышинный» олень



Обитает в Южной
Америке.

Имеет два подвида:
южный и северный.

Высота в холке 32-44 см
длина до 85 см

Китайский водяной олень/Chinese
water deer/*Hydropotes inermis*



Мунтжак/Muntjac/Muntiacus





Северный олень/Reindeer/Rangifer

tarandus



высота в холке 120-140
см,

масса тела до 180 кг

У северных оленей рога имеют самцы и самки




Сроки обезроживания разных групп оленей




Ареал обитания северных оленей



Совмещённые ареалы северного и благородного оленей








Смена цвета глаз у северного оленя в зависимости от времени года

Благородный олень
сибирский подвид (Меропт)/Red
deer /Cervus elaphus sibiricus




Высота в холке 150 см высота в холке, масса
тела 250-300 кг.

Elk



Deer



Ареал обитания благородного оленя



Вапити/Wapiti/Cervus canadensis



Европейский благородный

олень/Red deer/*Cervus elaphus*
hippelaphus



www.deertrophy.hu

Благородный олень венгерской селекции. Ферма Arpad Vokor




Благородный олень дикая популяция.
Потомок ввезённых немецких оленей .
Воронежский заказник


Пятнистый олень/Sika deer/Cervus nippon



высота в холке
120 см, масса
тела около 170
кг.



Ареал распространения пятнистого оленя





Пятнистые олени в японском городе Нара

Лань/Fallow deer/Dama dama


ВЫСОТА В
ХОЛКЕ
120 см,
вЕС ДО
100 кг



Ареал обитания лани (реконструкция)




Average size of farm



Dr. Radim (Maugli) Kortba, president of FEDFA
Institute of Animal Science in Prague and Czech University of Life Sciences in Prague

Number of farmed deer in Europe (2010)



Dr. Radim (Maugli) Kortba, president of FEDFA
 Institute of Animal Science in Prague and Czech University of Life Sciences in Prague

Белохвостый олень/White
tailed deer/Odocoileus
virginianus



ВЫСОТА В ХОЛКЕ 110 см, вес до 130
кг.

Fast Facts

Body Weight - Male: 60-131 kg (130-290 lbs.)
- Female: 40-90 kg (88-198 lbs.)

Mature Males can exceed 181 kg (400 lbs.)
Record Male: 231.78 kg (511 lbs.) MN-1926
(Bergmann's Rule generally apply)


Height at Shoulder: 53-119 cm (21"-47" inches)

Female Reproduction: 1-3 fawns per year

Average Gestation: 200 days

Male Antler Peak Performance: 5-6 years

Top Speed: 56-64 km/h (35-40 mph)



Тишы рогов белохвостого опеня



Width
Beam Length
Browtines



Tine Length



Typical





Mass



Droptines



Non-Typical

Glenn Dice Farms

United States of America

White-tailed Deer

- History
- Economic Impacts
- Genetic Selection

Гишы благородного оленя





<https://www.woburnabbeydeerfarm.co.uk>

Battlesden (R5) Woburn sire

Классический английский тип рогов, короткий толстый ствол и множество отростков



Благородный олень венгерской селекции.
Длинный основной ствол и отростков, при
их небольшом количестве.

Поведение оленей







Стадо самцов в парке хозяйства
Woburn



Самки и молодняк пасутся отдельно от самцов





Покусы спины как иерархические
отношения между самками в стаде



Таблица 8. Некоторые показатели, связанные с перемещением оленьих и крупных хищников при глубокоснежье*

Вид	Нагрузка на площадь следа, г/см ²	Средняя высота животных до груди, см	Показатель трудности перемещения, г/см ² /см	Критическая высота снежного покрова, см
Северный олень	140–180	76	2,1	80–90
Косули	300–360	44	8,9	40–50
Лось	420–500	102	4,6	90–100
Благородный олень	300–720	78	8,6	50–60
Пятнистый олень	830–1140	56	17,6	30–40
Тигр	158			
Волк	89–114			50
Рысь	34–60			

* По [Формозов, 1946, 1990; Насимович, 1955; Бромлей, Кучеренко, 1983]; с изменениями.



Кружение северных оленей , снято с коштера

CONCENTRATE
SELECTORS



WHITE-TAILED DEER



MULE DEER



MOOSE

INTERMEDIATE
SELECTORS



CARIBOU



ELK

GRASS-ROUGHAGE
SELECTORS



BISON

Ruminant Feeding Types





Fig. 2. European ruminants according to feeding type (shaded), domesticated species white; the further to the right, the better a species' adaptation to digest plant cell wall/fibre in its RR; the more to the left, the more plant cell contents are selected for. Note changes in diurnal feeding frequency (from Hofmann 1976, redrawn)

From: Hofmann, R. R. 1989. Evolutionary steps of ecophysical adaptation and diversification of ruminants: A comparative view of their digestive system. *Oecologia* 78:443-457.



Олени едят около 20 видов кустарников, в той или иной мере потребляют 141 вид трав, пятнистые олени способны потреблять 179 видов трав и ещё 11 они поедали случайно



Типичный английский









Мама приводит новорожденного оленёнка в общее стадо



**Ферма Президента латышской
ассоциации оленеводов Dainis Paeglītis.
<https://www.safariparks.lv>**



Ферма Президента литовской ассоциации
оленоводов Gintautas Čerapas
<http://www.ceroukis.lt/>



Олени литовского фермера
Linus Pakamanis <http://www.cervusaureus.lt/>





Стадо держится на удалении



Алтайские олени держатся на



Хозяйство Днепр-Холм



Вид внутри прогона



Сортировочный комплекс на ферме
Днепр-Холм



КОНТАКТ

Ы

 **контакте**

red_deer_ru



+7930-857-47-62



podluzhnov@yandex.ru

<http://deer-consult.ru/>



Спасибо за внимание