





Типичные неотложные состояния



Докладчик: Саид Шох Сийтара
Куратор: к.м.н. Киселёв А.Ю.

1. Отравления, тошнота, рвота
2. Укусы
3. Инфаркт, стенокардия
4. Ожоги, электротравма
5. Обморожение, отморожение,
тепловой удар
6. Приступ эпилепсии
7. Непроходимость дыхательных путей
8. Шок





REMEMBER ME!



Отравления, рвота, тошнота

Симптомы зависят от типа токсического вещества и от пути попадания токсина в организм!




Через пищеварительный тракт


1. Вызвать скорую помощь!
2. Положить пострадавшего на левый бок
3. После рвоты давать обильное питьё



Через дыхательные пути :

1. Изолировать пострадавшего от воздействия газа или паров
2. Свежий воздух
3. Скорая помощь!
4. Удобное положение и наблюдение за признаками жизни!



1. **Использовать Защитные перчатки! Вызвать скорую при тяжелых случаях!!**
2. Стряхнуть сухое вещество с кожи, с одежды (сухие химикаты)
3. Промыть проточной водой в течении 20 мин место контакта
4. При наличии раны + чистая стерильная повязка







Не чесать




Снять отек или...








Нанести бальзам
после укусов!




Ты не ты, когда голоден!





ВСЕ ПРОСТО EASY!

SPIDER BITE




Симптомы:

- В области укуса пострадавший чувствует сильную боль
- Из ранки выступает несколько капелек крови
- Спустя некоторое время после укуса может появиться чувство холода, затруднение дыхания, сильная жажда, нитевидный пульс, обмороки, судороги, бред



Первая помощь!

- Необходимо удалить яд из ранки
- По возможности не трогать место укуса
- Пострадавшего укутать в теплую одежду
- Давать обильное питье
- Быстро доставить его в специализированное отделение токсикологии или в ближайшее ЛУ





Чего не надо делать:



Как не пропустить инфаркт

Типичные симптомы



1 Боль за грудиной (обычно сильная, сжимающая или жгущая).

2 Боль может отдавать в левые руку, лопатку, плечо или челюсть.

3 Нитроглицерин боль не снимает.

4 Могут быть также:
■ одышка (нехватка воздуха),
■ неритмичный или медленный пульс.

! Если боль не проходит в течение 10 минут после приёма нитроглицерина, нужно принять 300 мг аспирина и вызвать «скорую помощь».




Инфаркт миокарда



Что делать?

-  Вызвать скорую помощь
-  Уложить больного приподняв ему голову
-  Измерить артериальное давление

1. Успокоить пострадавшего
2. Придать удобное положение, ослабить стесняющую одежду
3. Обеспечить приток свежего воздуха



1. Поверхностные (покраснение кожи)
2. Умеренно-глубокие (появление на коже пузырей)
3. Глубокие (обугливание кожи и подлежащих тканей)



I степень –
покраснение кожных
покровов



II степень –
образование пузырей
на коже




**III–IV степень – обугливание
кожи и тканей (до кости)**








1. При глубоких ожогах вызвать скорую помощь!
2. Охладить обожженную поверхность (15-20 мин)
3. Приложить стерильную повязку



Нельзя!!!




Электротравма




Верхняя петля
прохождения тока



Нижняя
петля





Полная, W-образная
петля прохождения тока



Освобождение пострадавшего от воздействия тока: отключить источник тока (рубильник, пробки) или перерубить провода на разных уровнях топором с деревянной сухой рукояткой.

Оттащить пострадавшего за ремень или сухую полу одежды, избегая касаний обнаженных конечностей или обуви (металлические гвозди).



ПРИЗНАКИ ОБМОРОЖЕНИЯ

I степень



кожа белеет, затем краснеет и припухает, появляются покалывание и боль;

II степень



образуются волдыри с кровяным содержимым, возникает сильная боль;

III степень




происходит омертвление кожи и подкожных тканей;

IV степень



развивается омертвление глубоко расположенных тканей и костей.





ВНИМАНИЕ!

Переохлаждение

Симптомы гипотермии



Дрожь
и озноб



Слабость



Потеря
сообрази-
тельности
и ловкости



Бледная и
холодная на
ощупь кожа



Вялые
движения



При тяжелой
форме возможны
галлюцинации


Профилактика гипотермии



Носите головной убор
и одежду из шерстяной
ткани или меха



Откажитесь от напитков с
содержанием алкоголя и
кофеина (они препятствуют
выделению тепла вашим
телом)



Что делать при обморожении



При потере сознания, отвердении кожи, волдырях, отеках немедленно вызвать «скорую помощь»



На пораженные участки кожи наложить сухую марлевую повязку



Если обморожена конечность, пострадавший должен двигать ею для восстановления кровообращения



Дайте человеку теплое питье (бульон, какао, чай)



Восстанавливаться в теплой (но не горячей) ванне около 20 минут

Нельзя



Интенсивно растирать обмороженные участки



Использовать горячую воду



Применять масляные средства и жирные кремы



Давать пострадавшему алкоголь



Тепловой удар

ПРИЧИНЫ ТЕПЛОВОГО УДАРА У ДЕТЕЙ


Слишком
теплая одежда



Одежда
из синтетических
тканей



Душное помещение





Обезвоживание



Отсутствие
головного убора



Открытые
солнечные лучи



СИМПТОМЫ



головная
боль



слабость



коматозное
состояние
или судороги

40°C



температура
тела выше
40°C





летаргия
(болезненное
вялое состояние)



потеря ориентации,
возбуждение и
спутанность сознания



тахикардия,
учащенный
пульс



01

Аккуратно положить пострадавшего в прохладное темное место, которое проветривается

02

Если что-то из одежды мешает человеку получать кислород, устранить это (ослабить ремень, снять обувь и т. д.). Вызвать врача или скорую помощь.

03

Смочи салфетку или полотенце и положи больному на голову, шею и в паховую область. Не пытайся погрузить его в водоем или ванную с холодной водой.

04


Если пострадавший не приходит в себя уже более 3-5 минут, перевернуть его на бок и зафиксировать в таком положении.

05



При судорогах и галлюцинациях обернуть человека от травм.

06

Напоить прохладной водой, если больной пришел в сознание.




Эпилептический приступ



Первая помощь во время приступа эпилепсии:

1. Вызвать скорую помощь
2. Положить человека набок
3. Подложить под голову что-то мягкое (подушку, руку)




Механическая асфиксия

Освобождение проходимости дыхательных путей


Если пострадавший подавился, спросите, может ли он дышать. Это ключевой вопрос для того, чтобы отличить полную обструкцию от частичной!

Если пострадавший **может дышать и говорить** (частичная обструкция):

- Побуждайте его продолжать кашлять!
- Не мешайте ему откашливать инородное тело!



"Вы задыхаетесь?"




1 Маленькие дети




2 Старшие дети



3 Взрослые



4 Самопомощь







Инородное тело в дыхательных путях



(полная непроходимость дыхательных путей – помощь ребенку до 1 года)



а – перекладывание на правую руку;
б – похлопывание;
в - перекладывание на левую руку;
г - нажатие на грудную клетку.




Прием Геймлиха




Исход при правильном проведении!




При неблагоприятном исходе СЛР!






1 фаза – возбуждение

- Лицо красное
- Пострадавший мечется
- Кричит
- Дыхание частое, глубокое
- Реакция неадекватная




2 фаза – торможение

- Лицо резко бледное;
- Носогубный треугольник синий
- Озноб
- Вялость, сонливость
- Отсутствие движений
- Кожа конечностей холодная
- Пульс слабый
- Дыхание поверхностное
- Реакция неадекватная.




Противошоковые меры:

- успокоить пострадавшего, если он находится в сознании;
- согреть – одеяло, теплая одежда (даже летом человеку станет холодно);
- уложить на спину и приподнять ноги (если в сознании и нет травм головы, шеи и позвоночника);
- дать теплое сладкое питье;
- следить за состоянием.



Не давать пить , если

- серьезная травма головы
- сердце болит
- проникающее ранение брюшной полости (иначе дать теплое питье);
- подозрение на внутреннее кровотечение.



“Быть счастливым счастьем других — вот настоящее счастье и земной идеал жизни всякого, кто посвящает себя медицинской науке.”

**Н.
И. Пирогов**

