Путь к полнодозовой комбинированной терапии АГ

ЦЕЛИ И ВОЗМОЖНОСТИ

3 дозы – 3 степени АГ

10

Периндоприла
аргинин (2,5 мг)
индапамид (0,625
мг)

Периндоприла
аргинин (5 мг)
индапамид (1,25 мг)

Периндоприла
аргинин (10 мг)
индапамид (2,5 мг)

Низкодозовая комбинированная терапия – альтернатива монотерапии

- Цель: Сравнить эффективность и переносимость 3 антигипертензивных терапевтических стратегий лечения у

STRATHE
STRAtegies of Treatment in Hypertension Evaluation

Дизайн исследования

STRATHE – основные результаты

Снижение САД (мм рт.ст.)

Нормализация АД (% пациентов)

Шаг за шагом

Последовательная

Нолипрел/форте

Нолипрел/форте - оптимальная терапевтическая стратегия по эффективности и переносимости лечения, в сравнении с последовательной и пошаговой стратегиями

Дизайн исследования PICXEL

Оценка эффективности лечения у пациентов с АГ и ГЛЖ

10

Echo Echo Echo Echo Echo Echo Echo Echo Echo Echo

Dahlof B., the PICXEL study. J Hypertens. 2005;23:2063-2070.

терапевтических доз – дополнительный резерв

10

эффективности

Более мощное и быстрое снижение АД

+
дополнительная
нормализация
АД у **22%**
больных

+
дополнительное
снижение САД
-16 мм.рт.ст.

Полнодозовая комбинация – возможность более мощной кардиопротекции

10

Дизайн исследования PREMIER

Оценка эффективности лечения у пациентов с СД и МАУ

10

Выраженная нефропротекция – даже у более тяжелых больных с СД и АГ

10

Полнодозовая комбинация – безопасность в отношении риска гипокалиемии

10

Частота развития гипокалиемии <3.4 ммоль/л

- Нолипрел А — 0,5%,
- Нолипрел А форте — 2,1%,
- Нолипрел А Би-форте — 2,8%

PREMIER

Оценка качества контроля АД

Исследование по пропуску приема дозы

10

Доказательства надежности контроля АД 24 часа – исследование по пропуску приема 1-2 доз

Даже после пропуска 1 приема Нолипрела форте остаточное снижение АД составило **75%***

Даже после пропуска подряд 2-х приемов Нолипрела форте остаточное снижение АД составило **61%***

* От исходного уровня АД, по данным СМАД

Прогноз и органопротекция

Снижение смертности

Жесткая конечная точка – основа выбора между различными классами

Новые европейские рекомендации по профилактике ССЗ (2012)

- Главная цель лечения АГ: снижение сердечно-сосудистой заболеваемости и **смертности**
- Смертность от ССЗ имеет большее значение, чем фатальные и нефатальные осложнения, так как:
 - Смерть – это жесткая и воспроизводимая конечная точка
 - Лечение обеспечивающее снижение смертности, обеспечивает так же и снижение осложнений (ИМ, инсульт и др.)

Индапамид – диуретик выбора Британские рекомендации по АГ 2011

«При необходимости
назначения диуретика
должен быть выбран
индапамид 1.5 или 2.5 мг
(ХТД 12.5-25мг), а не ГХТЗ
или БФМЗ»

NCGC National Clinical Guideline Centre

Update of clinical guidelines 18 and 34

Hypertension

The clinical management of primary hypertension in adults

Clinical Guideline 127

Methods, evidence, and recommendations

August 2011

*Commissioned by the National Institute for
Health and Clinical Excellence*

Индапамид – диуретик выбора

Индапамид –
диуретик с лучшей
эффективностью и
переносимостью

Терапия основанная на периндоприле – высший уровень доказанности

Периндоприл + индапамид, оптимальный выбор для комбинации

Наименьшая частота прекращения лечения

Периндоприл + индапамид был 2-х из 3-х исследований со снижением смертности у пациентов с АГ

Нолипрел доказано обеспечивает комплексную нефропротекцию

* Versus patients 73% of whom were receiving an ACE inhibitor or a sartan.

** Development of macroalbuminuria, doubling of serum creatinine to a level of at least 2.26 mg/dL (200 μ mol/L), need for renal replacement therapy, or death due to renal disease.

*** All-cause mortality.

1. De Galan BE et al. *J Am Soc Nephrol*. 2009;20:883-892.
2. Lambers Heerspink HJ, et al. ADVANCE Collaborative Group. *Eur Heart J*. 2010;31:2888-2896.
3. Patel A et al; ADVANCE Collaborative Group. *Lancet*. 2007;370:829-840.

Нефропротекция, с одновременным снижением смертности

Исследование	Активное лечение	Снижение почечных событий	Снижение смертности	
			Сердечно-сосудистой	Общей
ADVANCE	Нолипрел	-21% Первичная и вторичная профилактика	-18%	-14%
IDNT	Ирбесартан	Да Вторичная профилактика	Нет	Нет
RENAAL	Лосартан	Да Вторичная профилактика	Н/Д	Нет
ONTARGET	Телмисартан	Нет	Н/Д	Нет
DIRECT	Кандесартан	Да Вторичная профилактика	Н/Д	Нет
ROADMAP	Олмесартан	Да Вторичная профилактика	Нет	Нет
ACCOMPLISH	Беназеприл/ амлодипин	Да Вторичная	Н/Д	Нет

Нет - недостоверно

Н/Д - Нет данных

Adapted from Garcia-Donaire JA, et al. *Blood Press* 2011;20:322-334.

Снижение риска коронарных событий и непревзойденное снижение смертности

Исследование	Активное лечение	Коронарные случаи	Общая смертность
		NNT	NNT
ADVANCE	Нолипрел	75*	79*
LIFE	Лосартан/ ГХТЗ	Нет преимуществ	89
ACCOMPLISH	Беназеприл/ амлодипин	103*	137
NAVIGATOR	Валсартан	6787	160
ONTARGET	Телмисартан	Нет преимуществ	379
TRANSCEND	Телмисартан	91	Нет преимуществ
VALUE	Валсартан	Нет преимуществ	Нет преимуществ

*P < 0,05

NNT = число пациентов, необходимых пролечить

Adapted from Mourad J, Kobalava K. *J Hypertens*. 2011;29(Suppl A):e89.

Нолипрел – комплексные преимущества для пациента с АГ

Нолипрел – остается препаратом выбора для пациентов с СД 2 типа

	ALTITUDE ¹	ADVANCE ²
Группа пациентов	Пациенты с СД2 типа, высокий риск	Пациенты с СД2 типа, высокий риск
Лечение	Алискерен + базовая терапия	Нолипрел/форте + базовая терапия
Вывод	« Более высокая частота сердечно-сосудистых событий (смерть или инсульт) , почечных осложнений, гиперкалиемии и гипотензии в группе лечения алискереном»	«Если преимущества полученные в исследовании ADVANCE перенести хотя бы на половину больных с СД2 в мире, удалось бы спасти более миллиона жизней в течение 5 лет»

Преимущества фиксированных перед свободными комбинации

15 сравнительных (СК vs ФК) исследований (32331 больных)

Нолипрел А Би-форте

Возможности контроля АД

Нолипрел А Би-форте – результаты по АГ эффективности

10

1. Недогода С.В. Результаты программы ОПОРА, data in press
2. Кисляк О.А., Российский опыт применения Нолипрела А Би-форте, data in press
3. B.N.Mankovsky, proCardio №8 (144)/2010
4. Е.П. Свищенко, Е.А.Ярынкина, proCardio №8 (154) / 2011
5. T. Netchessova RESULTS OF NIKA STUDY, Journal of Hypertension Vol 29, e-Supplement A, June 2011, e277

Первый широкий опыт применения
полнодозовой фиксированной
комбинации периндоприла аргинина
и индапамида (**Нолипрела А Би-
форте**) в России в рамках
повседневной клинической практики

Открытая многоцентровая программа с целью подтверждения эффективности и безопасности Нолипрела А Би-форте в лечении артериальной гипертензии у пациентов с недостаточным контролем давления

ФОРТЕ ССИМО

- Мужчины и женщины старше 18 лет
- Эссенциальная АГ
- **Недостаточный контроль АД** (систолическое АД 160-200 мм.рт.ст. и диастолическое АД не более 110 мм рт.ст. на приеме у врача)
- **Прием фиксированных или свободных комбинаций ингибиторов АПФ или сартанов с диуретиком**
- Наличие показаний к терапии Нолипрелом А Би-Форте
- Стабильное течение АГ в последние 3 месяца перед включением в программу
- Стабильная антигипертензивная терапия в последние 3 месяца до включения в программу
- Согласие пациента на участие в программе

Критерии исключения

10

- Возраст менее 18 лет
- Беременность, кормление грудью
- Симптоматическая АГ
- Сахарный диабет 1 типа, декомпенсация сахарного диабета 2 типа
- Аллергические реакции, связанные с периндоприлом или другими ингибиторами АПФ
- Гиперчувствительность к сульфонидам
- Тяжелые сердечно-сосудистые заболевания (стенокардия III+IV ФК, нестабильная стенокардия, сердечная недостаточность III+IV ФК, острый инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения в течение последних 6 мес.)
- Тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин)
- Потребность в гемодиализе
- Тяжелые нарушения функции печени
- Регулярное использование нестероидных противовоспалительных препаратов, кортикостероидов (за исключением ингаляционных форм), транквилизаторов
- Гипокалиемия
- Онкологические заболевания
- Неспособность больного понять суть программы и дать обоснованное согласие на участие в ней.

Ход исследования

10

ФОРТ/ССИМО

	Визит 0	Визит 1	Визит 2	Визит 3	Визит 4
Время визита	Включение	2 недели	Месяц 1	Месяц 2	Месяц 3
Форма информированного согласия	X				
Критерии включения/ исключения	X				
Анамнез болезни	X				
Анкета Мориски-Грина (приверженность к терапии)	X				X
Оценка качества жизни (опросник SF)	X				X
Артериальное давление	X	X	X	X	X
ЧСС	X	X	X	X	X
Биохимический анализ крови	X				X
ЭКГ	X				X
Общий анализ крови (гемоглобин, СОЭ)	X				X
Общий анализ мочи, протеинурия, микроальбуминурия	X				X
Сопутствующие препараты	X	X	X	X	X
Нежелательные явления		X	X	X	X

Исходная характеристика включенных пациентов

10

- 2120 пациентов
- Пол: 34% - мужчины, 66% - женщины
- Средний возраст: 59 лет
- Длительность АГ: 11 лет
- Среднее АД: 171,1/98,5 мм.рт.ст.
- Средняя ЧСС: 76,4 уд. в мин.

Исходные показатели анализа крови

10

ФОРТ/СИМО

Показатель	Значение
Калий, ммоль/л	4,3±1,2
Глюкоза, ммоль/л	5,4±1,1
Креатинин, мкмоль/л	85,6±16,6
Общий холестерин, ммоль/л	5,8±1,1
ЛПНП, ммоль/л	3,3±1,1
ЛПВП, ммоль/л	1,4±0,5
Триглицериды, ммоль/л	1,8±0,7
Мочевая кислота, ммоль/л	289,9±84,7

Факторы риска

10

ФОРТ/СИМО

Сопутствующие состояния заболевания

10

Сопутствующая патология/состояние	n	%
Гипертрофия левого желудочка	1846	87,08
Изменение сосудов сетчатки по гипертоническому типу	1775	83,73
Постинфарктный кардиосклероз	168	7,92
Инсульт/ТИА в анамнезе	155	7,31
Протеинурия (микроальбуминурия)	271	12,78
ХСН 1-2 функционального класса	1027	48,44
ХОБЛ/бронхиальная астма	98	4,62
Заболевания суставов	543	25,61
Подагра	44	2,08

Сопутствующие состояния и заболевания

10

ФОРТ/ССИМО

Исходная терапия у пациентов включенных в исследование

10

Препарат	n	%
Диуретики	1779	83,92
Бета-блокаторы	1055	49,76
Ингибиторы АПФ	1656	78,11
Антагонисты кальция	630	29,72
Блокаторы рецепторов ангиотензина II	387	18,25
Агонисты I ₁ -имидазолиновых рецепторов	43	2,03

Исходная терапия у пациентов включенных в исследование

10

Исходная терапия у пациентов включенных в исследование

10

ФОРТ/СИМД

- Свободные комбинации иРААС+Д
- Фиксированные комбинации иРААС+Д

Приверженность к исходной терапии (анкета Мориски-Грина)

10

ФОРТ/СИМД

4 балла – высокая приверженность к лечению
0 баллов – очень низкая приверженность к лечению

Причины преждевременного выбывания пациентов

10

Причины	n	% от общего числа пациентов	% от числа выбывших
Утрата контакта с пациентом	41	1,93	27,15
Отказ пациента	29	1,37	19,21
Нежелательные явления	27	1,27	17,88
Причина не указана	25	1,18	16,56
Серьезные нежелательные явления	12	0,57	7,95
Неэффективность терапии	8	0,38	5,30
Несоблюдение режима приема препарата	5	0,24	3,31
Решение врача	2	0,09	1,32
Отсутствие препарата в аптеке	1	0,05	0,66
Резкое снижение артериального давления	1	0,05	0,66

Основные результаты

ФОРТ ССИМО

The logo features the words 'ФОРТ' and 'ССИМО' in a bold, metallic, 3D-style font. A stylized lightning bolt graphic is positioned between the two words, pointing upwards and to the right.

Нолипрел А Би-форте - мощное снижения САД при переводе с комбинированной терапии

10

ФОРТ/СИМО

Динамика снижения ДАД на Нолипреле А Би-форте

10

ФОРТСИМД

8 из 10 пациентов – достигли целевого АД при переводе на Нолипрел А Би-форте

10

Эффективность при переводе на Нолипрел А Би-форте с комбинаций иАПФ + диуретик

10

ФОРТ/СИМО

Достижение целевого АД – 78%

Эффективность при переводе на Нолипрел А Би-форте с комбинаций БРА + диуретик

10

ФОРТ/СИМО

Достижение целевого АД – 76%

Эффективность при переводе на Нолипрел А Би-форте с комбинаций ГХТЗ + иАПФ/БРА

10

Достижение целевого АД – 86%

Эффективность при переводе на Нолипрел А Би-форте с комбинаций индапамида + иАПФ/БРА

10

ФОРТ/СИМО

Достижение целевого АД – 81%

Эффективность перевода на Нолипрел А Би-форте у пациентов, не принимавших при включении диуретики

10

ФОРТ/СИМД

Достижение целевого АД – 86%

Перевод на Нолипрел А Би-форте одинаково эффективен как в группе исходно высокой, так и низкой приверженностью

10

ФОРТ/СИМО

Достижение целевого АД:

В группе с исходной высокой приверженностью – 84%

В группе с исходной низкой приверженностью – 83%

Эффективность Нолипрела А Би-форте и в комбинации с другими антигипертензивными препаратами

10

ФОРТ/СИМО

Достижение целевого АД:

В группе Нолипрела А Би-форте – 90%

В группе Нолипрела А Би-форте + другая терапия – 81%

Сравнение эффективности терапии в группах исходно получающих свободные и фиксированные комбинации иАПФ/БРА + диуретик

10

ФОРТ/СИМО

Достижение целевого АД:
В группе исходно на ФК – 84%
В группе исходно на СК – 71%

Динамика сопутствующей терапии. Антагонисты кальция – стабильный % назначений.

10

ФОРТ/СИМО

Динамика сопутствующей терапии. Бета-адреноблокаторы – стабильный % назначений.

10

ФОРТ/СИМД

Влияние сопутствующей терапии

10

ФОРТИССИМО

Результаты по снижению и нормализации АД в программе ФОРТИССИМО были обусловлены именно переходом на **полнодозовую комбинацию Нолипрел А Би-форте** и не связаны с влиянием сопутствующей терапии

- Нежелательные явления (НЯ) наблюдались только у 4,01% пациентов
- Серьезные нежелательные явления (СНЯ) отмечены у 0,57% пациентов

Влияние терапии Нолипрелом А Би-форте на показатели анализа крови

10

	В0	В4	P
Гемоглобин, г/л	138,5±12,3	136,9±11,7	P<0,00001*
СОЭ, мм/ч	11,3±5,8	10,0±4,8	P<0,00001*
Калий, ммоль/л	4,34±1,29	4,33±1,35	0,86
Глюкоза, ммоль/л	5,35±1,07	5,14±0,91	P<0,00001*
Креатинин, мкмоль/л	85,6±16,1	83,6±20,4	P<0,00001*
Общий холестерин, ммоль/л	5,84±1,09	5,18±0,84	P<0,00001*
ЛПНП, ммоль/л	3,28±1,07	2,82±0,87	P<0,00001*
ЛПВП, ммоль/л	1,36±0,52	1,41±0,48	P=0,00039*
Триглицериды, ммоль/л	1,75±0,69	1,56±0,55	P<0,00001*
Мочевая кислота, ммоль/л	287,6±83,1	278,0±76,3	P<0,00001*

* различия являются статистически значимыми

Влияние терапии Нолипрелом А Би-форте на качество жизни (опросник SF-36)

10

Физический компонент здоровья

Психический компонент здоровья

Влияние Нолипрела А Би-форте на приверженность к лечению

10

ФОРТСИМД

4 балла – высокая приверженность к лечению
0 баллов – очень низкая приверженность к лечению

Оценка врачом результатов лечения Нолипрелом А Би-форте

10

ФОРТБИО

Нолипрел А Би-форте

10

- ✓ единственная **полнодозовая комбинация** иРААС и диуретика
- ✓ непревзойденные преимущества по **снижению смертности**
- ✓ комплексная **органопroteкция** (сердце, почки, мозг)
- ✓ **мощное антигипертензивное действие**, вместе с метаболической нейтральностью
- ✓ делают **Нолипрел А Би-форте** препаратом выбора для пациентов с недостаточным контролем АД на других