



Генетика популяций

**Статистический
метод генетики**

Закон Харди - Вайнберга

ЦЕЛИ УРОКА

- Познакомиться с
 - статистическим методом генетики
 - законом Харди-Вайнберга
- Научиться решать задачи по формуле Харди-Вайнберга

1908 г закон Харди-Вайнберга

В идеальной популяции частоты аллельных генов и генотипов остаются постоянными из поколения поколение.



Английский математик
Харди Годфри Харолд



Немецкий врач
Вильгельм Вайнберг

«Относительные частоты генов в популяции не изменяются из поколения в поколение во времени при следующих условиях:

1. Популяция должна быть велика;
2. Отсутствует давление отбора на данные признаки;
3. Отсутствуют мутации этих генов;
4. В популяции особи свободно скрещиваются;
5. Нет миграции из соседних популяций».

Идеальная популяция

Закон Харди-Вайнберга

Частота генов (генотипов) в популяции есть величина постоянная и не изменяется из поколения в поколение.

Равновесие генных частот:

$$p + q = 1,$$
$$p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

где **p** – частота доминантного аллеля (A);

q - частота рецессивных аллеля (a);

p² - частота доминантных гомозигот (AA);

2pq - частота гетерозигот (Aa);

q² - частота рецессивных гомозигот (aa).

P: AA x aa

G: A (p) : a (q)

F₁: Aa

$$p + q = 1$$

сумма частот аллелей в F₁ = 1

P: Aa x Aa

G: A (p), a(q) : A (p), a (q)

F₂: AA, Aa, Aa, aa

$$pp + pq + pq + qq = 1$$

$$p^2 + 2pq + q^2 = 1 \quad (p+q)^2=1$$

сумма частот генотипов в F₂ = 1

**1. В популяции человека количество индивидуумов с карим цветом глаз составляет 51%, а с голубым – 49%.
Определите процент доминантных гомозигот в данной популяции.**

2. Альбинизм наследуется как рецессивный аутосомный признак. Заболевание встречается с частотой 1:20000. Вычислите процентное количество гетерозигот в популяции.

3. Альбинизм у ржи наследуется как аутосомный рецессивный признак. На обследовании участка из 84000 растений обнаружено 210 альбинизма. Определите частоту генов альбинизма у ржи.