

**ЛПЗ**

**Фиксация собак и кошек**

# Характеристика методов диагностики незаразных болезней у мелких животных

- **Общие методы исследования.**
- 1. Осмотр,
- 2. Пальпация,
- 3. Перкуссия,
- 4. Аускультация,
- 5. Термометрия.
- **Специальные методы исследования:**  
(дополнительные)
- 1. ЭКГ,
- 2. ФКГ,
- 3. БКГ,
- 4. ВКГ,
- 5. УЗИ,
- 6. лапароскопия,
- 7. биопсия,
- 8. рентгенография,
- 9. рентгеноскопия,
- 10. эндоскопия,

## Способы фиксации собак.

Прежде чем приступить к обследованию животного, темперамент которого неизвестен, необходимо принять меры предосторожности в отношении реакции животного, используя при этом специальные приемы удержания. Это удастся несколько легче, если врач ведет себя спокойно, разговаривает уверенным голосом. Собаки обычно становятся доступны после спокойного разговора с ними. Тогда протягивают руку к животному, спокойно поглаживают его по спине, затем по шее в направлении к голове. Если это не вызывает агрессивного ответа, то врач удерживает собаку за шею и голову руками (рис.1). В это время ассистент завязывает морду тесьмой, образуя петлю (рис.2). При этом, чтобы избежать ослабления петли и возможности разжать челюсти, петлю обязательно завязывают узлом сначала сверху на переносице, затем внизу под нижней челюстью и уже потом за ушами (рис.3). Нельзя полагаться на заверения владельца, что собака не кусается. Собака в клинике ведет себя спокойнее и лучше воспринимает команды, если на нее надет ошейник. Ошейник собаке служит сигналом четкого выполнения команд.

Рис.3. Правильный способ завязывания бечевки




Рис. 4. Фиксация собаки для поднятия ее на стол

На стол для обследования собаку поднимают, захватив одной рукой за шкуру, а другой — под живот (рис.4). Маленьких собак второй рукой обычно подхватывают под грудину. Нельзя поднимать их за передние лапы, так как при этом возможно растяжение мышц плеча.

Если собака очень агрессивна, на шею ее, кроме ошейника, надевают веревочную петлю-удавку, с помощью которой притягивают к решетке клетки или батарее отопления. В это время ассистент берет собаку за хвост и тянет с силой в противоположную натяжению веревки сторону. Теперь голова и задняя часть тела собаки фиксированы и можно спокойно надеть стягивающую петлю на морду (рис. 5).


## Методы фиксации собак



Рис.1. Фиксация челюстей собаки руками



Рис.2. Фиксация головы собак бечевкой






Рис. 5. Фиксация  
агрессивной собаки




Рис. 6. Способ повала собаки



Рис. 7. Фиксация собаки руками  
в боковом положении на столе



Для выполнения струйных внутривенных вливаний собаку обычно укладывают в боковое положение на столе. Безболезненное укладывание животного на бок выполняется в следующей последовательности: владелец обеими руками из-под живота захватывает конечности противоположной стороны животного и тянет их на себя, заваливая собаку. Ассистент в этот момент придерживает голову руками, чтобы собака не ударилась ею о стол (рис. 6). Затем ассистент обходит собаку со стороны спины, придавливает шею и живот, локтями рук, захватывая кистями нижележащие конечности, и так удерживает животное (рис.7) Если планируется длительное внутривенное капельное вливание жидкости, то собаку привязывают к столу бечевками.

При невозможности выполнения каких-либо сложных манипуляций из-за чрезмерной подвижности животного (например, чау-чау) или при необходимости выполнить сложную болезненную процедуру целесообразно вначале ввести седативное (успокаивающее) средство, например

2 %-ный раствор рометара в дозе 0,1 мл/кг.

## Способы фиксации кошек

Цель фиксации - укрепление всего тела кошки или его отдельных частей в определенном положении для исключения травм у человека и пациента при выполнении ветеринарной помощи.

При простых процедурах кошку берут одной рукой за кожу на шее у головы, а другой за кожу в области поясницы и прижимают к столу. В таком положении кошка может найти возможность поцарапать когтями, поэтому при сложных манипуляциях ее фиксируют два человека. Один человек держит кошку за загривок и за обе грудные конечности, а другой—за тазовые конечности. Кошек можно завернуть в полотенце или платок, оставив открытой лишь ту часть тела, которая нужна для процедуры. Если процедуру проводят на голове, то тело кошки помещают в узкий мешок или рукав ватной телогрейки, а голову оставляют снаружи. Для фиксации головы применяют также специальный ящик с выдвижной крышкой и вырезом в торцевой стенке для шеи.

Очень беспокойным кошкам целесообразно завязывать челюсти бинтом. Владелец сжимает руками челюсти животного. В это время другой человек, сзади и несколько сбоку набрасывает на челюсти петлю с обычным узлом из вдвое или втрое сложенного марлевого бинта. Узел должен быть внизу. Концы бинта прочно затягивают и завязывают на затылке двойным узлом. Для