



**АНОМАЛИИ
МУЖСКОЙ
ПОЛОВОЙ
СИСТЕМЫ**

АНОРХИЗМ

- Аномалия развития, проявляющаяся полным отсутствием яичек; сочетается с отсутствием придатков яичек, семявыносящих протоков, предстательной железы. Мошонка и половой член недоразвиты. Тип телосложения евнухоидный.



Крипторхизм



- Наиболее часто встречающийся порок развития яичек, при котором одно или оба яичка во внутриутробном периоде не опустились в мошонку, а задержались на месте нижнего сегмента первичной почки, в брюшной полости или паховом канале.

ЭКТОПИЯ ЯИЧКА

(ectopia testis perinealis)

- Расположение его на передней брюшной стенке спереди от апоневроза наружной косой мышцы живота, на бедре или промежности, в области лобка или корня полового члена.



Гипоплазия яичка



- Его врожденное недоразвитие. Пальпируют семенные железы размером в несколько миллиметров. Клинически, как и при анорхизме, отмечаются врожденное отсутствие обоих яичек,

Эктопия полового члена

- Крайне редкая аномалия полового члена, который определяется позади мошонки и имеет небольшой размер.



Удвоенный половой член

- Полное или частичное удвоение с наличием двух головок.

Гипоспадия

- Аномалия анатомического строения пениса у мальчика, при которой отверстие мочеиспускательного канала может как находиться на своём нормальном месте («гипоспадия без гипоспадии»), так и быть смещено вниз, вплоть до нахождения вообще не на головке, а снизу на теле члена, на мошонке или в промежности.



СПАСИБО



за внимание!!!