OTPAA HEIOAHO3Y5bIE (EDENTATA)

Семейство Муравьеды

Зубов нет совсем. Питаются термитами





Большой **муравье**д

Малый муравьед



Семейство ЛЕНИВЦЫ



Двупалый **ленивец**

Трехпалый ленивец



- Броненосцы распространены в Южной и Центральной Америке, только **девятипоясный броненосец** проникает на юг Северной Америки. Около 20 видов броненосцев, объединенных в 9 родов, обычно делят на 5 групп

(подсемейств, или триб).




Девятипоясный **броненосец**



Гигантский **броненосец**



Бразильский **броненосец**



Отряд ЯЩЕРЫ ИЛИ ПАНГОЛИНЫ (PHOLIDOTA)

Ящеры распространены в Юго-Восточной Азии, Экваториальной и Южной Африке

В этот отряд объединены своеобразные млекопитающие, напоминающие огромную еловую шишку благодаря серокоричневым роговым чешуям, которые, налегая друг на друга, покрывают тело животного.

Нижняя поверхность тела и лап, а также морда покрыты волосами. Передние лапы с сильными роющими когтями. Морда вытянута, рот сужен, челюсти беззубые, язык длинный (до 40 см), очень большие слюнные железы выделяют клейкий секрет. Питается почти исключительно муравьями и термитами. Как показали недавние исследования, слюна ящеров обладает привлекательным для насекомых медовым запахом; ватка, смоченная этой слюной, особенно привлекает термитов и муравьев. Желудок, в котором измельчается пища, выстлан ороговевшим эпителием, и в его полость вдается особая складка, вооруженная роговыми зубами. Животные заглатывают камешки, что способствует измельчению пищи







