



Лососеподібні риби

Райдучка форелі




- ◆ Тіло риби видовжене, з боків сплюснуте, вкрите дрібною лускою, спина товстувата. Спинний плавець міститься перед уявною вертикаллю від початку черевних плавців. Зовнішній край спинного плавця опуклий, анального — виїмчастий, зрідка прямий. Хвостовий плавець у риб до дворічного віку з невеликою виїмкою, яка зникає у старіших риб

Лосось



. Колір лосося схильний до значних змін, дивлячись по місцевості, а головне віком та пори року, але взагалі спина в нього блакитнувато-сіра з нечисленними чорнуватими цятками, черево і боки сріблясто-білі, плавники більш-менш сірі, спинний і хвостовий, темніше інших

Кумжа



- ◆ Кумжа, або кемжа - риба родини лососевих. Кумжа є морським варіантом озерної форелі, тому її часто називають морською фореллю. Як і лосось, це - прохідна риба, мігруюча з океану в прісноводні водойми для нересту. Коли доросла кумжа в перший раз входить з моря в річку для нересту, вона має світло-сріблясту забарвлення з ледь помітними цятками. Але чим довше вона перебуває в прісній воді, тим стає темніше, і до кінця сезону більшість риб набуває майже чорний колір.

Річкова форель

- ◆ Річкова форель — риба, що відноситься до сімейства лососевих. У народі її ще називають струмковою або озерною. Таку назву вона отримала у зв'язку зі своїм середовищем проживання. Ця форель має дуже смачне м'ясо, яке оціняють навіть справжні гурмани.

Вид річкової форелі

- ♦ Практично по всьому тілу річкової форелі є червоні і чорні цятки. Всі червоні цятки мають світлий обідок. Риба має дуже контрастне забарвлення. По всьому тілу вона змінюється від світлої до темної.
- ♦ У ротовій порожнині розташовано 2 ряди зубів, які залишаються на все життя. На бічній лінії розташовано від 115 до 132 лусочок, залежно від розмірів особини. У середньому, риба виростає до 70-и сантиметрів і набирає у вазі до 5-и кілограмів. Однак, деякі підвиди виростають більше 116-ти сантиметрів і мають вагу більше 23-х кілограмів.



Дякую за увагу

