

Уход за садом



Главный принцип садовода – знать болезни и вредителей садовых насаждений прямо в лицо и действовать на опережение.

Ведь сад – живой организм. Если плохо поухаживать за деревьями осенью, то весной, наверняка, получите погрызенную зайцами кору или морозобоины, а в сентябре и сладеньких яблочек не досчитаетесь.
Все взаимосвязано.



Недостаточный или
неправильный
осенний уход за
деревьями



Плохой урожай
следующей осенью



Зимой появляются
морозобоины,
погрызенная кора,
дерево ослабляется



На слабом
дереве весной
появляется мало
завязей





И как часто бывает – не сделали вовремя профилактику – потратили уйму сил на лечение. И хорошо еще, если оно помогло. А ведь иногда приходится и выкорчевывать дерево, которое не сумели спасти.

А еще бывает, что Вы стараетесь, ухаживаете за садом, а урожая - совсем мало. Несправедливо, правда?

Пригрело весеннее солнышко, чуть
послышался отдаленный запах
весны, и потянуло вас в сад. А для
будущего урожая сделать там
МОЖНО ВОТ ЧТО:



В конце февраля

- Подправить обвязку молодых деревьев
- Усилить защиту штамбов от мышей
- Освободить ветви от тяжелой наледи и мокрого снега
- Обязательно притоптать снег вокруг деревьев в конце зимы



В марте

- Уберечь штамбы от солнечных ожогов
- Побелить старые и молодые деревья
- Провести санитарную обрезку



Апрель - Май

- Лечить морозобоины и другие раны коры
- «Пломбировать» дупла в стволе, чтобы дерево жило долго
- Бороться с мхами и лишайниками



При весенней посадке ягодных кустарников почву перекапывают на глубину до 40 см (подзолистые почвы - на 30 см). Перед перекопкой участка вносят удобрения. Весной почву рыхлят и разравнивают граблями. После этого участок разбивают под посадку.

На увлажненных участках ягодники высаживают на грядах и холмиках.

Подготовка саженцев к посадке

Землянику высаживают хорошо развитой рассадой, у которой корни перед посадкой несколько укорачивают (обрезают). У саженцев смородины и крыжовника также обрезают корни, но не короче 18—20 см. Ветки саженцев (ягодных кустарников) обрезают на высоте 12—15 см для лучшего их ветвления в дальнейшем. Ни в коем случае не оставляют саженцы не обрезанными после посадки. Это важнейшее условие для получения мощных хорошо разветвленных кустов. Побеги саженцев малины укорачивают на высоте 15—20 см.

Основные условия посадки.

Почка («сердечко») саженцев земляники должна находиться на уровне поверхности почвы. Заглубление почки или оставление ее оголенной, не закрытой почвой, приводит к гибели растений. Саженцы смородины и крыжовника сажают

несколько глубже для лучшего корнеобразования. Корни саженцев должны быть хорошо расправлены и равномерно распределены в почве, не загнуты вверх




Рис. 21. Посадка земляники

Посадка земляники: неправильная: а — корни при посадке загнуты вверх; б — корни не засыпаны почвой, оголены; в - почка саженца заглублена в почву. Правильная: г — почка расположена на уровне поверхности почвы



После посадки растения поливают: одно ведро воды на 20 саженцев земляники и по половине ведра под каждый куст ягодных кустарников. После полива почву вокруг кустов притеняют перегноем, торфом.

Уход за посаженной земляникой

После посадки молодые растения до момента полной приживаемости особенно нуждаются в поливе и мульчировании почвы. Почву систематически рыхлят в междурядьях и рядах, не допуская сорняков. Когда наступят устойчивые заморозки, землянику покрывают слоем навоза, перегноя, торфа для предупреждения вымерзания растений. Кроме того, для этой цели в зимнее время на участке земляники накапливают снег. Не следует запаздывать со снятием укрытия весной. Эту работу проводят возможно раньше. В противном случае возможны загнивание и гибель растений.

Уход за малиной

Ежегодно осенью или рано весной на участке малины вырезают отплодоносившие побеги; однолетние приросты слегка укорачивают, а слабо развитые — удаляют. Оставшиеся побеги подвязывают на шпалеры



В течение сезона почву несколько раз рыхлят, пропалывают сорняки, вносят удобрения, ведут борьбу с вредителями. Рано весной и осенью почву в рядах и междурядьях перекапывают.

Уход за смородиной и крыжовником

Почву на участке в течение лета несколько раз **РЫХЛЯТ**, а вокруг кустов мульчируют навозом, перегноем или торфом. Весной и осенью почву вокруг кустов перекапывают. Перед перекопкой почвы вносят удобрения.

Весной до набухания почек или осенью после листопада кусты смородины и крыжовника прореживают, удаляя сухие, больные и поломанные ветки, а также ветки, загущающие куст и устаревшие.

Урожай смородины и крыжовника сосредоточен в основном на однолетней и двухлетней древесине.

Старые (6—7-летние) ветви плодоносят слабо, а поэтому их вырезают, тем самым омолаживая куст.

A pair of pruning shears is shown cutting through a dark tree branch. The shears have a blue handle on the left and a brown handle on the right. The background is filled with vibrant green leaves, suggesting a spring setting. The text is overlaid on the image in a stylized, bold font.

**Весенняя обрезка
деревьев**

Одно из первых весенних мероприятий в саду – обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников.





Все срезы надо сразу же замазать садовым варом или другой защитной замазкой, например, приготовленной из отработанного машинного масла (70%), парафина (15%) и канифоли (15%). Замазку можно приготовить и из нигрола, смешанного с просеянной древесной золой в соотношении 7:3.

Масляную краску для этих целей можно использовать, только если вы уверены, что она изготовлена на натуральной олифе, так как синтетические растворители убивают ткани растения.

При обрезке удаляется и небольшая часть вредителей, зимующих на коре побегов, под корой или в ее трещинах.

Главная задача обрезки деревьев и кустов — правильно сформировать выбранный тип (форму) кроны, не допустить ее загущения, удалить поврежденные, засохшие, а также растущие внутрь кроны, сильно свисающие, переплетающиеся ветви.

В марте — самые оптимальные сроки обрезки косточковых культур. Лучше всего проводить обрезку ранним утром, пока снег еще достаточно плотный и по нему можно ходить. После обрезки удаленные ветки сжигают. В зависимости от породы, возраста, состояния дерева используют разные виды обрезки. Формирование деревьев проводится в первые 4—6 лет после посадки. Независимо от сроков посадки, деревья обрезают только весной, формируя чаще всего округлую (разреженно-ярусную) крону.






Обрезка вишни

Удаляют ветви загущающие крону, больные, обломанные, растущие внутрь кроны, растущие вертикально вниз или вверх, поросль и ветки ниже первых скелетных ветвей. Высокие ветви укорачивают на нужную длину, переводя на более молодую древесину.





Первый раз плодовое дерево обрезают в однолетнем возрасте ранней весной, не менее чем за 3-4 недели до начала вегетации. Обрезку начинают с укорачивания центрального проводника.




Рис. 27. Обрезка однолетних веток: 1, 2, 3 – неправильная; 4, 5 – правильная




Рис 28. Отпиливание крупной ветви: 1 – подпил снизу на $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ толщины и 20-30 см от основания ветви; 2 – отпиливание ветви сверху с оставлением пенька; 3 – место и направление окончательного среза




Рис. 31. Формирование обрастающих веток (черточками показано место подрезки в зависимости от характера ветвления)




Рис. 32. Последовательность формирования разреженно-ярусной кроны (на 2-4-й год после посадки): слева — до обрезки, справа — после обрезки




Рис. 33. Схемы округлых крон: а — разреженно-ярусная; б — улучшенная вазообразная; в — контур правильно сформированной ветви (вид сверху)




Малина и ежевика

Двойная обрезка малины



- а - в начале июня у молодого побега прищипывают верхушку на 10-15 см;
б - на следующий год весной обрезают верхушки боковых побегов на 10-15 см;
в - просыпаются спящие почки по всем боковым побегам;
г - образование плодушек из спящих почек на боковых побегах.





Ранней весной обрежьте стебель на сильную, неповрежденную почку над проволокой. Мульчирование.

