

Красная книга Тверской области. Рыбы



Стерлядь - *Acipenser ruthenus*

- От других видов рода *Acipenser* хорошо отличается большим числом боковых жучек (число их колеблется от 56 до 71). Спинных жучек — 11-18, брюшных — 10-20. В спинном плавнике 32-49 лучей, в анальном — 16-34. Усики бахромчатые. Рот небольшой, нижний. Нижняя губа прервана.
- Окраска спины от темно-серой до серовато-коричневой, брюхо белое. Самый мелкий представитель рода. Максимальные размеры равны 1,25 м и масса 16 кг, однако, обычно не более 1 м и масса до 6-6,5 кг. Предельная продолжительность жизни — 26-27 лет. Возрастной состав уловов колеблется от 4 до 10-11 лет.

Стерлядь - *Acipenser ruthenus*


- Питание. Питается водными личинками насекомых, мелкими моллюсками, икрой других рыб




www.ecosystema.ru

Кумжа - *Salmo trutta*

- Предпочитает ручьи и небольшие речки с быстрым течением, холодной водой, песчаным или галечным дном. Обычные размеры взрослых особей: длина 25-35 см, масса 200-500 г, изредка встречаются экземпляры массой до 2 кг и более. Самцы созревают на 3, самки на 4 году



Ряпушка европейская



брюхо белое, спинной и
хвостовой плавники серые,
остальные белые или
бесцветные

Сиг волховский

- Сиголов волховский сиг (лат.

Coregonus
рыб объ
сигов, с
обитает
Ладожс
см; вес
строите
находит
связи с
к нерес
поддер
разведе
рыбзав



- Волховский сиг изображен на монете Банка России

Хариус европейский

- Хариусы предпочитают холодную, чистую воду в реках и ручьях, реже в озёрах, а также обитает в Балтийском море. Хариусы — всеядные рыбы, которые питаются растениями, ракообразными, насекомыми, пауками, моллюсками, зоопланктоном и более мелкими рыбами, такими как гольяны и жёлтые окуни. Европейские хариусы также могут охотиться на более крупных рыб, таких как дунайские лососи.

