

---

**«Скорость  
химических реакций.  
Факторы, влияющие  
на скорость  
химической  
реакции»**

---

# **Скорость химических реакций -**

---



Это изменение концентрации одного из реагирующих или одного из продуктов реакции в единицу времени.

---



# Химические реакции

---

**Гомогенные** -  
реагирующие вещества  
и продукты реакции  
находятся в одной фазе



**Гетерогенные** –  
реагирующие  
вещества и продукты  
реакции находятся в  
разных фазах



Скорость реакции определяется изменением количества вещества в единицу времени.

В единице $V$ (для гомогенной)	На единице поверхности соприкосновения веществ $S$ (для гетерогенной)
$v_{\text{гомоген}} = \pm \frac{C_2 - C_1}{t_2 - t_1} = \pm \frac{\Delta C}{\Delta t} \left[ \frac{\text{моль}}{\text{с} \cdot \text{л}} \right]$	$v_{\text{гетероген}} = \frac{\Delta n}{\Delta t \cdot S} \left[ \frac{\text{моль}}{\text{мин} \cdot \text{см}^2} \right]$
$\frac{\Delta n}{V} = \Delta C$ изменение молярной концентрации	$\Delta n$ - изменение количества вещества (моль); $\Delta t$ - интервал времени (с, мин)

## Задача на применение знаний по «Скорости химических реакций»

---

- Химическая реакция протекает в растворе, согласно уравнению:  $A + B = C$ . Исходные концентрации: вещества А – 0,80 моль/л, вещества В – 1,00 моль/л. Через 20 минут концентрация вещества А снизилась до 0,74 моль/л. Определите:
    - среднюю скорость реакции за этот промежуток времени;
    - концентрацию вещества В через 20 мин.
-

# Самопроверка.

Дано:

$$C(A)_1 = 0,80 \text{ моль/л}$$

$$C(B)_1 = 1,00 \text{ моль/л}$$

$$C(A)_2 = 0,74 \text{ моль/л}$$

$$\Delta t = 20 \text{ мин}$$

Найти.

а)  $v_{\text{гомоген}} = ?$


б)  $C(B)_2 = ?$

Решение:

а) определение средней скорости реакции в растворе производится по формуле:

$$v_{\text{гомоген}} = \frac{\Delta C}{\Delta t} = \frac{0,80 - 0,74}{20} = \frac{0,06}{20} = 0,003 \frac{\text{моль}}{\text{л} \cdot \text{мин}}$$

б) определение количеств реагирующих веществ:



Следовательно,  $C(B)_2 = C(B)_1 - \Delta C = 1,00 - 0,06 = 0,94 \text{ моль/л}$

Ответ:  $v_{\text{гомоген.}} = 0,003 \text{ моль/л}$      $C(B)_2 = 0,94 \text{ моль/л}$

## Задача на применение знаний по «Скорости химических реакций»

---

- В некоторый момент времени концентрация хлора  $\text{Cl}_2$  в сосуде, в котором протекала реакция  $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 = 2\text{HCl}$ , была равна 0,06 моль/л. Через 5 сек концентрация хлора составила 0,02 моль/л. Чему равна средняя скорость данной реакции в указанный промежуток времени.
-

# Самопроверка.

Дано:

$$C(\text{Cl}_2)_1 = 0,06 \text{ моль/л}$$

$$C(\text{Cl}_2)_2 = 0,02 \text{ моль/л}$$

$$\Delta t = 5 \text{ сек}$$

Найти.

$$v_{\text{гомоген}} = ?$$

Решение:

определение средней скорости реакции в растворе производится по формуле:

$$v_{\text{гомоген}} = \frac{\Delta C}{\Delta t} = \frac{0,06 - 0,02}{5} = \frac{0,04}{5} = 0,008 \frac{\text{моль}}{\text{л} \cdot \text{сек}}$$

Ответ:  $v_{\text{гомоген.}} = 0,008 \text{ моль/л}$



# Факторы, влияющие на скорость химической реакции

---

- природа реагирующих веществ;
  - температура;
  - концентрация реагирующих веществ;
  - действие катализаторов;
  - поверхность соприкосновения реагирующих веществ (в гетерогенных реакциях).
-

## *Теория столкновений.*

Основная идея её такова: реакции происходят при столкновении частиц реагентов, которые обладают определённой энергией.

---

Выводы:

- Чем больше частиц реагентов, чем ближе они друг к другу, тем больше шансов у них столкнуться и прореагировать.
- К реакции приводят лишь *эффективные соударения*, т.е. такие при которых разрушаются или ослабляются «старые связи» и поэтому могут образоваться «новые». Но для этого частицы должны обладать достаточной энергией.

*Минимальный избыток энергии (над средней энергией частиц в системе), необходимый для эффективного соударения частиц в системе), необходимый для эффективного соударения частиц реагентов, называется **энергией активации  $E_a$** .*

---

# 1. Природа реагирующих веществ.

---

- Под природой реагирующих веществ понимают их состав, строение, взаимное влияние атомов в неорганических и органических веществах.
  - Величина энергии активации веществ – это фактор, посредством которого сказывается влияние природы реагирующих веществ на скорость реакции.
-

# Задание на применение знаний

---

- Объясните разную скорость взаимодействия цинка и магния с уксусной кислотой; цинка с соляной и уксусной кислотой.
  - Напишите соответствующие реакции.
-

## 2. Температура

- При увеличении температуры на каждые  $10^\circ \text{C}$  общее число столкновений увеличивается только на  $\sim 1,6\%$ , а скорость реакции увеличивается в 2-4 раза (на 100-300%).
- Число, показывающее, во сколько раз увеличивается скорость реакции при повышении температуры на  $10^\circ \text{C}$ , называют **температурным коэффициентом**.
- Правило Вант-Гоффа математически выражается следующей формулой:

$$v_2 = v_1 \cdot \gamma^{\frac{t_2 - t_1}{10}}$$

где  $v_2$  – скорость реакции при температуре  $t_2$ ,  
 $v_1$  – скорость реакции при температуре  $t_1$ ,  
 $\gamma$  – температурный коэффициент.

# Задача на применение знаний:

---

- Определите, как изменится скорость некоторой реакции:
  - а) при повышении температуры от  $10^{\circ}$  до  $50^{\circ}$  С;
  - б) при понижении температуры от  $10^{\circ}$  –  $0^{\circ}$  С.

Температурный коэффициент реакции равен 3.

---

# Самопроверка

---

а) подставить данные задачи в формулу:

$$v_{\text{при } 50^{\circ} \text{C}} = v_{\text{при } 10^{\circ} \text{C}} \cdot 3^{\frac{50^{\circ} \text{C} - 10^{\circ} \text{C}}{10}} = v_{\text{при } 10^{\circ} \text{C}} \cdot 3^4;$$

$$v_{\text{при } 50^{\circ} \text{C}} = 81 \cdot v_{\text{при } 10^{\circ} \text{C}}.$$

скорость реакции увеличится в 81 раз.

б)

$$v_{\text{при } 0^{\circ} \text{C}} = v_{\text{при } 10^{\circ} \text{C}} \cdot 3^{\frac{0^{\circ} - 10^{\circ}}{10}} = v_{\text{при } 10^{\circ} \text{C}} \cdot 3^{-1} = \frac{v_{\text{при } 10^{\circ} \text{C}}}{3}.$$

Скорость реакции уменьшится в 3 раза.

---

# 3. Концентрации реагирующих веществ.

---

- На основе большого экспериментального материала в 1867 г. норвежские учёные К. Гульдберг, и П Вааге и независимо от них в 1865 г. русский учёный Н.И. Бекетов сформулировали основной закон химической кинетики, устанавливающий зависимость скорости реакции от концентраций реагирующих веществ:  
**скорость химической реакции пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ, взятых в степенях равных их коэффициентам в уравнении реакции.**  
***Этот закон ещё называют законом действующих масс.***
-



# Математическое выражение закона действующих масс.

---

- По закону действующих масс скорость реакции, уравнение которой  $A+B=C$  может быть вычислена по формуле:

$$v = k \cdot C_A \cdot C_B,$$

а скорость реакции, уравнение которой  $A+2B=D$ , может быть вычислена по формуле:

$$v = k \cdot C_A \cdot C_B^2.$$




В этих формулах:  $C_A$  и  $C_B$  – концентрации веществ А и В (моль/л),  $k$  – коэффициенты пропорциональности, называемые **константами скоростей реакции**. Эти формулы также называют **кинетическими уравнениями**.

---

# Задача на применение знаний:

---

- Составьте кинетические уравнения для следующих реакций:



# Задача на применение знаний:

---

- Как изменится скорость реакции, имеющей кинетическое уравнение
- $$v = kC_A^2 C_B, \text{ если:}$$
- концентрацию вещества А увеличить в 3 раза
  - концентрацию веществ А и В увеличить в 2 раза
-

# Самопроверка.

---

- *Решение.* Подставим соответствующие данные в кинетическое уравнение, сравним скорости реакций.

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{k(3C_A)^2 C_B}{k(C_A)^2 C_B} = \frac{9kC_A^2 C_B}{kC_A^2 C_B} = 9 \Rightarrow$$

скорость реакции увеличится в 9 раз.

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{k(2C_A)^2 (2C_B)}{kC_A^2 C_B} = \frac{8kC_A^2 C_B}{kC_A^2 C_B} = 8 \Rightarrow$$

---

# 4. Действие катализатора

---

## Обсуждение вопросов:

- 1. Что такое катализатор и каталитические реакции?
  - 2. Приведите примеры известных вам каталитических реакций из органической и неорганической химии. Укажите названия веществ – катализаторов.
  - 3. Выскажите предположение о механизме действия катализаторов (на основе теории столкновений).
  - 4. Каково значение каталитических реакций?
-

# 5. Поверхность соприкосновения реагирующих веществ.

---

- Скорость реакции увеличивается благодаря:
    - увеличению площади поверхности соприкосновения реагентов (измельчение);
    - повышению реакционной способности частиц на поверхности образующихся при измельчении микрокристаллов;
    - непрерывному подводу реагентов и хорошему отводу продуктов с поверхности, где идёт реакция.
  - Фактор связан с гетерогенными реакциями, которые протекают на поверхности соприкосновения реагирующих веществ: газ - твердое вещество, газ - жидкость, жидкость - твердое вещество, жидкость - другая жидкость, твердое вещество - другое твердое вещество, при условии, что они не растворимы друг в друге.
  - Приведите примеры гетерогенных реакций.
-

# Домашнее задание

---

п. 15, упр. 11, с. 136

---





Спасибо за внимание!

Si