

Математический

турнир

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Задача 5

Задача 6

Задача 7

Задача 8

Задача 9

Задача 10

Задача № 1

Докажите, что: $\sqrt{17 - 12\sqrt{2}} = 3 - 2\sqrt{2}$

Решение . 1 способ


$$17 - 12\sqrt{2} = (a - b)^2; \quad 17 - 12\sqrt{2} = a^2 - 2ab + b^2$$
$$17 = a^2 + b^2;$$

$$12\sqrt{2} = 2ab$$

Подбором находим, что $a = 3$; $b = 2\sqrt{2}$,
тогда $17 - 12\sqrt{2} = (3 - 2\sqrt{2})^2$, имеем

$$\sqrt{17 - 12\sqrt{2}} = \sqrt{(3 - 2\sqrt{2})^2} = |3 - 2\sqrt{2}| = 3 - 2\sqrt{2}$$

Т.К. $3 > 2\sqrt{2}$



Задача № 1

Докажите, что: $\sqrt{17 - 12\sqrt{2}} = 3 - 2\sqrt{2}$

2 способ

т.к. $3 - 2\sqrt{2} > 0$, то

$$3 - 2\sqrt{2} = \sqrt{(3 - 2\sqrt{2})^2} = \sqrt{9 - 12\sqrt{2} + 8} = \sqrt{17 - 12\sqrt{2}}$$

3 способ

т.к. обе части равенства положительны, сравним их квадраты

$$\left(\sqrt{17 - 12\sqrt{2}}\right)^2 = \left(3 - 2\sqrt{2}\right)^2$$

Квадраты **положительных** чисел равны, значит сами числа равны

$$17 - 12\sqrt{2} = 9 - 2 \cdot 3 \cdot 2\sqrt{2} + \left(2\sqrt{2}\right)^2$$



Задача № 2

- Найдите наибольшее значение выражения $\frac{10}{x^2 + y^2 + 4x - 6y + 14}$ и определите при каких значениях x и y оно достигается.

Решение

$$\frac{10}{x^2 + y^2 + 4x - 6y + 14} = \frac{10}{x^2 + 4x + 4 + y^2 - 6y + 9 - 4 - 9 + 14} = \frac{10}{(x + 2)^2 + (y - 3)^2 + 1}$$

Учитывая **положительность** числителя и знаменателя, делаем вывод, что наибольшее значение данного выражения достигается при наименьшем значении знаменателя

Т.к. $(x + 2)^2 \geq 0$ и $(y - 3)^2 \geq 0$, то знаменатель принимает наименьшее значение при $x = -2$ и $y = 3$, тогда наибольшее значение равно:

$$\frac{10}{(-2 + 2)^2 + (3 - 3)^2 + 1} = \frac{10}{1} = 10$$

Ответ: 10, при $x = -2$ и $y = 3$

Задача №3

Найдите все значения k , при которых уравнение $kx^2 - 6x + k = 0$ имеет два корня

Решение

При $k=0$ уравнение становится линейным, и не может иметь двух корней

При $k \neq 0$ уравнение является квадратным, поэтому два корня возможны только при положительном дискриминанте

$$36 - 4k^2 > 0$$

$$36 - 4k^2 = 0$$


$$4k^2 = 36$$

$$k^2 = 9$$

$$k = 3,$$

$$k = -3.$$

$$k \in (-3; 3), \text{ но } k \neq 0$$



Ответ

$$k \in (-3; 0) \cup (0; 3)$$

Задача № 4

Докажите, что уравнение $(x^2 - 2x + 3)(x^2 - 6x + 10) = 1$ не имеет корней.

Решение

Рассмотрим функции $y = x^2 - 2x + 3$

$$y = x^2 - 6x + 10$$

Графиками данных функций являются параболы, ветви которых направлены вверх.

$$y = x^2 - 2x + 3, \quad x_{\text{в}} = \frac{2}{2} = 1$$

$$y_{\text{в}} = 1^2 - 2 \cdot 1 + 3 = 2$$

$$\text{значит } x^2 - 2x + 3 \geq 2$$

$$y = x^2 - 6x + 10, \quad x_{\text{в}} = \frac{6}{2} = 3$$

$$y_{\text{в}} = 3^2 - 6 \cdot 3 + 10 = 1$$


$$\text{значит } x^2 - 6x + 10 \geq 1$$

Тогда $(x^2 - 2x + 3)(x^2 - 6x + 10) \geq 2$ при любом x ,

значит $(x^2 - 2x + 3)(x^2 - 6x + 10) \neq 1$,

Значит, уравнение

$(x^2 - 2x + 3)(x^2 - 6x + 10) = 1$ не имеет корней



Задача № 5

Решите систему уравнений

$$\begin{cases} a + b + c = 2 \\ b + c + d = 0 \\ a + b + d = 1 \\ a + c + d = 3. \end{cases}$$

Решение

Сложим все уравнения в системе и получим:

$$3(a + b + c + d) = 6 \quad / : 3;$$

$$a + b + c + d = 2;$$

$$(a + b + c) + d = 2;$$

$$2 + d = 2$$

$$d = 0$$

$$a + (b + c + d) = 2;$$

$$a + 0 = 2$$

$$a = 2$$

$$(a + c + d) + b = 2;$$

$$3 + b = 2$$

$$b = -1$$

$$(a + b + d) + c = 2$$

$$1 + c = 2$$

$$c = 1$$

Ответ. $a = 2; c = 1; b = -1; d = 0.$

Задача № 6

Постройте график функции

$$y = \frac{x^3 - x}{x-1}$$

При каких значениях x , значения функции положительны

Решение

$$\frac{x^3 - x}{x-1} = \frac{x(x^2 - 1)}{x-1} = \frac{x(x-1)(x+1)}{x-1} = x(x+1) = x^2 + x, x \neq 1$$

(т. к. на нуль делить нельзя)

Графиком данной функции является

парабола $y=x^2+x$ с выколотой точкой $(1;2)$

1. Ветви направлены вверх, т.к. $a>0$


2. Координаты вершины

$$x_v = -\frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \quad y_v = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$$

3. Пересечение с ОХ (из условия $y=0$)

$$x(x+1)=0$$

$$x=0 \quad \text{или} \quad x=-1$$



Задача №7

Сколько граммов 75%-ного раствора кислоты надо добавить к 30 г 15%-ного раствора кислоты, чтобы получить 50%-ный раствор кислоты?

Решение.

	вес раствора	% кислоты	вес кислоты (грамм)
1 раствор	x	75	$0,75x$
2 раствор	30	15	$0,15 \cdot 30 = 4,5$
СМЕСЬ	$30 + x$	50	

$$4,5 + 0,75x = (30 + x) \cdot 0,5;$$

$$4,5 + 0,75x = 15 + 0,5x;$$

$$0,25x = 10,5;$$

$$x = 42$$

Ответ. 42 г надо добавить 75%-ного раствора.

Задача № 8

Каждый слушатель на курсах изучает один из языков – английский, немецкий или французский. Отношение числа слушателей, изучающих английский, к числу слушателей, изучающих немецкий, равно $3 : 2$, а изучающих немецкий к числу изучающих французский равно $8 : 5$. Сколько процентов слушателей изучает наименее популярный на курсах язык?

Решение

Английский		
Немецкий		
французский	$2x = 8y$	

1). $2x=8y$

2) $12+8+5=25$ – всего частей

3) $100\% : 25 = 4\%$ приходится на 1 часть

4) $4\% \cdot 5 = 20\%$ -слушателей изучают французский язык и, т.к. на него приходится наименьшее число частей, то это наименее популярный язык на курсах.

Ответ: 20% изучают наименее популярный на курсах язык.

Задача № 9

Вычислите сумму:

$$50^2 - 49^2 + 48^2 - 47^2 + \dots + 2^2 - 1^2$$

Решение

В сумме всего 50 слагаемых, сгруппируем их парами

$$\begin{aligned} & (50^2 - 49^2) + (48^2 - 47^2) + \dots + (2^2 - 1^2) = \\ & = (50 - 49)(50 + 49) + (48 - 47)(48 + 47) + \\ & + (46 - 45)(46 + 45) + \dots + (4 - 3)(4 + 3) + (2 - 1)(2 + 1) = \\ & = 1 \cdot 99 + 1 \cdot 95 + 1 \cdot 91 + \dots + 1 \cdot 7 + 1 \cdot 3 = 99 + 95 + 91 + \dots + 7 + 3 \end{aligned}$$

Получили 25 слагаемых. Группируем первое и последнее слагаемые, второе и предпоследнее и т.д.

$$\begin{aligned} & (99 + 3) + (95 + 7) + (91 + 11) + \dots + (55 + 47) + 51 = \\ & = 102 + 102 + 102 + \dots + 102 + 51 \end{aligned}$$

Получили 12 слагаемых равных 102 и слагаемое 51 $102 \cdot 12 + 51 = 1275$.

Ответ: 1275


Задача №10

При каких значениях m система неравенств имеет ровно три целых решения:

Решение

$$\begin{cases} 5 - x < 2 \\ x + 6 < m + 1. \end{cases} \quad \begin{cases} x > 3 \\ x < m - 5 \end{cases}$$


1) Если $m - 5 > 3$, т. е. $m > 8$, то система имеет решение.



Решение неравенства должно содержать **3 целых решения**, это числа: **4;5;6**, значит **$6 < m - 5 \leq 7$**

$$11 < m \leq 12$$

2) Если $m - 5 < 3$, т. е. $m < 8$, то система не имеет решение.



3) Если $m - 5 = 3$, т. е. $m = 8$, то система не имеет решение.

Ответ: При $m \in (11;12]$ система имеет ровно три целых решения.

ждем... ждем...



результаты проверки...

Спасибо за игру.



До новых встреч